


Capítulo 3

A circunferência trigonométrica: seno, cosseno e tangente

Para pensar



Exercícios propostos

1. Como 1° equivale a 60', para encontrar a equivalência a 3', podemos resolver a regra de três:

$$\begin{array}{r} \pi \text{ ————— } 60' \\ x \text{ ————— } 3' \end{array}$$

$$x = \frac{1 \cdot 3}{60} = 0,05$$

Logo, 124°3'0" equivale a 124,05°.

Alternativa b.

2. A razão entre o comprimento do arco e a medida do raio, nessa ordem, é a medida x do arco em radiano, ou seja:

$$x = \frac{10}{2,5} \cdot \text{rad} \Rightarrow x = 4 \text{ rad}$$

3. a) rad grau

$$\begin{array}{r} \pi \text{ ————— } 180 \\ x \text{ ————— } 30 \end{array} \Rightarrow x = \frac{30\pi}{180} = \frac{\pi}{6}$$

Portanto, 30° equivalem a $\frac{\pi}{6}$ rad.

- b) rad grau

$$\begin{array}{r} \pi \text{ ————— } 180 \\ x \text{ ————— } 120 \end{array} \Rightarrow x = \frac{120\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$$

Portanto, 120° equivalem a $\frac{2\pi}{3}$ rad.

- c) rad grau

$$\begin{array}{r} \pi \text{ ————— } 180 \\ x \text{ ————— } 225 \end{array} \Rightarrow x = \frac{225\pi}{180} = \frac{5\pi}{4}$$

Portanto, 225° equivalem a $\frac{5\pi}{4}$ rad.

- d) rad grau

$$\begin{array}{r} \pi \text{ ————— } 180 \\ x \text{ ————— } 300 \end{array} \Rightarrow x = \frac{300\pi}{180} = \frac{5\pi}{3}$$

Portanto, 300° equivalem a $\frac{5\pi}{3}$ rad.

- e) rad grau

$$\begin{array}{r} \pi \text{ ————— } 180 \\ x \text{ ————— } 240 \end{array} \Rightarrow x = \frac{240\pi}{180} = \frac{4\pi}{3}$$

Portanto, 240° equivalem a $\frac{4\pi}{3}$ rad.

- f) rad grau

$$\begin{array}{r} \pi \text{ ————— } 180 \\ x \text{ ————— } 330 \end{array} \Rightarrow x = \frac{330\pi}{180} = \frac{11\pi}{6}$$

Portanto, 330° equivalem a $\frac{11\pi}{6}$ rad.

4. a) $\begin{array}{r} \pi \text{ ————— } 180^\circ \\ \frac{\pi}{4} \text{ ————— } x \end{array} \Rightarrow x = \frac{\frac{\pi}{4} \cdot 180^\circ}{\pi} \therefore x = 45^\circ$

b) $\begin{array}{r} \pi \text{ ————— } 180^\circ \\ \frac{3\pi}{2} \text{ ————— } x \end{array} \Rightarrow x = \frac{\frac{3\pi}{2} \cdot 180^\circ}{\pi} \therefore x = 270^\circ$

c) $\begin{array}{r} \pi \text{ ————— } 180^\circ \\ \frac{7\pi}{6} \text{ ————— } x \end{array} \Rightarrow x = \frac{\frac{7\pi}{6} \cdot 180^\circ}{\pi} \therefore x = 210^\circ$

d) $\begin{array}{r} \pi \text{ ————— } 180^\circ \\ \frac{2\pi}{5} \text{ ————— } x \end{array} \Rightarrow x = \frac{\frac{2\pi}{5} \cdot 180^\circ}{\pi} \therefore x = 72^\circ$

e) $\begin{array}{r} \pi \text{ ————— } 180^\circ \\ \frac{5\pi}{3} \text{ ————— } x \end{array} \Rightarrow x = \frac{\frac{5\pi}{3} \cdot 180^\circ}{\pi} \therefore x = 300^\circ$

5. Como π rad equivale a 180° e 1 min equivale a 60 s, temos:

$$1.800\pi \frac{\text{rad}}{\text{min}} = 1.800 \cdot 180^\circ \cdot \frac{1}{60 \text{ s}} = 5.400^\circ/\text{s}$$

6. a) Indicando por x, y e z, respectivamente, o comprimento, a medida em grau e a medida em radiano do arco \widehat{AB} , temos:

	Tempo (h)	Comprimento do arco (km)
--	------------------	---------------------------------

24		2 · π · 6.370
9		x

$\therefore x = \frac{9.555\pi}{2}$ km ou, aproximadamente, 15.000 km

	Tempo (h)	Medida do arco (grau)
--	------------------	------------------------------

24		360
9		y

$\therefore y = 135^\circ$

	Tempo (h)	Medida do arco (radiano)
--	------------------	---------------------------------

24		2π
9		z

$\therefore z = \frac{3\pi}{4}$ rad

- b) Em qualquer paralelo terrestre, um ponto descreve um arco de $\frac{3\pi}{4}$ rad em 9 horas.

- 7. a)** $x_1 = 50^\circ$
 $x_2 = 50^\circ + 360^\circ = 410^\circ$
 $x_3 = 50^\circ + 2 \cdot 360^\circ = 770^\circ$
 Logo, as medidas procuradas são 50° , 410° e 770° .
- b)** $x_1 = 50^\circ - 360^\circ = -310^\circ$
 $x_2 = 50^\circ - 2 \cdot 360^\circ = -670^\circ$
 Logo, as medidas procuradas são -310° e -670° .
- 8. a)** $x_1 = \frac{6\pi}{7}$
 $x_2 = \frac{6\pi}{7} + 2\pi \Rightarrow x_2 = \frac{20\pi}{7}$
 $x_3 = \frac{6\pi}{7} + 2 \cdot 2\pi \Rightarrow x_3 = \frac{34\pi}{7}$
 Logo, as medidas procuradas são $\frac{6\pi}{7}$ rad,
 $\frac{20\pi}{7}$ rad e $\frac{34\pi}{7}$ rad.
- b)** $x_2 = \frac{6\pi}{7} - 2\pi \Rightarrow x_2 = -\frac{8\pi}{7}$
 $x_3 = \frac{6\pi}{7} - 2 \cdot 2\pi \Rightarrow x_3 = -\frac{22\pi}{7}$
 Logo, as medidas procuradas são $-\frac{8\pi}{7}$ rad e
 $-\frac{22\pi}{7}$ rad.
- 9. a)** $2.923^\circ \mid 360^\circ$
 $43^\circ \ 8$
 Logo, a medida do arco trigonométrico procurada é 43° .
- b)** $1.972^\circ \mid 360^\circ$
 $172^\circ \ 5$
 Logo, a medida do arco trigonométrico procurada é 172° .
- c)** $-40^\circ + 360^\circ = 320^\circ$ (1ª volta positiva)
 Logo, a medida do arco trigonométrico procurada é 320° .
- d)** $-400^\circ + 360^\circ = -40^\circ$ (1ª volta negativa)
 $-40^\circ + 360^\circ = 320^\circ$ (1ª volta positiva)
 Logo, a medida do arco trigonométrico procurada é 320° .
- e)** $\frac{45\pi}{11}$ rad = $\left(\frac{44\pi}{11} + \frac{\pi}{11}\right)$ rad = $\left(4\pi + \frac{\pi}{11}\right)$ rad
 Logo, a medida do arco trigonométrico procurada é $\frac{\pi}{11}$ rad.
- f)** $\frac{38\pi}{5}$ rad = $\left(\frac{35\pi}{5} + \frac{3\pi}{5}\right)$ rad = $\left(7\pi + \frac{3\pi}{5}\right)$ rad =
 $= \left(6\pi + \pi + \frac{3\pi}{5}\right)$ rad = $\left(6\pi + \frac{8\pi}{5}\right)$ rad
 Logo, a medida do arco trigonométrico procurada é $\frac{8\pi}{5}$ rad.
- g)** $-\frac{\pi}{13}$ rad = $\left(-\frac{\pi}{13} + 2\pi\right)$ rad = $\left(\frac{-\pi + 26\pi}{13}\right)$ rad =
 $= \frac{25\pi}{13}$ rad
 Logo, a medida do arco trigonométrico procurada é $\frac{25\pi}{13}$ rad.
- h)** $-\frac{18\pi}{5}$ rad $\equiv \left(-\frac{8\pi}{5} + 2\pi\right)$ rad = $\left(\frac{-8\pi + 10\pi}{5}\right)$ rad =
 $= \frac{2\pi}{5}$ rad
 Logo, a medida do arco trigonométrico procurada é $\frac{2\pi}{5}$ rad.
- 10. a)** $2.040^\circ \mid 360^\circ$
 $240^\circ \ 5$
 Logo: $x = 240^\circ$
- b)** $x = 240^\circ + 360^\circ \Rightarrow x = 600^\circ$
- c)** $x = 240^\circ + 2 \cdot 360^\circ \Rightarrow x = 960^\circ$
- d)** $x = 240^\circ - 360^\circ \Rightarrow x = -120^\circ$
- 11.** $\frac{121\pi}{6} = \frac{120\pi + \pi}{6} = \frac{120\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = 20\pi + \frac{\pi}{6}$
- a)** $x = \frac{\pi}{6}$
- b)** $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi \Rightarrow x = \frac{13\pi}{6}$
- c)** $x = \frac{\pi}{6} + 2 \cdot 2\pi \Rightarrow x = \frac{25\pi}{6}$
- d)** $x = \frac{\pi}{6} - 2\pi \Rightarrow x = -\frac{11\pi}{6}$
- 12. a)** Como o ponteiro dos minutos faz uma volta a cada hora, cada dia tem 24 horas, e passaram 4 dias até a zero hora do dia 5, concluímos que a medida do arco descrito pelo ponteiro dos minutos é:
 $360^\circ \cdot 24 \cdot 4 = 34.560^\circ$
- b)** Como o ponteiro das horas faz duas voltas por dia e passaram 4 dias até a zero hora do dia 5, temos:
 $2 \cdot 360^\circ \cdot 4 = 2.880^\circ$
- c)** Como o número 3 do relógio equivale a 90° e o ponteiro realiza uma volta por hora, em um dia temos:
 $a_n = 90^\circ + 360^\circ(n - 1)$, com $1 \leq n \leq 24$
 Como um dia tem 24 horas, substituindo n por 24, obtemos:
 $a_{24} = 90^\circ + 360^\circ(24 - 1) = 8.370^\circ$
 Portanto, o termo geral é $a_n = 90^\circ + 360^\circ(n - 1)$ e o último termo é 8.370° .
- d)** Como os números 3 e 9 do relógio equivalem a 90° e 270° e o ponteiro realiza uma volta por hora, em um dia temos:
 $a_n = 90^\circ + 180^\circ(n - 1)$, com $1 \leq n \leq 48$, pois o ponteiro para 2 vezes a cada hora.
 Como um dia tem 24 horas, substituindo n por 48, obtemos:
 $a_{48} = 90^\circ + 180^\circ(48 - 1) = 8.550^\circ$
 Portanto, o termo geral é $a_n = 90^\circ + 180^\circ(n - 1)$ e o último termo é 8.550° .
- 13. a)** Os infinitos números reais associados ao ponto A' são:
 $\dots, -\pi, \pi, 3\pi, 5\pi, \dots$
 Observando que a diferença entre dois termos consecutivos quaisquer dessa sequência é 2π , podemos representar todos esses números reais por:
 $x = \pi + k \cdot 2\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$

- b) Os infinitos números reais associados ao ponto B são:
 $\dots, -\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}, \dots$
 Observando que a diferença entre dois termos consecutivos quaisquer dessa sequência é 2π , podemos representar todos esses números reais por:
 $x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$
- c) Os infinitos números reais associados aos pontos B ou B' são:
 $\dots, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$
 Observando que a diferença entre dois termos consecutivos quaisquer dessa sequência é π , podemos representar todos esses números reais por:
 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$
- d) Os infinitos números reais associados aos pontos A, B, A' e B' são:
 $\dots, -\pi, -\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi, \dots$
 Observando que a diferença entre dois termos consecutivos quaisquer dessa sequência é $\frac{\pi}{2}$, podemos representar todos esses números reais por:
 $x = \frac{k\pi}{2}$, com $k \in \mathbb{Z}$
- e) $x = \pi + \frac{k\pi}{2}$, com $k \in \mathbb{Z}$
- 14. a)** Os vértices do hexágono regular ABCDEF dividem a circunferência trigonométrica em arcos de medida: $\frac{2\pi}{6}$ rad = $\frac{\pi}{3}$ rad
 Como o vértice A coincide com a origem da circunferência trigonométrica, os infinitos números reais associados aos vértices do hexágono são: $\dots, 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \dots$
 Podemos representar esses números por: $k \cdot \frac{\pi}{3}$, com $k \in \mathbb{Z}$.
- b)** Os vértices do triângulo equilátero MNP dividem a circunferência trigonométrica em arcos de medida: $\frac{2\pi}{3}$ rad
 Como o vértice N está associado ao número π , os infinitos números reais associados aos vértices do triângulo são: $\dots, \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}, \dots$
 Podemos representar esses números por:
 $\frac{\pi}{3} + k \cdot \frac{2\pi}{3}$, com $k \in \mathbb{Z}$.
- 15.** A sequência de horários, em hora, programados para o salvamento, depois das 13 h, é:
 13,25; 13,5; 13,75; 14; ...; 17; 17,5
 Essa sequência pode ser representada por:
 $\left(13 + \frac{k}{4}\right)$ horas, com $k \in \mathbb{Z}$ e $1 \leq k \leq 18$.
 Alternativa a.
- 16. a)** N: $180^\circ - 21^\circ = 159^\circ$
 P: $180^\circ + 21^\circ = 201^\circ$
 Q: $360^\circ - 21^\circ = 339^\circ$
- b) N: π rad - $\frac{\pi}{5}$ rad = $\frac{4\pi}{5}$ rad
 P: π rad + $\frac{\pi}{5}$ rad = $\frac{6\pi}{5}$ rad
 Q: 2π rad - $\frac{\pi}{5}$ rad = $\frac{9\pi}{5}$ rad
- 17. a)** M: $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$
 N: 120°
 P: $180^\circ + 60^\circ = 240^\circ$
 Q: $360^\circ - 60^\circ = 300^\circ$
- b) M: $210^\circ - 180^\circ = 30^\circ$
 N: $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$
 P: 210°
 Q: $360^\circ - 30^\circ = 330^\circ$
- c) M: $360^\circ - 310^\circ = 50^\circ$
 N: $180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$
 P: $180^\circ + 50^\circ = 230^\circ$
 Q: 310°
- d) M: $\pi - \frac{4\pi}{5} = \frac{\pi}{5}$
 N: $\frac{4\pi}{5}$
 P: $\pi + \frac{\pi}{5} = \frac{6\pi}{5}$
 Q: $2\pi - \frac{\pi}{5} = \frac{9\pi}{5}$
- e) M: $\frac{4\pi}{3} - \pi = \frac{\pi}{3}$
 N: $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$
 P: $\frac{4\pi}{3}$
 Q: $2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$
- f) M: $2\pi - \frac{11\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$
 N: $\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$
 P: $\pi + \frac{\pi}{6} + \frac{7\pi}{6}$
 Q: $\frac{11\pi}{6}$
- 18. a)** $\cos 0 = 1$; $\sin 0 = 0$
 b) $\cos \frac{\pi}{2} = 0$; $\sin \frac{\pi}{2} = 1$
 c) $\cos \pi = -1$; $\sin \pi = 0$
 d) $\cos \frac{3\pi}{2} = 0$; $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$
 e) $\cos 2\pi = 1$; $\sin 2\pi = 0$
 f) $\cos 720^\circ = \cos 0^\circ = 1$
 g) $\sin 450^\circ = \sin (90^\circ + 360^\circ) = \sin 90^\circ = 1$
 h) $\sin (-270^\circ) = \sin 90^\circ = 1$
 i) $\cos (-180^\circ) = \cos 180^\circ = -1$
 j) $\cos 12\pi = \cos 0 = 1$
 k) $\cos 11\pi = \cos (5 \cdot 2\pi + \pi) = \cos \pi = -1$
 l) $\sin \frac{21\pi}{2} = \sin \left(\frac{20\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$
 m) $\sin \frac{23\pi}{2} = \sin \left(\frac{20\pi}{2} + \frac{3\pi}{2}\right) = \sin \frac{3\pi}{2} = -1$
 n) $\sin (-\pi) = \sin \pi = 0$

19. $E = \frac{\text{sen } 90^\circ - \text{cos } 180^\circ + \text{cos } 270^\circ}{\text{sen } 270^\circ - \text{cos } 90^\circ}$

$E = \frac{1 - (-1) + 0}{-1 - 0} = \frac{2}{-1} = -2$

20. $E = \frac{\text{sen } \frac{\pi}{6} + \text{cos } \frac{\pi}{3}}{\text{sen } \frac{\pi}{2}} \Rightarrow E = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{1} = 1$

21. Os arcos de medidas de 100° e 101° têm extremidades no 2º quadrante. Nesse quadrante, quanto maior a medida do arco, menor o valor do seno. Portanto: $\text{sen } 101^\circ < \text{sen } 100^\circ$
Alternativa e.

22. a) $4 + 5 \cos x = 2$
 $5 \cos x = -2$

$\cos x = -\frac{2}{5}$

Como $-1 < -\frac{2}{5} < 1$, então 2 pertence ao conjunto imagem de f .

b) $4 + 5 \cos x = 10$
 $5 \cos x = 6$

$\cos x = \frac{6}{5}$

Como $\frac{6}{5} > 1$, concluímos que $\frac{6}{5}$ não pertence ao conjunto imagem de f .

c) A imagem da função $y = \cos x$ é $[-1; 1]$; logo, a imagem de $y = 5 \cos x$ é $[-5; 5]$.
Portanto, a imagem da função $y = 4 + 5 \cos x$ é $[-5 + 4; 5 + 4] = [-1; 9]$.

23. Como $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{4} < \beta < \pi$, então α está no primeiro quadrante e β no segundo quadrante.

a) Verdadeira, como α está no primeiro quadrante, $\text{sen } \alpha > 0$.

b) Falsa, como β está no segundo quadrante, logo $\text{sen } \beta > 0$.


c) Verdadeira, como β está no segundo quadrante, $\text{cos } \beta < 0$.

d) Verdadeira, como $\frac{\pi}{2} < 2\alpha < \pi$, então 2α está no segundo quadrante, logo $\text{cos } 2\alpha < 0$.

e) Verdadeira, como $\frac{3\pi}{2} < 2\beta < 2\pi$, então 2β está no quarto quadrante, logo $\text{cos } 2\beta > 0$.

f) Falsa, como $\pi < 4\alpha < 2\pi$, então 4α está no terceiro ou quarto quadrante, logo $\text{sen } 4\alpha < 0$.

24. (I) Sendo P a posição da partícula em dado instante e θ a medida do arco \widehat{AP} , com $A(5, 0)$, esquematizamos:



A função g que expressa a abscissa de P para cada medida θ é:

$g(\theta) = 5 \cos \theta$ (I)

A medida θ , em radiano, pode ser obtida em função do tempo t , em segundo, pela regra de três:

Deslocamento angular da partícula em radiano	Tempo em segundo
2π	3
θ	t

$\therefore \theta = \frac{2\pi t}{3}$ rad (II)

Substituindo (II) em (I), temos:


$g\left(\frac{2\pi t}{3}\right) = 5 \cos \frac{2\pi t}{3}$

Indicando essa função por $f(t)$, concluímos:

$f(t) = 5 \cos \frac{2\pi t}{3}$

Alternativa b.

(II) Sendo P a posição da partícula em dado instante e θ a medida do arco \widehat{AP} , com $A(5, 0)$, esquematizamos:



A função g que expressa a ordenada de P para cada medida θ é:

$g(\theta) = 5 \text{sen } \theta$ (I)

A medida θ , em radiano, pode ser obtida em função do tempo t , em segundo, pela regra de três:

Deslocamento angular da partícula em radiano	Tempo em segundo
2π	3
θ	t

$\therefore \theta = \frac{2\pi t}{3}$ rad (II)

Substituindo (II) em (I), temos:

$g\left(\frac{2\pi t}{3}\right) = 5 \text{sen } \frac{2\pi t}{3}$

Indicando essa função por $f(t)$, concluímos:

$f(t) = 5 \text{sen } \frac{2\pi t}{3}$

Alternativa d.

25. a) $\text{sen } 120^\circ = \text{sen } (180^\circ - 60^\circ) = \text{sen } 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

b) $\text{cos } 120^\circ = \text{cos } (180^\circ - 60^\circ) = -\text{cos } 60^\circ = -\frac{1}{2}$

c) $\text{sen } 210^\circ = \text{sen } (180^\circ + 30^\circ) = -\text{sen } 30^\circ = -\frac{1}{2}$

d) $\text{cos } 210^\circ = \text{cos } (180^\circ + 30^\circ) = -\text{cos } 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

- e) $\sin 300^\circ = \sin (360^\circ - 60^\circ) = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- f) $\cos 300^\circ = \cos (360^\circ - 60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$
26. a) • M e N são simétricos em relação ao eixo das ordenadas; logo, suas abscissas são opostas e suas ordenadas são iguais. Assim, temos:

$$N\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$$
 • M e P são simétricos em relação à origem do sistema de eixos cartesianos; logo, suas abscissas são opostas e suas ordenadas são opostas. Assim, temos:

$$P\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$
 • M e Q são simétricos em relação ao eixo das abscissas; logo, suas ordenadas são opostas e suas abscissas são iguais. Assim, temos:

$$Q\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$
 b) • M e P são simétricos em relação à origem do sistema de eixos cartesianos; logo, suas abscissas são opostas e suas ordenadas são opostas. Assim, temos:

$$M\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$
 • N e P são simétricos em relação ao eixo das abscissas; logo, suas ordenadas são opostas e suas abscissas são iguais. Assim, temos:

$$N\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$
 • Q e P são simétricos em relação ao eixo das ordenadas; logo, suas abscissas são opostas e suas ordenadas são iguais. Assim, temos:

$$Q\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$
 c) • M e Q são simétricos em relação ao eixo das abscissas; logo, suas ordenadas são opostas e suas abscissas são iguais. Assim, temos:

$$M\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$
 • N e Q são simétricos em relação à origem do sistema de eixos cartesianos; logo, suas abscissas são opostas e suas ordenadas são opostas. Assim, temos:

$$N\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$
 • P e Q são simétricos em relação ao eixo das ordenadas; logo, suas abscissas são opostas e suas ordenadas são iguais. Assim, temos:

$$P\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$
27. a) $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ f) $\sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
 b) $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ g) $\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
 c) $\sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$ h) $\sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
 d) $\cos \frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ i) $\cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
 e) $\sin \frac{5\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ j) $\sin \frac{7\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

28. a) $\sin (-30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$
 b) $\cos (-30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 c) $\sin (-300^\circ) = -\sin 300^\circ = -(-\sin 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 d) $\cos (-300^\circ) = \cos 300^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$
 e) $\sin (-1.485^\circ) = -\sin 1.485^\circ = -\sin 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
 f) $\cos (-1.230^\circ) = \cos 1.230^\circ = \cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
 g) $\sin \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$
 h) $\cos \left(-\frac{4\pi}{3}\right) = \cos \left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$
 i) $\sin \left(-\frac{11\pi}{6}\right) = -\sin \frac{11\pi}{6} = -(-\sin \frac{\pi}{6}) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$
 j) $\cos \left(-\frac{5\pi}{3}\right) = \cos \frac{5\pi}{3} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$
 k) $\cos \left(-\frac{7\pi}{4}\right) = \cos \left(\frac{7\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
 l) $\sin \frac{25\pi}{6} = \sin \left(\frac{24\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) = \sin \left(4\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$
 m) $\sin \frac{33\pi}{4} = \sin \left(\frac{32\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \sin \left(8\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \sin \left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$


29.
$$E = \frac{\cos(180^\circ + x) + \sin(180^\circ + x) + \sin(180^\circ - x)}{\cos(360^\circ - x)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E = \frac{-\cos x - \sin x + \sin x}{\cos x}$$

$$\therefore E = -\frac{\cos x}{\cos x} = -1$$

30. Como ABCD é paralelogramo, os ângulos \widehat{ABC} e \widehat{DAB} são suplementares; assim:

$$\cos(180 - \alpha) = -\cos(\alpha) = -\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{4}$$




Portanto, para determinar a medida p da projeção ortogonal, podemos fazer:

$$\cos(180 - \alpha) = \frac{p}{12} \Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{p}{12}$$

$$\therefore p = 9$$

Portanto, a projeção ortogonal do segmento \overline{AB} sobre o segmento \overline{BC} tem 9 cm.

31. Sendo h a altura da pirâmide, temos:



$$\begin{cases} \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \frac{h}{115} \\ \cos \alpha = -0,6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\operatorname{sen}(180^\circ - \alpha)}{\cos(180^\circ - \alpha)} = \frac{h}{115} \\ \cos \alpha = -0,6 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} \alpha}{-\cos \alpha} = \frac{h}{115} \\ \cos \alpha = -0,6 \end{cases}$$

Como $\cos \alpha = -0,6$ e $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, temos $\operatorname{sen} \alpha = 0,8$; logo:

$$\frac{0,8}{-(-0,6)} = \frac{h}{115} \Rightarrow h \approx 153 \text{ m}$$

32. a) $f(1,5) = 300 \cos\left(\frac{4 \cdot \pi \cdot 1,5}{3}\right) = 300 \cos 2\pi = 300$

Portanto, a abscissa quando $t = 1,5$ é 300 km.

- b) A função do eixo das ordenadas é dada por

$$g(t) = 300 \operatorname{sen}\left(\frac{4\pi t}{3}\right); \text{ assim, para } t = 2,5 \text{ temos:}$$

$$\begin{aligned} g(2,5) &= 300 \operatorname{sen}\left(\frac{4 \cdot \pi \cdot 2,5}{3}\right) = 300 \operatorname{sen}\left(10 \cdot \frac{\pi}{3}\right) \\ &= 300 \operatorname{sen}\left(4 \cdot \frac{\pi}{3}\right) = -150\sqrt{3} \end{aligned}$$

Portanto, a ordenada quando $t = 2,5$ é $-150\sqrt{3}$ km.

c) $r^2 = \left[300 \operatorname{sen}\left(\frac{4\pi t}{3}\right)\right]^2 + \left[300 \cos\left(\frac{4\pi t}{3}\right)\right]^2$

$$r^2 = 300^2 \left[\operatorname{sen}^2\left(\frac{4\pi t}{3}\right) + \cos^2\left(\frac{4\pi t}{3}\right) \right]$$

$$r^2 = 300^2$$

$$r = 300$$

Portanto, o raio da órbita mede 300 km.

- d) Para completar uma volta, devemos ter:

$$\frac{4\pi t}{3} = 2\pi \Rightarrow t = \frac{3}{2} = 1,5$$

Portanto, o satélite dá uma volta ao redor da Terra a cada 1,5 hora.

33. $\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1$

$$\therefore \cos^2 \alpha = 1 - \frac{16}{25} \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{9}{25}$$

$$\therefore \cos \alpha = \pm \frac{3}{5}$$

Como $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, concluímos que $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$.

34. $\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$

$$\therefore \operatorname{sen} x = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Como $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, então $\operatorname{sen} x = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

35.
$$\begin{cases} \operatorname{sen}^2 \beta + \cos^2 \beta = 1 & \text{(I)} \\ \operatorname{sen} \beta = 2 \cos \beta & \text{(II)} \end{cases}$$

Substituindo (II) em (I), temos:

$(2 \cos \beta)^2 + \cos^2 \beta = 1$ e, portanto:

$$4 \cos^2 \beta + \cos^2 \beta = 1 \Rightarrow 5 \cos^2 \beta = 1$$

$$\therefore \cos^2 \beta = \frac{1}{5} \Rightarrow \cos \beta = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$$

Como $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$, concluímos que $\cos \beta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.

Substituindo $\cos \beta$ por $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ em (II), obtemos:

$$\operatorname{sen} \beta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

36. $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \left(\frac{m}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{m+1}}{2}\right)^2 = 1$

$$\therefore \frac{m^2}{16} + \frac{m+1}{4} = 1 \Rightarrow \frac{m^2 + 4m + 4}{16} = \frac{16}{16}$$


$$\therefore m^2 + 4m - 12 = 0 \Rightarrow m = 2 \text{ ou } m = -6 \text{ (não convém)}$$

Concluímos, então, que $m = 2$.


37. a) **Professor!** Variar a linguagem contribui para o enriquecimento do vocabulário do aluno. Sugere-se as seguintes variações para a definição de altura:

Sendo r a reta suporte do lado \overline{AB} , a altura relativa a esse lado é o segmento \overline{CH} , perpendicular à reta r , com $H \in r$.

A altura relativa ao lado \overline{AC} é o segmento \overline{BH} , em que H é a projeção ortogonal de C sobre a reta suporte do lado \overline{AB} .



- b)



No triângulo retângulo BCH, temos:

$$\operatorname{sen}(180^\circ - \alpha) = \frac{h}{6,5} \Rightarrow \operatorname{sen} \alpha = \frac{h}{6,5} \quad \text{(I)}$$

Para o cálculo do $\operatorname{sen} \alpha$, aplicamos a relação fundamental da Trigonometria a partir do dado

$$\cos \alpha = -\frac{5}{13}$$

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \operatorname{sen}^2 \alpha + \left(-\frac{5}{13}\right)^2 = 1$$

$$\therefore \operatorname{sen} \alpha = \pm \frac{12}{13}$$

Como α é medida de um ângulo obtuso, temos que $\operatorname{sen} \alpha$ é positivo:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{12}{13} \quad \text{(II)}$$

Substituindo (II) em (I), concluímos:

$$\frac{12}{13} = \frac{h}{6,5} \Rightarrow h = 6$$

Logo, a medida da altura relativa ao lado \overline{AB} é 6 cm.

38. Sendo α , β e γ os ângulos internos do triângulo, temos:

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \Rightarrow \beta + \gamma = 180^\circ - \alpha$$

$$\cos(\beta + \gamma) = \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

Da relação fundamental, temos:

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Como o triângulo é acutângulo, temos $0 < \alpha < 90^\circ$;

$$\text{logo: } \cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{Portanto, } \cos(\beta + \gamma) = -\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

39. Fazendo a mudança de variável $\cos x = y$, obtemos a equação do 2º grau:

$$3y^2 - 4y + 1 = 0$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = 16 - 12 = 4$$

$$\therefore y = \frac{-(-4) \pm 2}{2 \cdot 3} \Rightarrow y = 1 \text{ ou } y = \frac{1}{3}$$

Retornando à variável original, temos:

$$\cos x = 1 \text{ (não convém, pois } 0 < x < \frac{\pi}{2}\text{)} \text{ ou}$$

$$\cos x = \frac{1}{3}$$

Pela relação fundamental ($\sin^2 x + \cos^2 x = 1$), concluímos:

$$\sin^2 x + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1 \Rightarrow \sin^2 x = 1 - \frac{1}{9}$$

$$\therefore \sin^2 x = \frac{8}{9} \Rightarrow \sin x = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Como $0 < x < \frac{\pi}{2}$, só nos interessa o valor positivo do seno, isto é:

$$\sin x = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

40. $2 \sin^2 x + 3 \cos x = 0$

Substituindo $\sin^2 x$ por $1 - \cos^2 x$, obtemos:

$$2(1 - \cos^2 x) + 3 \cos x = 0$$

$$-2 \cos^2 x + 3 \cos x + 2 = 0$$

Aplicando a fórmula resolvente, temos:


$$\Delta = 3^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 2 = 25$$

$$\cos x = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{2 \cdot (-2)}$$

$$\therefore \cos x = -\frac{1}{2} \text{ ou } \cos x = 2 \text{ (não convém).}$$

$$\text{Logo, } \cos x = -\frac{1}{2}$$

41. Sendo A o ponto de intersecção da reta \overleftrightarrow{TD} com o plano do solo, esquematizamos:



Temos:

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha = \sqrt{1 - \left(-\frac{2\sqrt{6}}{5}\right)^2} = \frac{1}{5}$$

Assim:

(I) Do triângulo ADB, obtemos:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \frac{0,4}{y} \Rightarrow \frac{1}{5} = \frac{0,4}{y}$$

$$\therefore y = \frac{0,4}{\frac{1}{5}} \Rightarrow y = 2$$

(II) Do triângulo ATC, obtemos:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \frac{0,9}{x+y} \Rightarrow x+y = \frac{0,9}{\frac{1}{5}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x+y = 4,5$$

De (I) e (II), concluímos:

$$x+2 = 4,5 \Rightarrow x = 2,5$$

Portanto, a distância entre T e D é 2,5 m.

42. a) $E = \operatorname{tg} \pi + \operatorname{tg} 2\pi + \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 0 + 0 + 1 = 1$

b) $E = \frac{\operatorname{tg} \frac{3\pi}{3} + \operatorname{tg}^2 \frac{\pi}{3}}{\operatorname{tg} \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{3}\right)} = \frac{0 + (\sqrt{3})^2}{1} = 3$

43. Sabemos que a tangente é positiva para arcos dos 1º e 3º quadrantes e negativa para arcos dos 2º e 4º quadrantes. Como 95° é um arco do 2º quadrante e 130° também é um arco do 2º quadrante:

$$\operatorname{tg} 95^\circ < 0 \text{ e } \operatorname{tg} 130^\circ < 0 \Rightarrow \frac{\operatorname{tg} 95^\circ}{\operatorname{tg} 130^\circ} > 0$$

Alternativa d.

44. $\begin{cases} \sin \alpha = \frac{3}{5} \\ \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \end{cases} \Rightarrow \cos \alpha = -\frac{4}{5},$

para $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$

Assim:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4}$$

Logo, $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{3}{4}$.

45. $\begin{cases} \cos \alpha = -\frac{\sqrt{13}}{7} \\ \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \end{cases} \Rightarrow \sin \alpha = -\frac{6}{7},$

para $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$

Assim:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{6\sqrt{13}}{13}$$

Logo, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{6\sqrt{13}}{13}$.

46. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{3 \cos \alpha}{4}$

$$\begin{cases} \sin \alpha = \frac{3 \cos \alpha}{4} \\ \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \end{cases} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{4}{5},$$

para $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$

Assim:

$$\sin \alpha = \frac{3 \cos \alpha}{4} = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{3}{5}$$

Logo, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e $\cos \alpha = \frac{4}{5}$.

47. a) Pela relação fundamental da Trigonometria, temos:

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \left(\frac{\sqrt{10}}{10}\right)^2 = \frac{90}{100}$$

$$\sin x = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

$$\text{Logo, } \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\frac{3\sqrt{10}}{10}}{\frac{\sqrt{10}}{10}} = 3.$$

- b) Como ABCD é um quadrado, temos:

$$DC = AD = 12$$


$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{AD}{DE} \Rightarrow 3 = \frac{12}{DE}$$

$$\therefore DE = 4$$

$$A_{ABCE} = A_{ABCD} - A_{ADE} = 12^2 - \frac{12 \cdot 4}{2} = 144 - 24 = 120$$

Portanto, a área do trapézio ABCE é 120 cm².

48. Planificando a superfície lateral do reservatório, obtemos um retângulo de altura de 15 m e base 2πR, em que R é a medida do raio da base do cilindro.



$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{15}{2\pi R} \quad (I)$$

Calculando tg α:

$$\begin{cases} \sin \alpha = \frac{3}{5} \\ \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \end{cases} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{4}{5},$$

$$\text{para } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Assim: } \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4} \quad (II)$$

Substituindo (II) em (I), obtemos:

$$\frac{3}{4} = \frac{15}{2\pi R} \Rightarrow R = \frac{10}{\pi}$$

Logo, o raio da base do cilindro mede $\frac{10}{\pi}$ m ou aproximadamente 3,18 m.

49. Calculamos usando a redução ao 1º quadrante.

a) $\operatorname{tg} 135^\circ = -\operatorname{tg} 45^\circ = -1$

b) $\operatorname{tg} 240^\circ = \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$

c) $\operatorname{tg} 330^\circ = -\operatorname{tg} 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

d) $\operatorname{tg} \frac{5\pi}{3} = -\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$

e) $\operatorname{tg} \frac{5\pi}{4} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$

f) $\operatorname{tg} \frac{11\pi}{4} = -\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = -1$

g) $\operatorname{tg} \frac{20\pi}{3} = -\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$

h) $\operatorname{tg} \frac{17\pi}{6} = -\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

50. Para $x = 60^\circ$:

$$E = \frac{\operatorname{tg} 2x + \operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} 4x} = \frac{\operatorname{tg} 120^\circ + \operatorname{tg} 180^\circ}{\operatorname{tg} 240^\circ}$$

- 120° é correspondente de 60° e pertence ao 2º quadrante. Logo:

$$\operatorname{tg} 120^\circ = -\operatorname{tg} 60^\circ = -\sqrt{3}$$

- 240° é correspondente de 60° e pertence ao 3º quadrante. Logo:

$$\operatorname{tg} 240^\circ = \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$$

Assim:

$$E = \frac{-\sqrt{3} + 0}{\sqrt{3}} = -1$$

51. a) $\operatorname{tg} (-45^\circ) = -\operatorname{tg} 45^\circ = -1$


b) $\operatorname{tg} (-120^\circ) = -\operatorname{tg} 120^\circ = -(-\sqrt{3}) = \sqrt{3}$

c) $\operatorname{tg} (-300^\circ) = -\operatorname{tg} 300^\circ = -(-\sqrt{3}) = \sqrt{3}$


52. a) $E = \frac{\operatorname{tg} \alpha - (-\operatorname{tg} \alpha)}{-\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha} = \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{-2\operatorname{tg} \alpha} = -1$

$$\begin{aligned} \text{b) } E &= \frac{\operatorname{tg} (180^\circ + x) + \operatorname{tg} (180^\circ - x) + \operatorname{tg} (360^\circ - x)}{\operatorname{sen} (360^\circ - x)} = \\ &= \frac{\operatorname{tg} x + (-\operatorname{tg} x) + (-\operatorname{tg} x)}{-\operatorname{sen} x} = \\ &= \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{sen} x} = \frac{\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}}{\operatorname{sen} x} = \frac{1}{\cos x} \end{aligned}$$

53. Os arcos trigonométricos de 33° e 213° têm extremidades simétricas em relação ao centro da circunferência e, portanto, os prolongamentos dos raios que passam por essas extremidades interceptam o eixo das tangentes no mesmo ponto. Logo: $\operatorname{tg} 213^\circ = \operatorname{tg} 33^\circ$



54. Do enunciado temos:




$$\operatorname{tg} (180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha = \frac{BC}{AB}$$

$$-\operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{30} \Rightarrow h = -30 \operatorname{tg} \alpha$$

Alternativa b.

55. Do enunciado temos:



$$\operatorname{tg}(360^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha = 1,5$$

$$\operatorname{tg}(360^\circ - \alpha) = \frac{AB}{BO} \Rightarrow 1,5 = \frac{12}{r}$$

$$\therefore r = 8$$

Portanto, o raio mede 8 cm.

56. Sabemos que $\operatorname{tg} \alpha = -2,6$ e $\alpha + \beta = 180^\circ$.

a) $\alpha + \beta = 180^\circ \Rightarrow \beta = 180^\circ - \alpha$

$$\operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha = 2,6$$

Logo, $\operatorname{tg} \beta = 2,6$.

b) $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \operatorname{tg} 180^\circ = 0$

c) $\operatorname{tg}(2\alpha + \beta) = \operatorname{tg}(2\alpha + 180^\circ - \alpha) = \operatorname{tg}(180^\circ + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha = -2,6$

Logo, $\operatorname{tg}(2\alpha + \beta) = -2,6$.

57. a) Os valores de x , com $0 \leq x < 2\pi$, para os quais

$$\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ são } x = \frac{\pi}{4}$$

ou

$$x = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

Logo, $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$.

b) Os valores de x , com $0 \leq x < 2\pi$, para os quais

$$\operatorname{cos} x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ são } x = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \text{ ou}$$

$$x = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

Logo, $S = \left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$.

c) Os valores de x , com $0 \leq x < 2\pi$, para os quais

$$\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ são } x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

Logo, $S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right\}$.

d) Os valores de x , com $0 \leq x < 2\pi$, para os quais

$$\operatorname{cos} x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ são } x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} \text{ ou}$$

$$x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

Logo, $S = \left\{ \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right\}$.

e) Os valores de x , com $0 \leq x < 2\pi$, para os quais

$$\operatorname{cos} x = \frac{1}{2} \text{ são } x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

Logo, $S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$.

f) Os valores de x , com $0 \leq x < 2\pi$, para os quais

$$\operatorname{sen} x = -\frac{1}{2} \text{ são } x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \text{ ou}$$

$$x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

Logo, $S = \left\{ \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$.

g) O valor de x , com $0 \leq x < 2\pi$, para o qual

$$\operatorname{sen} x = -1 \text{ é } x = \frac{3\pi}{2}$$

Logo, $S = \left\{ \frac{3\pi}{2} \right\}$.

h) O valor de x , com $0 \leq x < 2\pi$, para o qual

$$\operatorname{cos} x = 1 \text{ é } x = 0$$

Logo, $S = \{0\}$.

i) Os valores de x , com $0 \leq x < 2\pi$, para os quais $\operatorname{sen} x = 0$ são $x = 0$ ou $x = \pi$.

Logo, $S = \{0, \pi\}$.

j) Não existe x tal que $\operatorname{sen} x = 3$. Logo, $S = \emptyset$.

k) Não existe x tal que $\operatorname{cos} x = -2$. Logo, $S = \emptyset$.

l) $\operatorname{tg} x = \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$

Logo, $S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\}$.

m) $\operatorname{tg} x = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$

Logo, $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right\}$.

n) $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3} \Rightarrow x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \text{ ou}$

$$x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

Logo, $S = \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$.

o) $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} \text{ ou}$

$$x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

Logo, $S = \left\{ \frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$.

58. a) Na primeira volta do sentido positivo, temos:

$$\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

Assim, no universo \mathbb{R} , o conjunto S da equação é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + k \cdot 2\pi \text{ ou} \right.$$

$$\left. x = \frac{3\pi}{4} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

e) Na primeira volta do sentido positivo, temos:

$$\operatorname{cos} x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

Assim, no universo \mathbb{R} , o conjunto S da equação é

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi \text{ ou} \right.$$


$$\left. x = \frac{5\pi}{3} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

i) Na primeira volta do sentido positivo, temos:
 $\text{sen } x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = \pi$
 Assim, no universo \mathbb{R} , o conjunto S da equação é
 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\}$.

m) Na primeira volta do sentido positivo, temos:
 $\text{tg } x = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{7\pi}{6}$
 Assim, no universo \mathbb{R} , o conjunto S da equação é:
 $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{6} + k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\right\}$.

n) Na primeira volta do sentido positivo, temos:
 $\text{tg } x = -\sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{3}$
 Assim, no universo \mathbb{R} , o conjunto S da equação é:
 $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{2\pi}{3} + k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\right\}$.


59. a) $\cos^2 x = \frac{1}{4} \Rightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \text{ ou } \cos x = \frac{1}{2}$



$\therefore x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{3}$


Logo, $S = \left\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$.

b) $\cos^2 x = 1 \Rightarrow \cos x = 1 \text{ ou } \cos x = -1$



$\therefore x = 0 \text{ ou } x = \pi$
 Logo, $S = \{0, \pi\}$.


c) $\cos^2 x = 1 \Rightarrow \cos x = 1 \text{ ou } \cos x = -1$



$\therefore x = 0 \text{ ou } x = \pi \text{ ou } x = 2\pi$

Logo, $S = \{0, \pi, 2\pi\}$.


d) $\text{sen}^2 x = \frac{1}{4} \Rightarrow \text{sen } x = -\frac{1}{2} \text{ ou } \text{sen } x = \frac{1}{2}$



$\therefore x = -\frac{5\pi}{6} \text{ ou } x = -\frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{\pi}{6}$

Logo, $S = \left\{-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right\}$.


e) $|\text{sen } x| = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \text{sen } x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$



Assim, nas infinitas voltas, o conjunto solução é dado por:

$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\right\}$

60. $\text{sen}^2 x = \frac{3}{4} \Rightarrow \text{sen } x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ou } \text{sen } x = \frac{\sqrt{3}}{2}$




$\therefore x = 60^\circ \text{ ou } x = 120^\circ \text{ ou } x = 240^\circ \text{ ou } x = 300^\circ$

$x = 420^\circ \text{ ou } x = 480^\circ \text{ ou } x = 600^\circ \text{ ou } x = 660^\circ$


Logo, $S = \{60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ, 420^\circ, 480^\circ, 600^\circ, 660^\circ\}$.

61. Prolongando o raio que passa pelo ponto de ordenada $\frac{1}{2}$ do eixo das tangentes, determinamos dois pontos, P e Q, sobre a circunferência trigonométrica abaixo.



Logo, em cada volta dessa circunferência a equação possui 2 raízes e, portanto, nas 3 voltas representadas pelo intervalo $[0, 6\pi[$ a equação possui 6 raízes.


62. $\text{sen } x = \cos x$



$$\therefore x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{4}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}.$$

63. a) $\text{sen } x = \text{sen } \frac{\pi}{5}$




Para $0 \leq x < 2\pi$, temos:

$$\text{sen } x = \text{sen } \frac{\pi}{5} \Rightarrow x = \frac{\pi}{5} \text{ ou } x = \frac{4\pi}{5}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{\pi}{5}, \frac{4\pi}{5} \right\}.$$

- b) $\cos x = \cos \frac{\pi}{5}$




Para $0 \leq x < 2\pi$, temos:

$$\cos x = \cos \frac{\pi}{5} \Rightarrow x = \frac{\pi}{5} \text{ ou } x = \frac{9\pi}{5}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{\pi}{5}, \frac{9\pi}{5} \right\}.$$

- c) $\text{tg } x = \text{tg } \frac{\pi}{5}$



Para $0 \leq x < 2\pi$, temos:

$$S = \left\{ \frac{\pi}{5}, \frac{6\pi}{5} \right\}$$

64. a) $2 \text{sen}(\pi - x) - \sqrt{3} \cos(\pi + x) = \text{sen}(-x)$, para $0 \leq x \leq 2\pi$

$$2 \text{sen } x - \sqrt{3}(-\cos x) = -\text{sen } x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3 \text{sen } x = -\sqrt{3} \cos x$$

$$\therefore \frac{\text{sen } x}{\cos x} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \text{tg } x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore x = \frac{5\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{11\pi}{6}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}.$$

- b) Além das raízes na primeira volta, obtidas no item anterior, a equação $\text{tg } x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ possui as seguintes raízes na segunda volta:

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi = \frac{17\pi}{6}$$

$$\text{ou } x = \frac{11\pi}{6} + 2\pi = \frac{23\pi}{6}$$


$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}, \frac{23\pi}{6} \right\}.$$

- c) Como $\text{tg } x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, temos:

$$x = \frac{5\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{5\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

65. Supondo α como na figura abaixo, temos:



$$\text{sen } \alpha = \frac{h}{30} \Rightarrow h = 30 \text{ sen } \alpha$$

Sabendo que a área do paralelogramo é 600 m^2 , temos:

$$40 \cdot h = 600 \Rightarrow 40 \cdot 30 \text{ sen } \alpha = 600$$

$$\therefore \text{sen } \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\text{Logo, } \alpha = \frac{\pi}{6} \text{ ou } \alpha = \frac{5\pi}{6}.$$

(Note que os dois valores convêm como resposta. Um para o ângulo agudo e o outro para o ângulo obtuso formado pelos lados consecutivos do paralelogramo.)

66. a) Os valores de t para os quais a altura do eixo do pedal foi de 16 cm podem ser obtidos pela equação:

$$16 = 16 - 6 \text{sen}(2\pi t) \Rightarrow 6 \text{sen}(2\pi t) = 0$$

$$\therefore \text{sen}(2\pi t) = 0$$

$$\therefore 2\pi t = 0 + k\pi$$

$$\therefore t = \frac{k}{2}, \text{ com } k \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 60\}$$

Observe que, como o tempo máximo é 30 segundos, o valor máximo de k deve ser 60 .

b) Observando a expressão $h(t) = 16 - 6 \text{sen}(2\pi t)$, concluímos que a altura máxima ocorre quando $6 \text{sen}(2\pi t)$ é mínimo, ou seja, quando $\text{sen}(2\pi t) = -1$. Logo:

$$\therefore 2\pi t = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$


$$\therefore t = \frac{3}{4} + k, \text{ com } k \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 29\}$$

c) Uma volta completa ocorre quando:

$$2\pi t = 2\pi \Rightarrow t = 1$$

Ou seja, o pedal realiza uma volta completa a cada 1 segundo.

67. A medida do ângulo agudo \widehat{OAB} é máxima na posição esquematizada a seguir:



$$\text{Nessa posição: } \text{tg } \alpha = \frac{r}{r\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Logo, $\alpha = 30^\circ$.

$$68. \text{ a) } (2 \text{sen } x - \sqrt{3})(2 \text{cos } x - \sqrt{2}) = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow 2 \text{sen } x - \sqrt{3} = 0 \text{ ou } 2 \text{cos } x - \sqrt{2} = 0$$

$$\therefore \text{sen } x = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ou } \text{cos } x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Para $0 \leq x < 2\pi$, concluímos:

$$\bullet \text{sen } x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3}$$

$$\bullet \text{cos } x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{7\pi}{4}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{7\pi}{4} \right\}.$$

$$\text{b) } 2 \cdot \text{sen } x \cdot \text{cos } x + \text{sen } x = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{sen } x(2 \text{cos } x + 1) = 0$$

$$\therefore \text{sen } x = 0 \text{ ou } 2 \text{cos } x + 1 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{sen } x = 0 \text{ ou } \text{cos } x = -\frac{1}{2}$$

Para $0 \leq x < 2\pi$, concluímos:

$$\bullet \text{sen } x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = \pi$$

$$\bullet \text{cos } x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ 0, \pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\}.$$

$$\text{c) } \text{tg}^2 x - \text{tg } x = 0$$

Para $t = \text{tg } x$, temos:

$$t^2 - t = 0 \Rightarrow t(t - 1) = 0$$

$$\therefore t = 0 \text{ ou } t = 1$$

Assim:

$$\bullet \text{tg } x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = \pi$$

$$\bullet \text{tg } x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{4}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ 0, \pi, \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}.$$

$$\text{d) } (\text{tg } x - \sqrt{3})(\text{tg}^2 x - 1) = 0 \Rightarrow \text{tg } x - \sqrt{3} = 0 \text{ ou } \\ \text{tg}^2 x - 1 = 0$$

$$\therefore \text{tg } x = \sqrt{3} \text{ ou } \text{tg } x = 1 \text{ ou } \text{tg } x = -1$$

Assim, temos:


$$\bullet \text{tg } x = \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3}$$

$$\bullet \text{tg } x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{4}$$

$$\bullet \text{tg } x = -1 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{7\pi}{4}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}.$$


69. a) Representando na circunferência trigonométrica as raízes obtidas no item a do exercício anterior, temos:



Assim, nas infinitas voltas, o conjunto solução é dado por:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3} + k \cdot 2\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{4} + k \cdot 2\pi \text{ ou } x = \frac{7\pi}{4} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$


- b) Representando na circunferência trigonométrica as raízes obtidas no item b do exercício anterior, temos:



Assim, nas infinitas voltas, o conjunto solução é dado por:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3} + k \cdot 2\pi \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

- c) Representando na circunferência trigonométrica as raízes obtidas no item c do exercício anterior, temos:



Assim, nas infinitas voltas, o conjunto solução é dado por:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

70. Dada a equação $4x^2 + 4x \operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha = 0$, temos:

$$\Delta = (4 \operatorname{sen} \alpha)^2 - 4 \cdot 4 \cdot \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\therefore \Delta = 16 \operatorname{sen}^2 \alpha - 16 \cdot \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\therefore \Delta = 16 \operatorname{sen} \alpha \cdot (\operatorname{sen} \alpha - \cos \alpha)$$

Como a equação possui duas raízes reais e iguais, devemos ter $\Delta = 0$. Assim:

$$16 \operatorname{sen} \alpha (\operatorname{sen} \alpha - \cos \alpha) = 0$$

$$\therefore 16 \operatorname{sen} \alpha = 0 \text{ ou } \operatorname{sen} \alpha - \cos \alpha = 0$$

$$\therefore \operatorname{sen} \alpha = 0 \text{ ou } \operatorname{sen} \alpha = \cos \alpha$$

$$\therefore \alpha = 0 \text{ ou } \alpha = \pi \text{ ou } \alpha = \frac{\pi}{4} \text{ ou } \alpha = \frac{5\pi}{4}$$

71. a) Fazendo a mudança de variável $\operatorname{sen} x = y$, temos:

$$2y^2 + y - 1 = 0 \Rightarrow y = -1 \text{ ou } y = \frac{1}{2}$$

Retornando à variável original, obtemos:

$$\bullet \operatorname{sen} x = -1 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{2}$$

ou

$$\bullet \operatorname{sen} x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6}$$

Assim, temos como conjunto solução:

$$S = \left\{ \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$$

- b) Fazendo a mudança de variável $\cos x = y$, temos:

$$2y^2 - 3y - 2 = 0 \Rightarrow y = 2 \text{ ou } y = -\frac{1}{2}$$

Retornando à variável original, obtemos:

$$\bullet \cos x = 2 \text{ (não convém)}$$

ou

$$\bullet \cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3}$$

Assim, temos como conjunto solução:

$$S = \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\}$$

- c) Fazendo a mudança de variável $\operatorname{tg} x = y$, temos:

$$4y^2 + \sqrt{3}y = y^2 + 3\sqrt{3}y + 3 \Rightarrow 3y^2 - 2\sqrt{3}y - 3 = 0$$

$$\therefore y = \sqrt{3} \text{ ou } y = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

Retornando à variável original, obtemos:

$$\bullet \operatorname{tg} x = \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3}$$

ou

$$\bullet \operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x = \frac{5\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{11\pi}{6}$$

Assim, temos como conjunto solução:

$$S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$$

- d) Substituindo $\cos^2 x$ por $1 - \operatorname{sen} x$, temos:

$$1 - \operatorname{sen}^2 x - 4 \operatorname{sen} x + 4 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \operatorname{sen}^2 x + 4 \operatorname{sen} x - 5 = 0$$

Fazendo a mudança de variável $\operatorname{sen} x = y$, temos:

$$y^2 + 4y - 5 = 0 \Rightarrow y = -5 \text{ ou } y = 1$$

Retornando à variável original, obtemos:

$$\bullet \operatorname{sen} x = -5 \text{ (não convém)}$$

ou

$$\bullet \operatorname{sen} x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$$

Assim, temos como conjunto solução:

$$S = \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$$

72. O valor mínimo de uma função polinomial do 2º grau é a ordenada do vértice da parábola correspondente. Assim:

$$y_v = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{\operatorname{sen}^2 \alpha - 4 \cos \alpha}{4} = -\frac{1}{4}$$

$$\therefore \operatorname{sen}^2 \alpha - 4 \cos \alpha = 1$$

Substituindo $\operatorname{sen}^2 \alpha$ por $1 - \cos^2 \alpha$, temos:


$$1 - \cos^2 \alpha - 4 \cos \alpha = 1$$

$$\therefore \cos^2 \alpha + 4 \cos \alpha = 0 \Rightarrow \cos \alpha \cdot (\cos \alpha + 4) = 0$$

$$\therefore \cos \alpha = 0 \text{ ou } \cos \alpha = -4 \text{ (não convém)}$$


$$\text{Logo, } \alpha = \frac{\pi}{2} \text{ ou } \alpha = \frac{3\pi}{2}$$

73. a) $\text{sen } x > \frac{\sqrt{3}}{2}$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{2\pi}{3} \right\}$.

b) $\text{sen } x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} \leq x < 2\pi \right\}$.

c) $\text{cos } x \leq -\frac{1}{2}$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{4\pi}{3} \right\}$.

d) $\text{cos } x > \frac{\sqrt{3}}{2}$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{11\pi}{6} < x < 2\pi \right\}$.

e) $\text{cos } x \leq 0$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \right\}$.

f) $\text{sen } x < 0$




Logo, $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid \pi < x < 2\pi \}$.

g) $\text{cos } x > 0$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi \right\}$.

h) $\text{sen } x \leq \frac{1}{2}$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} \leq x < 2\pi \right\}$.

i) $\cos x < \frac{\sqrt{2}}{2}$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x < \frac{7\pi}{4} \right\}$.

j) $\sin x \leq -\frac{1}{2}$



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{7\pi}{6} \leq x \leq \frac{11\pi}{6} \right\}$.

k) $\cos x > -\frac{1}{2}$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{4\pi}{3} < x < 2\pi \right\}$.

l) $\sin x > 1$


Não existem valores de x que satisfaçam essa inequação, pois $-1 \leq \sin x \leq 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$.
Logo, $S = \emptyset$.

m) $\cos x < 1$




Logo, $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2\pi \}$

n) $\sin x \neq -\frac{\sqrt{3}}{2}$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 2\pi \text{ e } x \neq \frac{4\pi}{3} \text{ e } x \neq \frac{5\pi}{3} \right\}$.

o) $\text{tg } x > \sqrt{3}$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{4\pi}{3} < x < \frac{3\pi}{2} \right\}$.

p) $\text{tg } x \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{\pi}{2} < x \leq \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi \right\}$.

q) $\text{tg } x < -\sqrt{3}$



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} < x < \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x < \frac{5\pi}{3} \right\}$.

74. a) Basta adicionar a expressão $k \cdot 2\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, a cada extremo do intervalo obtido no item a do exercício anterior:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi < x < \frac{2\pi}{3} + k \cdot 2\pi, \right. \\ \left. \text{com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

- c) Basta adicionar a expressão $k \cdot 2\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, a cada extremo do intervalo obtido no item c do exercício anterior:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{2\pi}{3} + k \cdot 2\pi \leq x \leq \frac{4\pi}{3} + k \cdot 2\pi, \right. \\ \left. \text{com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

- d) Como os números $\frac{11\pi}{6}$ e $-\frac{\pi}{6}$ estão associados ao mesmo ponto da circunferência trigonométrica, o conjunto solução da inequação do item d do exercício anterior, no universo \mathbb{R} , pode ser dado por:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi < x < \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi, \right. \\ \left. \text{com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$


- o) Basta adicionar a expressão $k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, a um dos intervalos obtidos no item o do exercício anterior:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

- p) Basta adicionar a expressão $k \cdot 2\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, aos extremos do intervalo $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6} \right]$ obtido no item p do exercício anterior:


$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} + k\pi < x \leq \frac{7\pi}{6} + k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

75. a) $\text{sen } x < \text{sen } \frac{\pi}{9}$



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{9} \text{ ou } \frac{8\pi}{9} < x < 2\pi \right\}$.

b) $\text{cos } x \geq \text{cos } \frac{\pi}{7}$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{7} \text{ ou } \frac{13\pi}{7} \leq x < 2\pi \right\}$.


76. a)
$$\begin{cases} \text{cos } x < -\frac{1}{2} & \text{(I)} \\ \text{sen } x \geq \frac{1}{2} & \text{(II)} \end{cases}$$

Resolvendo cada uma das inequações do sistema, temos:


(I) $\text{cos } x < -\frac{1}{2}$



(II) $\text{sen } x \geq \frac{1}{2}$



Fazendo a intersecção dos conjuntos soluções de (I) e (II), vamos ter:




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{2\pi}{3} < x \leq \frac{5\pi}{6} \right\}$.


b) $\begin{cases} \text{sen } x > \frac{\sqrt{2}}{2} & \text{(I)} \\ \text{sen } x < \frac{\sqrt{3}}{2} & \text{(II)} \end{cases}$

Resolvendo (I) e (II), temos:


(I) $\text{sen } x > \frac{\sqrt{2}}{2}$



(II) $\text{sen } x < \frac{\sqrt{3}}{2}$




Fazendo a intersecção dos conjuntos soluções de (I) e (II), vamos ter:




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{3\pi}{4} \right\}$.

c) $\begin{cases} \text{tg } x > 1 \\ \text{tg } x \leq \sqrt{3} \end{cases}$



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{4} < x \leq \frac{4\pi}{3} \right\}$.

d) $\begin{cases} \text{tg } x \geq 1 \\ \text{sen } x > \frac{1}{2} \end{cases}$



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{2} \right\}$.

77. a) Basta adicionar a expressão $k \cdot 2\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, a cada extremo do intervalo obtido no item a do exercício anterior:

$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{2\pi}{3} + k \cdot 2\pi < x \leq \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$

d) Basta adicionar a expressão $k \cdot 2\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, a cada extremo do intervalo obtido no item d do exercício anterior:


$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} + k \cdot 2\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$

78. a) A dupla desigualdade é equivalente ao sistema


$$\begin{cases} \text{sen } x > 0 & \text{(I)} \\ \text{sen } x < \frac{\sqrt{3}}{2} & \text{(II)} \end{cases}$$

Resolvendo (I) e (II), temos:


(I) $\text{sen } x > 0$



(II) $\text{sen } x < \frac{\sqrt{3}}{2}$



Fazendo a intersecção dos conjuntos soluções de (I) e (II), obtemos:




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \pi \right\}$.

b) A dupla desigualdade é equivalente ao sistema


$$\begin{cases} \cos x \geq \frac{1}{2} & \text{(I)} \\ \cos x < \frac{\sqrt{2}}{2} & \text{(II)} \end{cases}$$

Resolvendo (I) e (II), temos:


(I) $\cos x \geq \frac{1}{2}$



(II) $\cos x < \frac{\sqrt{2}}{2}$



Fazendo a intersecção dos conjuntos soluções de (I) e (II), obtemos:



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} \leq x < \frac{7\pi}{4} \right\}$.


c) $|\text{sen } x| < \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} < \text{sen } x < \frac{1}{2}$

Essa dupla desigualdade é equivalente ao sistema


$$\begin{cases} \text{sen } x > -\frac{1}{2} & \text{(I)} \\ \text{sen } x < \frac{1}{2} & \text{(II)} \end{cases}$$

Resolvendo (I) e (II), temos:


(I) $\text{sen } x > -\frac{1}{2}$



(II) $\text{sen } x < \frac{1}{2}$




Fazendo a intersecção dos conjuntos soluções de (I) e (II), obtemos:




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{11\pi}{6} < x < 2\pi \right\}$.

d)




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{4} < x \leq \frac{4\pi}{3} \right\}$.

e)




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \pi \leq x < \frac{5\pi}{4} \right\}$.

f)



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x \leq \frac{5\pi}{4} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x < 2\pi \right\}$.

79. Sendo x o comprimento da rampa, em centímetro, esquematizamos a situação:



Assim: $\text{sen } \alpha = \frac{90}{x}$


Como devemos ter $x \geq 180$, concluímos que

$\text{sen } \alpha \leq \frac{1}{2}$.

Ou seja, $\alpha \leq 30^\circ$.

Alternativa a.

80. Esquematizando a situação, temos:



Pela figura, observamos que, no trecho \widehat{PQ} , a medida α do ângulo agudo \widehat{BMN} é mínima quando o barco está no ponto P e máxima quando está em Q . Logo, $\widehat{PMN} < \alpha < \widehat{QMN}$.

Temos:

$$\operatorname{tg}(\widehat{PMN}) = \frac{10\sqrt{3}}{30} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \widehat{PMN} = 30^\circ$$

$$\operatorname{tg}(\widehat{QMN}) = \frac{30\sqrt{3}}{30} = \sqrt{3} \Rightarrow \widehat{QMN} = 60^\circ$$


Assim: $30^\circ < \alpha < 60^\circ$

Alternativa c.

81. a) $2\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x < 0$.

Fazendo a mudança de variável $\operatorname{sen} x = t$, obtemos a inequação $2t^2 - t < 0$.


A variação de sinal da função $f(t) = 2t^2 - t$ é esquematizada por:



Assim, $f(t) < 0 \Rightarrow 0 < t < \frac{1}{2}$.

Retornando à variável original, temos

$0 < \operatorname{sen} x < \frac{1}{2}$ e, portanto:




Concluimos, então:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \pi \right\}$$

b) $2 \cdot \cos^2 x - \sqrt{3} \cos x \leq 0$

Fazendo a mudança de variável $\cos x = t$, obtemos:


$$2t^2 - \sqrt{3}t \leq 0$$



Assim, $0 \leq t \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Retornando à variável original, temos:

$$0 \leq \cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$



Portanto: $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{ ou}$

$$\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{11\pi}{6} \right\}$$

c) $2\operatorname{sen}^2 x + 5\cos x - 4 > 0 \Rightarrow$


$$\Rightarrow 2(1 - \cos^2 x) + 5\cos x - 4 > 0$$

$$\therefore -2\cos^2 x + 5\cos x - 2 > 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 x - 5\cos x + 2 < 0$$

Fazendo a mudança de variável $\cos x = t$, obtemos a inequação $2t^2 - 5t + 2 < 0$.

A variação de sinal da função $f(t) = 2t^2 - 5t + 2$ é esquematizada por:




Assim, $f(t) < 0 \Rightarrow \frac{1}{2} < t < 2$.

Retornando à variável original, temos:

$\frac{1}{2} < \cos x < 2$, ou seja, $\cos x > \frac{1}{2}$, cujas

soluções são representadas por:



Concluimos, então:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x < 2\pi \right\}$$

d) $2 \cdot \cos^2 x - \sin x - 1 \leq 0$


Substituindo $\cos^2 x$ por $1 - \sin^2 x$, temos:

$$2 \cdot (1 - \sin^2 x) - \sin x - 1 \leq 0$$

$$2\sin^2 x + \sin x - 1 \geq 0$$

Fazendo a mudança de variável $\sin x = t$, obtemos:


$$2t^2 + t - 1 \geq 0$$



Assim: $t \leq -1$ ou $t \geq \frac{1}{2}$

Retornando à variável original, temos:

$$\sin x \leq -1 \text{ ou } \sin x \geq \frac{1}{2}$$




Portanto: $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{3\pi}{2} \text{ ou } \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6} \right\}$

e) $(2 \cdot \sin x + 1)(2 \cdot \sin x - \sqrt{3}) \geq 0$

Fazendo a mudança de variável $\sin x = t$, obtemos:


$$(2t + 1)(2t - \sqrt{3}) \geq 0$$



Assim: $t \leq -\frac{1}{2}$ ou $t \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$

Retornando à variável original, temos:

$$\sin x \leq -\frac{1}{2} \text{ ou } \sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$$



Portanto: $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{7\pi}{6} \leq x \leq \frac{11\pi}{6} \right\}$


f) $\frac{2 \sin x - 1}{2 \sin x - \sqrt{3}} \leq 0$

Fazendo $\sin x = t$, obtemos a inequação

$$\frac{2t - 1}{2t - \sqrt{3}} \leq 0.$$

Estudando a variação de sinal das funções


$$f(t) = 2t - 1, g(t) = 2t - \sqrt{3} \text{ e } \frac{f}{g}, \text{ temos:}$$



	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	
f	-	+	+
g	-	-	+
$\frac{f}{g}$	+	-	+

$$\frac{f(t)}{g(t)} \leq 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq t < \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Logo, $\frac{1}{2} \leq \sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$; e, portanto:



Concluimos, então:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x \leq \frac{5\pi}{6} \right\}$$


g) $\frac{2 \cos x - 1}{2 \cos x + 1} > 0$


Fazendo $\cos x = t$, obtemos a inequação

$$\frac{2t - 1}{2t + 1} > 0.$$

Estudando a variação de sinal das funções


$$f(t) = 2t - 1, g(t) = 2t + 1 \text{ e } \frac{f}{g}, \text{ temos:}$$





$$\frac{f(t)}{g(t)} > 0 \Rightarrow t < -\frac{1}{2} \text{ ou } t > \frac{1}{2}$$

Logo, $\cos x < -\frac{1}{2}$ ou $\cos x > \frac{1}{2}$; e, portanto:



Concluimos, então:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x < 2\pi \right\}$$


h) $\text{tg}^2 x - \text{tg} x > 0$

Fazendo $\text{tg} x = t$, temos:

$$t^2 - t > 0$$


Estudando a variação de sinal de função

$f(t) = t^2 - t$, obtemos:



Assim, $f(t) > 0 \Rightarrow t < 0$ ou $t > 1$ e, portanto:

$$\text{tg} x < 0 \text{ ou } \text{tg} x > 1$$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x < \pi \text{ ou } \frac{5\pi}{4} < x < 2\pi \text{ e } x \neq \frac{\pi}{2} \text{ e } x \neq \frac{3\pi}{2} \right\}$

i) $(\text{tg} x - 1)(\text{tg}^2 x - 3) \leq 0$

Fazendo a mudança de variável $\text{tg} x = t$, obtemos:


$$(t - 1)(t^2 - 3) \leq 0$$



Logo, $t \leq -\sqrt{3}$ ou $1 \leq t \leq \sqrt{3}$.

Retornando à variável original, temos:

$$\text{tg} x \leq -\sqrt{3} \text{ ou } 1 \leq \text{tg} x \leq \sqrt{3}$$



Portanto: $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{\pi}{2} < x \leq \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{4} \leq x \leq \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x \leq \frac{5\pi}{3} \right\}$


$$\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{4} \leq x \leq \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x \leq \frac{5\pi}{3}$$

j) $\frac{\text{tg} x - 1}{\text{tg} x - \sqrt{3}} > 0$

Fazendo $\text{tg} x = t$, temos: $\frac{t - 1}{t - \sqrt{3}} > 0$


Estudando a variação de sinal das funções

$f(t) = t - 1$, $g(t) = t - \sqrt{3}$ e $\frac{f}{g}$, obtemos:



Assim, $\frac{f(t)}{g(t)} > 0 \Rightarrow t < 1$ ou $t > \sqrt{3}$ e, portanto:

$$\text{tg} x < 1 \text{ ou } \text{tg} x > \sqrt{3}$$



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{4} \text{ ou } \frac{4\pi}{3} < x < 2\pi \text{ e } x \neq \frac{\pi}{2} \text{ e } x \neq \frac{3\pi}{2} \right\}$.

82. d) Basta adicionar a expressão $k \cdot 2\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, a cada extremo dos intervalos obtidos no item d do exercício anterior:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{3\pi}{2} + k \cdot 2\pi \text{ ou } \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

- e) Basta adicionar a expressão $k \cdot 2\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, a cada extremo dos intervalos obtidos no item e do exercício anterior:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + k \cdot 2\pi \text{ ou } \frac{7\pi}{6} + k \cdot 2\pi \leq x \leq \frac{11\pi}{6} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

- i) Basta adicionar a expressão $k \cdot \pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, a cada extremo dos intervalos $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right]$ e $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3} \right]$ obtidos no item i do exercício anterior:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} + k \cdot \pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + k \cdot \pi \text{ ou } \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi < x \leq \frac{2\pi}{3} + k \cdot \pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Exercícios complementares

Exercícios técnicos

1. a) O comprimento da circunferência é $2\pi r = 30\pi$ e podemos calcular a medida, em grau, do arco da seguinte maneira:

$$30\pi \text{ ————— } 360^\circ$$

$$5\pi \text{ ————— } x$$

$$x = \frac{50\pi \cdot 360^\circ}{30\pi} = 60^\circ$$

Portanto, a medida, em grau, do arco é 60° .

- b) Podemos calcular a medida, em grau, do arco da seguinte maneira:


$$\text{rad} \quad \text{cm}$$

$$1 \text{ ————— } 2,5$$

$$x \text{ ————— } 2\pi$$

$$\therefore x = \frac{4\pi}{5} \text{ rad}$$

2. Sendo α o ângulo de medida do menor arco \widehat{CD} , E o ponto de intersecção entre $O'C$ e uma paralela a \overline{BC} que passe por O, e traçando $\overline{OO'}$, que divide α na metade, obtemos:



Analisando o triângulo $OO'E$, temos:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{2}{20} = 0,1 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} \approx 84^\circ$$

Portanto, α mede aproximadamente 168° .

3. a) A seqüência é dada por: $(40^\circ, 400^\circ, 760^\circ, \dots, 6.520^\circ)$
Seu termo geral é: $a_n = 40^\circ + (n - 1) \cdot 360^\circ$, com $n \in \mathbb{N}^*$ e $n \leq 19$

- b) Pelo item anterior, o último termo é 6.520° .

4. a) A seqüência é dada por:

$$\left(\frac{4\pi}{5}, \frac{14\pi}{5}, \frac{24\pi}{5}, \dots, \frac{104\pi}{5}, \frac{114\pi}{5}, \frac{124\pi}{5}, \dots, \frac{734\pi}{5} \right)$$

Seu termo geral é:

$$a_n = \frac{4\pi}{5} + (n - 1) \cdot 2\pi, \text{ com } n \in \mathbb{N}^* \text{ e } n \leq 74$$

- b) Pelo item anterior, o último termo é $\frac{734\pi}{5}$.

5. Como as expressões indicam medidas de dois arcos côngruos, podemos escrever:

$$3x - 45^\circ = 2x + 135^\circ + k \cdot 360^\circ, \text{ com } k \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore x = 180^\circ + k \cdot 360^\circ, \text{ com } k \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore x = 180^\circ (1 + 2k), \text{ com } k \in \mathbb{Z}$$

Alternativa e.

6. a) $2\pi : 6 = \frac{\pi}{3}$

$$x_A = 0 \text{ rad} \quad x_D = \pi \text{ rad}$$

$$x_B = \frac{\pi}{3} \text{ rad} \quad x_E = \frac{4\pi}{3} \text{ rad}$$

$$x_C = \frac{2\pi}{3} \text{ rad} \quad x_F = \frac{5\pi}{3} \text{ rad}$$

$$\text{Logo: } A(0), B\left(\frac{\pi}{3}\right), C\left(\frac{2\pi}{3}\right), D(\pi), E\left(\frac{4\pi}{3}\right), F\left(\frac{5\pi}{3}\right).$$

- b) x_C na 2^a e na 3^a voltas positivas.

$$\frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{8\pi}{3} \text{ (na } 2^\text{a} \text{ volta positiva)}$$


$$\frac{2\pi}{3} + 2 \cdot 2\pi = \frac{14\pi}{3} \text{ (na } 3^\text{a} \text{ volta positiva)}$$

Logo, as medidas procuradas associadas ao vértice C são $\frac{8\pi}{3}$ rad e $\frac{14\pi}{3}$ rad.

- c) x_F na 1ª e na 2ª voltas negativas.
 $\frac{5\pi}{3} - 2\pi = -\frac{\pi}{3}$ (na 1ª volta negativa)
 $\frac{5\pi}{3} - 2 \cdot 2\pi = -\frac{7\pi}{3}$ (na 2ª volta negativa)

Logo, as medidas procuradas associadas ao vértice F são $-\frac{\pi}{3}$ rad e $-\frac{7\pi}{3}$ rad.


7. O conjunto A é formado pelos números reais associados aos quatro pontos A, B, A' e B' da circunferência trigonométrica abaixo; e o conjunto B é formado pelas medidas associadas aos pontos A e A'.




Logo, o conjunto $A - B$ é formado pelos números reais associados aos pontos B e B'. A expressão geral desses números é $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$.

Alternativa a.

8. a) Na figura abaixo estão representadas as possíveis posições de P e de seus simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares.




Observe que, para cada ponto P de medida α , temos seu simétrico P' na seguinte posição:




Assim, o número real x associado ao simétrico de cada ponto P pode ser representado pela expressão: $x = \frac{\pi}{2} - \alpha$

- b) Na figura a seguir estão representadas as possíveis posições de P e de seus simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes pares.



Observe que, para cada ponto P de medida α , temos seu simétrico P' na seguinte posição:



Assim, o número real x associado ao simétrico de cada ponto P pode ser representado pela expressão: $x = \frac{3\pi}{2} - \alpha$

9. I.

a) Cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60° e a altura \overline{OM} também é bissetriz; logo, a medida do ângulo central \widehat{AOP} é 30° . Como a medida do ângulo central é a mesma do arco determinado, concluímos que, na primeira volta do sentido positivo, o arco \widehat{AP} mede 30° .

b) A medida do lado do triângulo OPQ é 1, pois é raio da circunferência trigonométrica. Como a altura \overline{OM} também é mediana, temos que M é ponto médio de \overline{PQ} e, portanto, $PM = \frac{1}{2}$. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo OMP, concluímos:

$$(OM)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1^2 \Rightarrow OM = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

- c) Do item b, temos $P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$. Como a abscissa e a ordenada de P são, respectivamente, o cosseno e o seno do arco \widehat{AP} , concluímos que:

$$\text{sen } 30^\circ = \frac{1}{2} \text{ e } \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

II.

- a) Cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60° ; logo, a medida do ângulo central \widehat{AOP} é 60° . Como a medida do ângulo central é a mesma do arco determinado, concluímos que, na primeira volta do sentido positivo, o arco \widehat{AP} mede 60° .

- b) A medida do lado do triângulo equilátero AOP é 1, pois é raio da circunferência trigonométrica. Como a altura \overline{PM} também é mediana, temos que M é ponto médio de \overline{OA} e, portanto, $OM = \frac{1}{2}$. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo OMP , concluímos:

$$(PM)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1^2 \Rightarrow PM = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

- c) Do item b, temos $P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Como a abscissa e a ordenada de P são, respectivamente, o cosseno e o seno do arco \widehat{AP} , concluímos que:

$$\text{sen } 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ e } \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

III.

- a) Os ângulos da base de um triângulo isósceles têm medidas iguais. Indicando por α a medida dos ângulos congruentes \widehat{AOP} e \widehat{QPO} , temos, do triângulo OPQ :

$$\alpha + \alpha + 90^\circ = 180^\circ \Rightarrow \alpha = 45^\circ$$

Portanto, o ângulo \widehat{AOP} mede 45° .

Como a medida do ângulo central é a mesma do arco determinado, concluímos que, na primeira volta do sentido positivo, o arco \widehat{AP} mede 45° .

- b) A hipotenusa do triângulo retângulo OPQ mede 1, pois é raio da circunferência trigonométrica, e os segmentos \overline{PQ} e \overline{OQ} são congruentes, pois são lados de um triângulo isósceles de base \overline{OP} . Indicando por ℓ a medida de cada um desses segmentos congruentes e aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo OPQ , temos:

$$\ell^2 + \ell^2 = 1^2 \Rightarrow \ell = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Assim: } PQ = OQ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- c) Do item b, temos $P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. Como a abscissa e a ordenada de P são, respectivamente, o cosseno e o seno do arco \widehat{AP} , concluímos que:

$$\text{sen } 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ e } \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

10. Para $x \in \mathbb{R}$, temos:

$$0 \leq |\text{sen } x| \leq 1$$

Portanto, o valor mínimo de f é zero.

11. A expressão $\frac{1}{|\cos x|}$ assume o valor mínimo quando o denominador $|\cos x|$ assume o valor máximo. Como o valor máximo de $|\cos x|$ é 1, concluímos que o valor mínimo de $\frac{1}{|\cos x|}$ é $\frac{1}{1} = 1$.

12. Vamos analisar cada um dos itens.

- a) $1.570^\circ = 130^\circ + 4 \cdot 360^\circ$. Ou seja, o ângulo está no 2º quadrante e, portanto, $\text{sen } 1.570^\circ$ é positivo. Afirmação falsa.

- b) $1.330^\circ = 250^\circ + 3 \cdot 360^\circ$. Ou seja, o ângulo está no 3º quadrante e, portanto, $\cos 1.330^\circ$ é negativo. Afirmação falsa.


- c) $\frac{44\pi}{5} = \frac{4\pi}{5} + 4 \cdot 2\pi$. Ou seja, o ângulo está no 2º quadrante e, portanto, $\cos \frac{44\pi}{5}$ é negativo. Afirmação falsa.

- d) $\frac{36\pi}{5} = \frac{6\pi}{5} + 3 \cdot 2\pi$. Ou seja, o ângulo está no 3º quadrante e, portanto, $\cos \frac{36\pi}{5}$ é negativo. Afirmação verdadeira.

- e) $\frac{13\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 3 \cdot 2\pi$. Ou seja, $\cos \frac{13\pi}{2}$ é nulo. Afirmação falsa.

Alternativa d.

13. Lembrando que $\pi \approx 3,14$ e $\frac{\pi}{2} \approx 1,57$, as posições de 1 e 3 na circunferência trigonométrica são, aproximadamente:



Observando a figura, temos:


I. Falsa, pois $\text{sen } 1 > \text{sen } 3$

II. Falsa, pois $\cos 1 > \cos 3$

III. Verdadeira, pois $\cos 1 < \text{sen } 1$

Alternativa c.

14. Sendo \overline{AD} a altura do triângulo ABC , relativa ao lado \overline{BC} , esquematizamos:



$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{a}{12} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{a}{12}$$

$$\therefore a = 6\sqrt{2}$$

Como ABD é isósceles de base \overline{AB} , temos que:

$$AD = BD = 6\sqrt{2}$$

Do triângulo ADC, obtemos:

$$\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \frac{6\sqrt{2}}{b} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{6\sqrt{2}}{b}$$

$$\therefore b = 2\sqrt{6}$$

Concluimos, então, que $BC = a + b = (6\sqrt{2} + 2\sqrt{6})$ cm.

15. Os 20 primeiros termos de ordem ímpar são:

$$a_1 = 5 \cdot 1 + \operatorname{sen} \left(1 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 5 + 1$$

$$a_3 = 5 \cdot 3 + \operatorname{sen} \left(3 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 15 - 1$$

$$a_5 = 5 \cdot 5 + \operatorname{sen} \left(5 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 25 + 1$$

...

$$a_{37} = 5 \cdot 37 + \operatorname{sen} \left(37 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 185 + 1$$


$$a_{39} = 5 \cdot 39 + \operatorname{sen} \left(39 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 195 - 1$$

Assim, a soma desses termos é dada por:

$$\begin{aligned} & 5 + 1 + 15 - 1 + 25 + 1 + \dots + 185 + 1 + 195 - 1 = \\ & = 5 + 15 + 25 + \dots + 185 + 195 = \\ & = \frac{(5 + 195) \cdot 20}{2} = 2.000 \end{aligned}$$


Alternativa d.

16. a) V, pois $\operatorname{sen} 145^\circ = \operatorname{sen} (180^\circ - 145^\circ) = \operatorname{sen} 35^\circ$ e $\operatorname{sen} 40^\circ > \operatorname{sen} 35^\circ$.
 b) V, pois $\cos 40^\circ$ é positivo e $\cos 230^\circ$ é negativo; portanto, $\cos 40^\circ > \cos 230^\circ$.
 c) V, pois $\operatorname{sen} 40^\circ$ é positivo e $\operatorname{sen} 320^\circ$ é negativo; portanto, $\operatorname{sen} 40^\circ > \operatorname{sen} 320^\circ$.
 d) F, pois $\cos 320^\circ = \cos (360^\circ - 320^\circ) = \cos 40^\circ$.
 e) V, pois, observando a circunferência trigonométrica, temos:



$$\therefore \operatorname{sen} 40^\circ < \cos 40^\circ$$

- f) F, pois, observando a circunferência trigonométrica, temos:



$$\operatorname{sen} 220^\circ > \cos 220^\circ$$

17. $2.370^\circ = 210^\circ + 6 \cdot 360^\circ$

$$\therefore \operatorname{sen} 2.370^\circ = \operatorname{sen} 210^\circ = -\operatorname{sen} 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

Alternativa b.

18.
$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \frac{4\pi}{3} \cdot \cos \frac{5\pi}{6} + \left(\operatorname{sen} \frac{7\pi}{4} \right)^2 &= \\ &= -\operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \cdot \left(-\cos \frac{\pi}{6} \right) + \left(-\operatorname{sen} \frac{\pi}{4} \right)^2 = \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 = \\ &= \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Alternativa c.


19. a) $E = \frac{\cos \alpha - \operatorname{sen} \alpha}{-\cos \alpha + \operatorname{sen} \alpha} = \frac{\cos \alpha - \operatorname{sen} \alpha}{-(\cos \alpha - \operatorname{sen} \alpha)} = -1$

b)
$$\begin{aligned} E &= \frac{1 - (-\cos \alpha)^2}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos^2 \alpha}{1 + \cos \alpha} = \\ &= \frac{(1 - \cos \alpha)(1 + \cos \alpha)}{(1 + \cos \alpha)} = 1 - \cos \alpha \end{aligned}$$

20.
$$\begin{aligned} E &= \frac{\operatorname{sen} x + \operatorname{sen}(\pi + x) + \operatorname{sen}(x - \pi)}{\operatorname{sen}(-x) + \operatorname{sen}(2\pi - x)} = \\ &= \frac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} x - \operatorname{sen} x}{-\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} x} = \\ &= -\frac{\operatorname{sen} x}{-2\operatorname{sen} x} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Alternativa c.

21.



No triângulo APC, temos:

$$\cos (180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha = \frac{AP}{13}$$

$$\therefore -\left(-\frac{5}{13}\right) = \frac{AP}{13} \Rightarrow AP = 5$$

No triângulo BPC, temos:

$$\cos (180^\circ - \beta) = -\cos \beta = \frac{BP}{15}$$

$$\therefore -\left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{BP}{15} \Rightarrow BP = 9$$

Assim: $AB = AP + BP = 5 + 9 = 14$

Portanto, o perímetro do triângulo ABC é:
 $15 \text{ cm} + 13 \text{ cm} + 14 \text{ cm} = 42 \text{ cm}$

22. Pelo enunciado, temos:

$$\cos \alpha + 2\operatorname{sen} \alpha = 1 \Rightarrow \cos \alpha = 1 - 2\operatorname{sen} \alpha \quad (\text{I})$$

Pela relação fundamental da Trigonometria, temos:

$$\cos^2 \alpha + \operatorname{sen}^2 \alpha = 1 \Rightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \alpha} \quad (\text{II})$$

Substituindo (II) em (I), obtemos:

$$\pm \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \alpha} = 1 - 2\operatorname{sen} \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\pm \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \alpha})^2 = (1 - 2\operatorname{sen} \alpha)^2$$

$$\therefore 1 - \operatorname{sen}^2 \alpha = 1 - 4\operatorname{sen} \alpha + 4\operatorname{sen}^2 \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 5\operatorname{sen}^2 \alpha - 4\operatorname{sen} \alpha = 0$$

$$\therefore \operatorname{sen} \alpha (5\operatorname{sen} \alpha - 4) = 0$$


$$\therefore \operatorname{sen} \alpha = 0 \text{ (não convém)} \text{ ou } \operatorname{sen} \alpha = \frac{4}{5} \quad (\text{III})$$

Substituindo (III) em (I), temos:

$$\cos \alpha = 1 - 2 \cdot \frac{4}{5} = -\frac{3}{5}$$

Como $\sin \alpha > 0$ e $\cos \alpha < 0$, concluímos que α é uma medida do 2º quadrante.

23. Sendo d a distância procurada, esquematizamos:



Pela relação fundamental, $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, calculamos $\sin \alpha$:

$$\sin^2 \alpha + \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 = 1 \Rightarrow \sin^2 \alpha = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$$

$$\therefore \sin \alpha = \pm \frac{2}{3}$$

Como $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, só nos interessa o valor positivo do seno, isto é:

$$\sin \alpha = \frac{2}{3}$$

Do triângulo ADE, obtemos:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \frac{d}{20} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{d}{20}$$

$$\therefore \frac{2}{3} = \frac{d}{20} \Rightarrow d = \frac{40}{3}$$

Portanto, a distância do ponto D à reta \overleftrightarrow{AB} é $\frac{40}{3}$ cm.

24. Elevando ambos os membros ao quadrado, temos:

$$y^2 = (\sin x + \cos x)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y^2 = \sin^2 x + 2 \cdot \sin x \cdot \cos x + \cos^2 x$$

$$\therefore y^2 = (\sin^2 x + \cos^2 x) + 2 \cdot (\sin x \cdot \cos x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y^2 = 1 + 2 \cdot \frac{1}{8}$$

$$\therefore y^2 = \frac{5}{4}$$


$$\therefore y = \frac{\sqrt{5}}{2} \text{ ou } y = -\frac{\sqrt{5}}{2}$$

Alternativa b.

25. Como $\sin 70^\circ = \cos 20^\circ$ e $\sin 50^\circ = \cos 40^\circ$, temos:

$$E = \sin^2 20^\circ + \sin^2 40^\circ + \sin^2 50^\circ + \sin^2 70^\circ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E = \sin^2 20^\circ + \sin^2 40^\circ + \cos^2 40^\circ + \cos^2 20^\circ$$



$$\therefore E = 2$$

26. Como $\cos 140^\circ = -\cos 40^\circ$, temos:

$$E = \frac{\sin^2 30^\circ + \cos^2 60^\circ}{\sin^2 40^\circ + \cos^2 140^\circ} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}{\sin^2 40^\circ + \cos^2 40^\circ} = \frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}{1}$$

$$\therefore E = \frac{1}{2}$$

$$27. \begin{cases} 4 \cos^2 x + 5 \sin x - 5 = 0 \\ \cos^2 x + \sin x = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4 \cos^2 x + 5 \sin x - 5 = 0 \text{ (I)} \\ \cos^2 x = 1 - \sin x \text{ (II)} \end{cases}$$

Substituindo (II) em (I), temos:

$$4(1 - \sin x) + 5 \sin x - 5 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4 \sin^2 x - 5 \sin x + 1 = 0$$

Fazendo a mudança de variável $\sin x = k$, obtemos a equação do 2º grau:

$$4k^2 - 5k + 1 = 0$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 9$$

$$\therefore k = \frac{-(-5) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 4} \Rightarrow k = 1 \text{ ou } k = \frac{1}{4}$$

Retornando à variável original, temos:

$$\sin x = 1 \text{ (não convém, pois } \frac{\pi}{2} < x < \pi)$$

$$\text{ou } \sin x = \frac{1}{4}$$

Portanto, concluímos que $\sin x = \frac{1}{4}$.

$$28. x^2 - 4x + 4 \cos^2 \alpha = 0$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 \cos^2 \alpha = 16 - 16 \cos^2 \alpha = 16(1 - \cos^2 \alpha)$$

Como $1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$, temos:

$$\Delta = 16 \sin^2 \alpha$$


$$\therefore x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{16 \sin^2 \alpha}}{2 \cdot 1} \Rightarrow x = \frac{4 \pm 4 \sin \alpha}{2}$$

$$\therefore x = 2 \pm 2 \sin \alpha$$

Portanto: $S = \{2 - 2 \cos \alpha, 2 + 2 \cos \alpha\}$

$$29. E = \frac{1 + \cos x \cdot (-\cos x)}{-\sin x \cdot (-\sin x)} = \frac{1 - \cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x} = 1$$

30. O ponto M, comum às diagonais, é ponto médio de cada uma. Assim, indicando por d a distância procurada, esquematizamos:



Do triângulo AEM, temos:

$$\sin 180^\circ - \alpha = \frac{d}{13} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{d}{13} \text{ (I)}$$

Pela relação fundamental da Trigonometria, temos:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \left(\frac{d}{13}\right)^2 + \left(-\frac{12}{13}\right)^2 = 1$$

$$\therefore d = \pm 5$$

Como d representa uma distância, só nos convém $d = 5$.

Ou seja, a distância entre o vértice A e a diagonal \overleftrightarrow{BD} é 5 cm.

$$31. \text{ a) } \operatorname{tg} 89^\circ \approx 57,28996163$$

$$\text{ b) } \operatorname{tg} 89,9^\circ \approx 572,9572134$$

$$\text{ c) } \operatorname{tg} 89,99^\circ \approx 5.729,577893$$


$$\text{ d) } \operatorname{tg} 89,999^\circ \approx 57.295,77951$$

$$\text{ e) } \operatorname{tg} 89,9999^\circ \approx 572.957,7951$$

$$\text{ f) } \operatorname{tg} 90^\circ \text{ não existe}$$

32. a) F, pois, tomando $\alpha = -\frac{3\pi}{4}$, temos $\text{tg}\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = 1$.
 b) F, pois, tomando $\alpha = \pi$, temos $\text{tg } \pi = 0$.
 c) V, pois, para $\alpha = \pi + k\pi$, teremos $\text{sen } \alpha = 0$ e, conseqüentemente, $\text{tg } \alpha = 0$.
 d) V, pois, para $\alpha = \frac{k\pi}{2}$, com k ímpar, teremos $\text{cos } \pi = 0$ e, conseqüentemente, $\text{tg } \alpha$ não existe.
 e) V, pois, para $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$, teremos $\text{tg } 2\alpha = \text{tg}(\pi + 2k\pi) = 0$.
 f) F, pois, tomando $k = 30$, temos $\text{tg}(\alpha) = \text{tg}\left(\frac{30\pi}{6}\right) = \text{tg}(5\pi) = 0$.

33. Tomando $45^\circ < \theta < 90^\circ$, temos $\text{tg } \theta > 1$.
 Temos o seguinte círculo trigonométrico:



Daí se nota que, para o intervalo $45^\circ < \theta < 90^\circ$, temos $\text{sen } \theta > \text{cos } \theta$.
 Como $\text{cos } \theta < \text{sen } \theta < 1$ e $\text{tg } \theta > 1$, então $\text{cos } \theta < \text{sen } \theta < \text{tg } \theta$.
 Alternativa b.

34. Pela relação fundamental da Trigonometria, temos:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \text{cos}^2 x = 1 \Rightarrow \text{cos}^2 x = \frac{9}{9} - \frac{4}{9}$$

$$\therefore \text{cos}^2 x = \frac{5}{9}$$

Assim:

$$\text{tg}^2 x = \frac{\text{sen}^2 x}{\text{cos}^2 x} = \frac{\frac{4}{9}}{\frac{5}{9}} = \frac{4}{9} \cdot \frac{9}{5} = \frac{4}{5} = 0,8$$

Alternativa c.

35. $\text{tg } \alpha = -2 \Rightarrow \frac{\text{sen } \alpha}{\text{cos } \alpha} = -2$

$$\begin{cases} \text{sen } \alpha = -2\text{cos } \alpha \\ \text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{cos } \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}, \text{ para } \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$$

Assim:

$$\text{sen } \alpha = -2\text{cos } \alpha = -2\left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{Logo, } \text{cos } \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5} \text{ e } \text{sen } \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

36. $\text{tg } x = \frac{\text{sen } x}{\text{cos } x} = \frac{3}{4} \Rightarrow \text{sen } x = \frac{3}{4} \cdot \text{cos } x$
 $\therefore \text{sen}^2 x = \frac{9}{16} \cdot \text{cos}^2 x$ (I)

Substituindo (I) na relação fundamental da Trigonometria, obtemos:

$$\frac{9}{16} \cdot \text{cos}^2 x + \text{cos}^2 x = 1 \Rightarrow \frac{25}{16} \cdot \text{cos}^2 x = 1$$

$$\therefore \text{cos}^2 x = \frac{16}{25} \Rightarrow \text{cos } x = \pm \frac{4}{5}$$

$$\text{sen } x = \frac{3}{4} \cdot \text{cos } x \Rightarrow \text{sen } x = \pm \frac{3}{5}$$

Como x é uma medida do 3º quadrante, concluímos que $\text{sen } x = -\frac{3}{5}$ e $\text{cos } x = -\frac{4}{5}$.

Portanto:

$$\text{cos } x - \text{sen } x = -\frac{4}{5} - \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{1}{5}$$

Alternativa e.

37. $\text{tg } \alpha = -\frac{1}{3} \Rightarrow \text{sen } \alpha = -\frac{1}{3} \text{cos } \alpha$

$$\begin{cases} \text{sen } \alpha = -\frac{1}{3} \text{cos } \alpha \\ \text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1 \end{cases} \Rightarrow \text{cos } \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$


$$\text{para } \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$$

Assim:

$$\text{sen } \alpha = -\frac{1}{3} \text{cos } \alpha = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{10}}{10} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$$

$$\text{Logo, } \text{sen } \alpha = -\frac{\sqrt{10}}{10} \text{ e } \text{cos } \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}.$$

38. a) Seja M' a projeção de M sobre o eixo das abscissas.



Cálculo de OM' :

$$(OM)^2 = (MM')^2 + (OM')^2 \Rightarrow 1 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 + (OM')^2$$

$$\therefore (OM')^2 = \frac{4}{5}$$

Assim:

$$\text{tg } \alpha = \frac{MM'}{OM'} = \frac{3}{4}$$

$$\text{b) } m(\widehat{AA'M}) = \frac{1}{2} \cdot m(\widehat{AOM}) \Rightarrow m(\widehat{AA'M}) = \frac{\alpha}{2}$$

$$\text{c) } \text{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{MM'}{A'M'} = \frac{\frac{3}{5}}{1 + \frac{4}{5}} = \frac{1}{3}$$

39. a) $\text{tg } \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6}$ ou $\alpha = \frac{7\pi}{6}$

$$\therefore M\left(\frac{\pi}{6}\right) \text{ e } N\left(\frac{7\pi}{6}\right)$$

$$\text{b) } \text{tg } \alpha = -\sqrt{3} \Rightarrow \alpha = \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \alpha = \frac{5\pi}{3}$$


$$\therefore M\left(\frac{2\pi}{3}\right) \text{ e } N\left(\frac{5\pi}{3}\right)$$

- c) $\operatorname{tg} \alpha = -1 \Rightarrow \alpha = \frac{3\pi}{4}$ ou $\alpha = \frac{7\pi}{4}$
 $\therefore M\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ e $N\left(\frac{7\pi}{4}\right)$
40. a) $\operatorname{tg}(-30^\circ) = -\operatorname{tg} 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$
 b) $\operatorname{tg}(-120^\circ) = -\operatorname{tg} 120^\circ = \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$
 c) $\operatorname{tg}(-225^\circ) = -\operatorname{tg} 225^\circ = -\operatorname{tg} 45^\circ = -1$
 d) $\operatorname{tg}(-300^\circ) = -\operatorname{tg} 300^\circ = \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$
 e) $\operatorname{tg}(-1.110^\circ) = -\operatorname{tg}(1.110^\circ) = -\operatorname{tg} 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$
 f) $\operatorname{tg}(-1.860^\circ) = -\operatorname{tg}(1.860^\circ) = -\operatorname{tg} 60^\circ = -\sqrt{3}$
41. a) $\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$
 b) $\operatorname{tg}\left(-\frac{5\pi}{3}\right) = -\operatorname{tg} \frac{5\pi}{3} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$
 c) $\operatorname{tg}\left(-\frac{7\pi}{6}\right) = -\operatorname{tg} \frac{7\pi}{6} = -\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$
 d) $\operatorname{tg}\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\operatorname{tg} \frac{3\pi}{4} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$
 e) $\operatorname{tg}\left(\frac{33\pi}{4}\right) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$
 f) $\operatorname{tg}\left(\frac{31\pi}{3}\right) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$
42. Pelo enunciado, temos:

$$E = \frac{\operatorname{tg}(\pi - x) + \operatorname{tg}(-x) + \operatorname{tg}(\pi + x)}{\operatorname{tg}(2\pi - x)}$$

$$= \frac{-\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} x + \operatorname{tg} x}{-\operatorname{tg} x} = \frac{-\operatorname{tg} x}{-\operatorname{tg} x} = 1$$
- Alternativa a.
43. Pela relação fundamental da Trigonometria, temos:
 $a^2 + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - a^2$
 $\therefore \cos \alpha = \sqrt{1 - a^2}$ ou $\cos \alpha = -\sqrt{1 - a^2}$ (não convém)
 Assim:

$$\operatorname{tg}(\pi - a) = \frac{\operatorname{sen}(\pi - a)}{\cos(\pi - a)} = -\frac{\operatorname{sen} a}{\cos a} = -\frac{a}{\sqrt{1 - a^2}}$$
- Alternativa a.
44. Temos:
 I. $\operatorname{tg} 92^\circ = -\operatorname{tg}(180^\circ - 92^\circ) = -\operatorname{tg} 88^\circ$
 II. $\operatorname{tg} 178^\circ = \operatorname{tg}(180^\circ - 2^\circ) = \operatorname{tg}(-2^\circ) = -\operatorname{tg} 2^\circ$
 III. $\operatorname{tg} 268^\circ = \operatorname{tg}(180^\circ + 88^\circ) = \operatorname{tg} 88^\circ$
 IV. $\operatorname{tg} 272^\circ = \operatorname{tg}(180^\circ + 92^\circ) = \operatorname{tg} 92^\circ = -\operatorname{tg} 88^\circ$
 Alternativa d.
45. Indicando por O o centro da circunferência, por x a medida da projeção ortogonal de \overline{OB} sobre \overline{OA} e por d a distância procurada, esquematizamos:



Do triângulo OBA, temos:

$$\begin{cases} \operatorname{tg}(360^\circ - \alpha) = \frac{d}{x} \\ d^2 + x^2 = 8^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\operatorname{tg} \alpha = \frac{d}{x} \\ d^2 + x^2 = 64 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \frac{3}{4} = \frac{d}{x} \\ d^2 + x^2 = 64 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = \frac{3x}{4} & \text{(I)} \\ d^2 + x^2 = 64 & \text{(II)} \end{cases}$$

Substituindo (I) em (II), obtemos:

$$\left(\frac{3x}{4}\right)^2 + x^2 = 64 \Rightarrow x = \frac{32}{5}$$

Substituindo x por $\frac{32}{5}$ em (I), concluímos:

$$d = \frac{3}{4} \cdot \frac{32}{5} = \frac{96}{20} = 4,8$$

Ou seja, a distância entre o ponto B e o diâmetro \overline{AC} é 4,8 cm.


46. a) O valor de x , com $0^\circ \leq x < 360^\circ$, para que $\operatorname{sen} x = 1$ é $x = 90^\circ$.
 Logo, $S = \{90^\circ\}$.
- b) Os valores de x , com $0^\circ \leq x < 360^\circ$, para os quais $\cos x = 0$ são $x = 90^\circ$ ou $x = 270^\circ$.
 Logo, $S = \{90^\circ, 270^\circ\}$.
- c) Os valores de x , com $0^\circ \leq x < 360^\circ$, para os quais $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$ são $x = 30^\circ$ ou $x = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.
 Logo, $S = \{30^\circ, 150^\circ\}$.
- d) Os valores de x , com $0^\circ \leq x < 360^\circ$, para os quais $\cos x = -\frac{1}{2}$ são $x = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ ou $x = 180^\circ + 60^\circ = 240^\circ$.
 Logo, $S = \{120^\circ, 240^\circ\}$.
47. a) Na primeira volta no sentido positivo, temos:
 $\operatorname{sen} x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$
 Logo, o conjunto solução S nas infinitas voltas é:
 $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\right\}$
- b) Na primeira volta no sentido positivo, temos:
 $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{3\pi}{2}$
 Logo, o conjunto solução S nas infinitas voltas é:
 $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\right\}$
48. a) $\operatorname{tg}^2 x = 0 \Rightarrow \operatorname{tg} x = 0$
 $\therefore x = 0$ ou $x = \pi$
 Logo, $S = \{0, \pi\}$.
- b) $\operatorname{tg}^2 x = 1 \Rightarrow \operatorname{tg} x = 1$ ou $\operatorname{tg} x = -1$
 - $\operatorname{tg} x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$
 - $\operatorname{tg} x = -1 \Rightarrow x = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ ou $x = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$
 Logo, $S = \left\{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}$.
- c) $\operatorname{tg}^2 x = 3 \Rightarrow \operatorname{tg} x = \sqrt{3}$ ou $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$
 - $\operatorname{tg} x = \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{4\pi}{3}$
 - $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$
 Logo, $S = \left\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$.

d) $|\operatorname{tg} x| = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \operatorname{tg} x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ou $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

- $\operatorname{tg} x = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \frac{7\pi}{6}$
- $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x = \frac{5\pi}{6}$ ou $x = \frac{11\pi}{6}$

Logo, $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$.


49. b) Representando na circunferência trigonométrica as raízes obtidas no item b do exercício anterior, temos:



Logo, o conjunto solução S nas infinitas voltas é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$


- c) Representando na circunferência trigonométrica as raízes obtidas no item c do exercício anterior, temos:



Logo, o conjunto solução S nas infinitas voltas é:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{3} + k\pi \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3} + k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

50. $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2} \Rightarrow \operatorname{sen} x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ou $\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{2}}{2}$



$$\therefore x = -\frac{3\pi}{4} \text{ ou } x = -\frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{3\pi}{4}$$


Logo, $S = \left\{ -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$.

51. $3 \operatorname{sen} x = \sqrt{3} \cos x \Rightarrow \frac{3 \operatorname{sen} x}{\cos x} = \sqrt{3}$

$$\therefore \operatorname{tg} x = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{7\pi}{6}$$

Logo, $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right\}$.

52. a) Sendo β a medida do ângulo \widehat{AEC} e α a medida procurada, esquematizamos:



$$\cos \beta = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \Rightarrow \beta = 60^\circ$$

Como os ângulos \widehat{AEC} e \widehat{BED} são opostos pelo vértice: $m(\widehat{BED}) = 60^\circ$

$$\text{Assim: } 90^\circ + 60^\circ + \alpha = 180^\circ \Rightarrow \alpha = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

- b) No triângulo BED , temos:

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{ED}{BD} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{5}{BD}$$


$$\therefore BD = 5\sqrt{3}$$

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABD , concluímos:

$$(AB)^2 = 11^2 + (5\sqrt{3})^2 \Rightarrow (AB)^2 = 196$$

$$\therefore AB = 14 \text{ cm}$$

53. Sendo α a medida procurada, esquematizamos:




Assim, temos:

$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{10\sqrt{3}}{20} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha = 30^\circ \\ 0^\circ < \alpha < 90^\circ \end{cases}$$

Logo, a medida do ângulo agudo que a corda \overline{AB} forma com o diâmetro \overline{AC} é 30° .

54. $\operatorname{tg}^2 x = 4 \Rightarrow \operatorname{tg} x = 2$ e $\operatorname{tg} x = -2$


Sendo α a raiz pertencente ao intervalo $\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$, temos:



Logo, a soma S das raízes no intervalo $[0, 2\pi[$ é dada por:

$$S = \alpha + \pi - \alpha + \pi + \alpha + 2\pi - \alpha = 4\pi$$

55. Traçando o segmento \overline{EN} , perpendicular à base \overline{AD} , obtemos:



Temos, no triângulo EBM:

$$(EM)^2 + (6\sqrt{3})^2 = (4\sqrt{7})^2 \Rightarrow (EM)^2 = 112 - 108 = 4$$

$$\therefore EM = 2$$

$$\text{Logo: } EN = 2 + 4 = 6$$

Observando o triângulo END, temos:

$$\text{tg}(90^\circ - \alpha) = \frac{6}{6\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow 90^\circ - \alpha = 30^\circ$$

$$\therefore \alpha = 60^\circ$$

56. $\text{sen } x \cdot \cos x = 0 \Rightarrow \text{sen } x = 0$ ou $\cos x = 0$

Para $0 \leq x \leq 2\pi$, concluímos:

- $\text{sen } x = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = \pi$ ou $x = 2\pi$
- $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{3\pi}{2}$

$$\text{Logo, } S = \left\{0, \pi, 2\pi, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}.$$

57. $2 \text{sen } x \cos x - \cos x = 0 \Rightarrow \cos x (2 \text{sen } x - 1) = 0$

$$\therefore \cos x = 0 \text{ ou } \text{sen } x = \frac{1}{2}$$

Resolvendo cada uma dessas duas equações, obtemos:

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} \text{ ou } x = \frac{3\pi}{2}$$

$$\text{sen } x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6}$$

Logo, temos como conjunto solução:

$$S = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}$$

58. $2 \cdot \cos^2 x \cdot \text{sen } x - \text{sen } x = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{sen } x \cdot (2 \cos^2 x - 1) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{sen } x = 0 \text{ ou } \cos x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore x = k\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \text{ com } k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Logo: } S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\right\}$$

59. $2 \cdot \text{sen } x \cdot \cos x = \cos x \Rightarrow$

$$\Rightarrow 2 \cdot \text{sen } x \cdot \cos x - \cos x = 0$$

$$\therefore \cos x (2 \text{sen } x - 1) = 0 \Rightarrow \cos x = 0 \text{ ou } \text{sen } x = \frac{1}{2}$$

Para $0 \leq x < 2\pi$, concluímos:

- $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{3\pi}{2}$
- $\text{sen } x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \frac{5\pi}{6}$

$$\text{Logo, } S = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}.$$

60. Do enunciado temos:

$$2 \cdot \text{sen } x \cdot \text{tg } x - 2 \cdot \text{sen } x - \text{tg } x + 1 = 0$$

Colocando $2 \text{sen } x$ e -1 em evidência, temos:

$$2 \text{sen } x (\text{tg } x - 1) - 1(\text{tg } x - 1) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (2 \text{sen } x - 1) \cdot (\text{tg } x - 1) = 0$$

$$\therefore 2 \text{sen } x - 1 = 0 \text{ ou } \text{tg } x - 1 = 0$$

$$\therefore \text{sen } x = \frac{1}{2} \text{ ou } \text{tg } x = 1$$

Considerando o intervalo $[0, 2\pi]$, temos:

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{4}$$

Logo, a soma das raízes é:

$$\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{4} = \frac{6\pi}{6} + \frac{6\pi}{4} = \frac{5\pi}{2}$$

Alternativa c.

61. a) $(4 \text{sen}^2 x - 3)(\cos x - 1) = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \underbrace{4 \text{sen}^2 x - 3 = 0}_{(I)} \text{ ou } \underbrace{\cos x - 1 = 0}_{(II)}$

Resolvendo as equações (I) e (II), para $0 \leq x \leq 2\pi$, temos:

$$(I) 4 \text{sen}^2 x - 3 = 0 \Rightarrow \text{sen}^2 x = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \text{sen } x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3} \text{ ou}$$

$$x = \frac{4\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{3}$$

$$(II) \cos x - 1 = 0 \Rightarrow \cos x = 1$$

$$\therefore x = 0 \text{ ou } x = 2\pi$$

De (I) e (II), concluímos:

$$S = \left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, 2\pi\right\}$$

- b) $\cos^2 x \cdot \text{sen } x - \text{sen } x = 0 \Rightarrow \text{sen } x (\cos^2 x - 1) = 0$

$$\therefore \text{sen } x = 0 \text{ ou } \cos x = 1 \text{ ou } \cos x = -1$$

Para $0 \leq x \leq 2\pi$, concluímos:

- $\text{sen } x = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = \pi$ ou $x = 2\pi$
- $\cos x = 1 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 2\pi$
- $\cos x = -1 \Rightarrow x = \pi$

Logo, $S = \{0, \pi, 2\pi\}$.

- c) $4 \cdot \text{sen } x \cdot \cos x + 2 \text{sen } x - 2 \cos x - 1 = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow 2 \text{sen } x (2 \cos x + 1) - 1(2 \cos x + 1) = 0$$

$$\therefore (2 \cos x + 1)(2 \text{sen } x - 1) = 0 \Rightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \text{ ou } \text{sen } x = \frac{1}{2}$$

Para $0 \leq x \leq 2\pi$, concluímos:

$$\bullet \cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3}$$

$$\bullet \text{sen } x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}.$$

- d) $2 \text{sen}^2 x - \text{sen } x = 0 \Rightarrow \text{sen } x (2 \text{sen } x - 1) = 0$

$$\therefore \text{sen } x = 0 \text{ ou } \text{sen } x = \frac{1}{2}$$

Para $0 \leq x \leq 2\pi$, concluímos:

$$\bullet \text{sen } x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = \pi \text{ ou } x = 2\pi$$

$$\bullet \text{sen } x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{0, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \pi, 2\pi\right\}.$$

- e) $\text{tg}^2 x - \sqrt{3} \text{tg } x = 0 \Rightarrow \text{tg } x (\text{tg } x - \sqrt{3}) = 0$

$$\therefore \text{tg } x = 0 \text{ ou } \text{tg } x = \sqrt{3}$$

Assim:

$$\bullet \text{tg } x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = \pi \text{ ou } x = 2\pi$$

$$\bullet \text{tg } x = \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{0, \pi, \frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, 2\pi\right\}.$$


- f) $\text{tg}^5 x - \text{tg} x = 0 \Rightarrow \text{tg} x (\text{tg}^4 x - 1) = 0$
 $\therefore \text{tg} x = 0$ ou $\text{tg} x = 1$ ou $\text{tg} x = -1$
 Assim:
 • $\text{tg} x = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = \pi$ ou $x = 2\pi$
 • $\text{tg} x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{5\pi}{4}$
 • $\text{tg} x = -1 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4}$ ou $x = \frac{7\pi}{4}$
 Logo, $S = \left\{0, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \pi, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, 2\pi\right\}$.
- 62.** $2 \cdot \text{sen} x \cdot \cos x = \sqrt{2} \cos x \Rightarrow$
 $\Rightarrow 2 \cdot \text{sen} x \cdot \cos x - \sqrt{2} \cos x = 0$
 $\therefore \cos x (2 \cdot \text{sen} x - \sqrt{2}) = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \cos x = 0$ ou $\text{sen} x = \frac{\sqrt{2}}{2}$
 Logo, no intervalo $[0, 3\pi]$, temos:
 $x = \frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{3\pi}{2}$ ou $x = \frac{5\pi}{2}$ ou $x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{3\pi}{4}$
 $\text{ou } x = \frac{9\pi}{4}$ ou $x = \frac{11\pi}{4}$
 Alternativa e.
- 63.** Condição de existência: $\cos x \neq 0$
 $(\text{tg}^2 x - 3)(\cos^2 x - 1) = 0 \Leftrightarrow \text{tg}^2 x - 3 = 0$ ou $\cos^2 x - 1 = 0$
 $\therefore \text{tg} x = \sqrt{3}$ ou $\text{tg} x = -\sqrt{3}$ ou $\cos x = 1$ ou $\cos x = -1$
 Assim, temos:
 • $\text{tg} x = \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$
 • $\text{tg} x = -\sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} + k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$
 • $\cos x = 1$ ou $\cos x = -1 \Rightarrow x = k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$
 Logo, $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{3} + k\pi \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \text{ ou } x = k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\right\}$.
- 64.** Condição de existência: $\cos x \neq 0$
 $\text{tg} x \cdot \text{sen} x - \text{tg} x - \text{sen} x + 1 = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \text{tg} x (\text{sen} x - 1) - (\text{sen} x - 1) = 0$
 $\therefore (\text{sen} x - 1)(\text{tg} x - 1) = 0 \Rightarrow \text{sen} x - 1 = 0$ ou $\text{tg} x - 1 = 0$
 Assim, temos:
 • $\text{sen} x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$ não convém, pois
 $\text{tg} x = \frac{\text{sen} x}{\cos x}$ e $\cos x \neq 0$
 • $\text{tg} x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{5\pi}{4}$
 Logo, $S = \left\{\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right\}$.
- 65.** Condição de existência: $\cos x \neq 0$
 $\text{sen} x \cdot \text{tg} x + \text{sen} x - \text{tg} x \cdot \cos x - \cos x = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \text{sen} x (\text{tg} x + 1) - \cos x (\text{tg} x + 1) = 0$
 $\therefore (\text{tg} x + 1)(\text{sen} x - \cos x) = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \text{tg} x + 1 = 0$ ou $\text{sen} x - \cos x = 0$
 Assim, temos:
 • $\text{tg} x = -1 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4}$
 • $\text{sen} x = \cos x \Rightarrow \text{tg} x = 1$

$$\therefore x = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right\}.$$

- 66.** Condição de existência: $\cos x \neq 0$
 Temos:
 $\text{tg} x \cdot \text{sen} x = \text{tg} x \Rightarrow \text{tg} x \cdot \text{sen} x - \text{tg} x = 0$
 $\therefore \text{tg} x (\text{sen} x - 1) = 0 \Rightarrow \text{tg} x = 0$ ou $\text{sen} x = 1$
 Os valores de x para os quais $\text{sen} x = 1$ não convêm, pois esses valores não satisfazem a condição de existência. Portanto:
 $\text{tg} x = 0 \Rightarrow x = k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$
 Logo, $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\}$.
- 67. a)** $\cos^2 x - 4 \cos x + 3 = 0$
 Fazendo a mudança de variável $\cos x = t$, obtemos a equação de 2º grau:
 $t^2 - 4t + 3 = 0$
 $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4$
 $\therefore t = \frac{-(-4) \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm 2}{2} \Rightarrow t = 3$ ou $t = 1$
 Como $\cos x = t$, temos $\cos x = 3$ (impossível) ou $\cos x = 1$.
 Para $0 \leq x < 2\pi$, concluímos:
 $\cos x = 1 \Rightarrow x = 0$
 Logo, $S = \{0\}$.
- b)** $\text{sen}^2 x - 3 \text{sen} x + 2 = 0$
 Fazendo a mudança de variável $\text{sen} x = t$, obtemos a equação do 2º grau:
 $t^2 - 3t + 2 = 0$
 $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 9 - 8 = 1$
 $\therefore t = \frac{-(-3) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{3 \pm 1}{2} \Rightarrow t = 2$ ou $t = 1$
 Como $\text{sen} x = t$, temos $\text{sen} x = 2$ (impossível) ou $\text{sen} x = 1$.
 Para $0 \leq x < 2\pi$, concluímos:
 $\text{sen} x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$
 Logo, $S = \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$.
- c)** $2 \cos^2 x + 3 \cos x + 1 = 0$
 Fazendo a mudança de variável $\cos x = t$, obtemos a equação do 2º grau:
 $2t^2 + 3t + 1 = 0$
 $\Delta = 3^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 9 - 8 = 1$
 $\therefore t = \frac{-3 \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 2} = \frac{-3 \pm 1}{4} \Rightarrow$
 $\Rightarrow t = -\frac{1}{2}$ ou $t = -1$
 Como $\cos x = t$, temos $\cos x = -\frac{1}{2}$ ou $\cos x = -1$.
 Para $0 \leq x < 2\pi$, concluímos:
 • $\cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3}$ ou $x = \frac{4\pi}{3}$
 • $\cos x = -1 \Rightarrow x = \pi$
 Logo, $S = \left\{\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \pi\right\}$.
- 68.** $\text{tg}^2 x + \text{tg} x - 6 = 0$
 Para $\text{tg} x = y$, temos: $y^2 + y - 6 = 0 \Rightarrow y = 2$ ou $y = -3$
 Logo: $\text{tg} x = 2$ ou $\text{tg} x = -3$

Quatro pontos, M, N, P e Q, são extremos de arcos trigonométricos que têm essas tangentes, conforme mostra a figura:



Assim, concluímos que no intervalo $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ a equação proposta apresenta 3 raízes.

69. $\text{tg}^2 x - (1 + \sqrt{3}) \text{tg} x + \sqrt{3} = 0$

Para $t = \text{tg} x$, temos:

$$t^2 - (1 + \sqrt{3})t + \sqrt{3} = 0$$

Sendo S e P, respectivamente, a soma e o produto das raízes dessa equação do 2º grau, temos:

$$\begin{cases} S = 1 + \sqrt{3} \\ P = \sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow t = 1 \text{ ou } t = \sqrt{3}$$

Assim:

- $\text{tg} x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{4}$
- $\text{tg} x = \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3}$

Concluímos, então, que a maior raiz da equação proposta, no intervalo $[0, 2\pi]$, é $\frac{4\pi}{3}$.

70. $\text{sen}^2 x - 2 \cos x - 2 = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow 1 - \cos^2 x - 2 \cos x - 2 = 0$
 $\therefore \cos^2 x + 2 \cos x + 1 = 0$

Fazendo a mudança de variável $\cos x = y$, obtemos a equação do 2º grau:

$$y^2 + 2y + 1 = 0$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0$$

$$\therefore y = \frac{-2 \pm \sqrt{0}}{2 \cdot 1} \Rightarrow y = -1$$

Retornando à variável original, temos $\cos x = -1$.

Assim, para $0 \leq x < 2\pi$, concluímos:

$$\cos x = -1 \Rightarrow x = \pi$$

Logo, $S = \{\pi\}$.

71. $3 \text{sen}^2 x + \text{sen} x \cdot \cos x + 2 \cos^2 x = 3 \Rightarrow$
 $\Rightarrow 3 - 3 \text{sen}^2 x - \text{sen} x \cdot \cos x - 2 \cos^2 x = 0$
 $\therefore 3(1 - \text{sen}^2 x) - \text{sen} x \cdot \cos x - 2 \cos^2 x = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow 3 \cos^2 x - \text{sen} x \cdot \cos x - 2 \cos^2 x = 0$
 $\therefore \cos^2 x - \text{sen} x \cdot \cos x = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \cos x (\cos x - \text{sen} x) = 0$
 $\therefore \cos x = 0 \text{ ou } \cos x - \text{sen} x = 0$

Assim, temos:

- $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$
- $\cos x = \text{sen} x \Rightarrow \text{tg} x = 1$

$$\therefore x = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4} \right\}.$$

72. $8 \text{sen}^4 x + 2 \cos^2 x = 3 \Rightarrow 8 \text{sen}^4 x + 2(1 - \text{sen}^2 x) = 3$
 $\therefore 8 \text{sen}^4 x - 2 \text{sen}^2 x - 1 = 0$

Fazendo a mudança de variável $\text{sen}^2 x = t$, obtemos a equação do 2º grau:

$$8t^2 - 2t - 1 = 0$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 8 \cdot (-1) = 36$$

$$\therefore t = \frac{-(-2) \pm \sqrt{36}}{2 \cdot 8} \Rightarrow t = \frac{1}{2} \text{ ou } t = -\frac{1}{4}$$

Retornando à variável original, temos:

$$\text{sen}^2 x = \frac{1}{2} \text{ ou } \text{sen}^2 x = -\frac{1}{4} \text{ (impossível)}$$

Assim, calculamos os possíveis valores de $\text{sen} x$:

$$\text{sen}^2 x = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{sen} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ ou } \text{sen} x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Para $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, concluímos:

- $\text{sen} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$
- $\text{sen} x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = -\frac{\pi}{4}$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{4} \right\}.$$

73. Temos que $\text{sen}^2 x = |\text{sen} x|^2$; logo, a equação proposta é equivalente a: $|\text{sen} x|^2 + |\text{sen} x| - 2 = 0$

Fazendo a mudança de variável $|\text{sen} x| = y$, temos:

$$y^2 + y - 2 = 0 \Rightarrow y = 1 \text{ ou } y = -2$$

Retornando à variável original, obtemos:

$$|\text{sen} x| = 1 \text{ ou } |\text{sen} x| = -2$$

Como o módulo de um número real é positivo ou nulo, só nos interessa $|\text{sen} x| = 1$, cuja resolução é:

$$|\text{sen} x| = 1 \Rightarrow \text{sen} x = \pm 1$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}$$

Alternativa b.

74. $\text{sen}^4 x = \cos^4 x \Rightarrow \text{sen} x = \cos x \text{ ou } \text{sen} x = -\cos x$
 Para $0 \leq x \leq 2\pi$, concluímos:

- $\text{sen} x = \cos x \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{4}$

- $\text{sen} x = -\cos x \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{7\pi}{4}$

Logo, a equação proposta tem quatro soluções no intervalo considerado.

Alternativa a.

75. Como o resultado da multiplicação é 0, precisamos que um dos fatores seja 0; logo:

- Para $2 \cos^2 x + 3 \text{sen} x = 0$
 $2 \cdot (1 - \text{sen}^2 x) + 3 \text{sen} x = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow -2 \text{sen}^2 x + 3 \text{sen} x + 2 = 0$

Pela fórmula resolvente de uma equação de 2º grau, temos:

$$\text{sen} x = -\frac{1}{2} \text{ ou } \text{sen} x = 2 \text{ (não convém)}$$

Concluímos então que as raízes da equação são:

$$\frac{7\pi}{6} \text{ e } \frac{11\pi}{6}$$

- Para $\cos^2 x - \sin^2 x = 0$
 $\cos^2 x = \sin^2 x$
 $\therefore \cos x = \sin x$ (I) ou $\cos x = -\sin x$ (II)
 Em (I), as raízes são: $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{5\pi}{4}$
 Em (II), as raízes são: $\frac{3\pi}{4}$ e $\frac{7\pi}{4}$

Portanto, temos 6 possíveis soluções para a equação proposta.

76. Partindo do enunciado, temos:
 $\sin^2 x - 2 \cos^4 x = 0 \Rightarrow 1 - \cos^2 x - 2 \cos^4 x = 0$
 Pela fórmula resolvente de uma equação de 2º grau, temos:
 $\cos^2 x = \frac{1}{2}$ ou $\cos^2 x = -1$ (não convém)
 $\therefore \cos^2 x = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$

Concluimos, então, que o conjunto solução é:


$$S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$$

Somando as raízes da equação, temos:

$$\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} + \frac{5\pi}{4} + \frac{7\pi}{4} = \frac{16\pi}{4} = 4\pi$$

Alternativa c.


77. Pelo enunciado, temos:
 $8^{\sin^2 x} = 4^{\sin x - \frac{1}{8}} \Rightarrow 2^{3\sin^2 x} = 2^{2\sin x - \frac{1}{4}}$
 $\therefore 3\sin^2 x = 2\sin x - \frac{1}{4} \Rightarrow$
 $\Rightarrow 12\sin^2 x - 8\sin x + 1 = 0$
 Pela fórmula resolvente de uma equação de 2º grau, temos:
 $\sin x = \frac{1}{2}$ ou $\sin x = \frac{1}{6}$



Pelo gráfico, concluímos que a equação admite 4 raízes.


Alternativa b.

78. a) $\sin x > \frac{1}{2}$




$$\text{Logo, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6} \right\}$$

- b) $\cos x \leq \frac{1}{2}$




$$\text{Logo, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{3} \right\}$$

- c) $\cos x > \frac{1}{2}$




$$\text{Logo, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x < 2\pi \right\}$$

- d) $\text{tg } x \geq -\frac{\sqrt{3}}{3}$




$$\text{Logo, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} \leq x < \frac{3\pi}{2} \text{ ou } \frac{11\pi}{6} \leq x < 2\pi \right\}$$

e) $\text{tg } x > -1$



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{2} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x < 2\pi \right\}$.

f) $\text{tg } x \leq -1$



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} < x \leq \frac{3\pi}{4} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x \leq \frac{7\pi}{4} \right\}$.

79. b) Basta adicionar a expressão $k \cdot 2\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, a cada extremo do intervalo obtido no item b do exercício anterior:

$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{3} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$

c) Como os números $\frac{5\pi}{3}$ e $-\frac{\pi}{3}$ estão associados ao mesmo ponto da circunferência trigonométrica, o conjunto solução da inequação do item c do exercício anterior, no universo \mathbb{R} , pode ser dado por:

$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi < x < \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$


d) Basta adicionar a expressão $k\pi$ a cada extremo do intervalo $\left[\frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2} \right]$. Assim, o conjunto solução da inequação do item d do exercício anterior, no universo \mathbb{R} , pode ser dado por:

$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{5\pi}{6} + k\pi \leq x < \frac{3\pi}{2} + k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \right\}$


80. a) $\begin{cases} \text{sen } x < \frac{1}{2} & \text{(I)} \\ \text{cos } x \geq \frac{1}{2} & \text{(II)} \end{cases}$

Resolvendo (I) e (II), temos:


(I) $\text{sen } x < \frac{1}{2}$



(II) $\text{cos } x \geq \frac{1}{2}$



Fazendo a intersecção dos conjuntos soluções de (I) e (II), obtemos:




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} \leq x < 2\pi \right\}$.


b) $\begin{cases} \text{cos } x < -\frac{\sqrt{3}}{2} & \text{(I)} \\ \text{sen } x \geq \frac{\sqrt{2}}{2} & \text{(II)} \end{cases}$

Resolvendo (I) e (II), temos:


(I) $\text{cos } x > -\frac{\sqrt{3}}{2}$



(II) $\text{sen } x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$




Fazendo a intersecção dos conjuntos soluções de (I) e (II), obtemos:




Logo, $S = \emptyset$.


c) $\text{tg } x > \frac{\sqrt{3}}{3}$



$\cos x \leq \frac{1}{2}$




Retificando as soluções, temos:




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{7\pi}{6} < x < \frac{3\pi}{2} \right\}$.


d) $\text{tg } x > -\frac{\sqrt{3}}{3}$



$\cos x < -\frac{1}{2}$



Retificando as soluções, temos:



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{5\pi}{6} < x < \frac{4\pi}{3} \right\}$.

81. a) Como os números $\frac{5\pi}{3}$ e $-\frac{\pi}{3}$ estão associados ao mesmo ponto da circunferência trigonométrica, o conjunto solução do sistema do item a do exercício anterior, no universo \mathbb{R} , pode ser dado por:

$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi \leq x < \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi, \right.$

$\left. \text{com } k \in \mathbb{Z} \right\}$

d) Basta adicionar a expressão $k \cdot 2\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, a cada extremo do intervalo obtido no item d do exercício anterior:


$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi < x < \frac{4\pi}{3} + k \cdot 2\pi, \right. \\ \left. \text{com } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

82. a) A dupla desigualdade é equivalente ao sistema


$$\begin{cases} \cos x > -\frac{1}{2} & \text{(I)} \\ \cos x < \frac{1}{2} & \text{(II)} \end{cases}$$

Resolvendo (I) e (II), temos:


$$\text{(I) } \cos x > -\frac{1}{2}$$



$$\text{(II) } \cos x < \frac{1}{2}$$



Fazendo a intersecção dos conjuntos soluções de (I) e (II), obtemos:




$$\text{Logo, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{4\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3} \right\}$$

b) A dupla desigualdade é equivalente ao sistema


$$\begin{cases} \cos x \geq -\frac{1}{2} & \text{(I)} \\ \cos x < \frac{\sqrt{3}}{2} & \text{(II)} \end{cases}$$

Resolvendo (I) e (II), temos:


$$\text{(I) } \cos x \geq -\frac{1}{2}$$



$$\text{(II) } \cos x < \frac{\sqrt{3}}{2}$$



Fazendo a intersecção dos conjuntos soluções de (I) e (II), obtemos:




$$\text{Logo, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} < x \leq \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{4\pi}{3} \leq x < \frac{11\pi}{6} \right\}$$


$$\text{c) } |\cos x| \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \underbrace{\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}}_{\text{(II)}} \text{ ou } \underbrace{\cos x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}}_{\text{(I)}}$$

Resolvendo (I) e (II), temos:


$$\text{(I) } \cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$$



(II) $\cos x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$




Fazendo a união dos conjuntos soluções de (I) e (II), obtemos:




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} \leq x < 2\pi \right\}$.

d) $|\operatorname{tg} x| < \sqrt{3} \Rightarrow -\sqrt{3} < \operatorname{tg} x < \sqrt{3}$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x < 2\pi \right\}$.

e) $|\operatorname{tg} x| \geq 1 \Rightarrow \operatorname{tg} x \geq 1 \text{ ou } \operatorname{tg} x \leq -1$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{3\pi}{4} \text{ ou } \frac{5\pi}{4} \leq x \leq \frac{7\pi}{4} \text{ e } x \neq \frac{\pi}{2} \text{ e } x \neq \frac{3\pi}{2} \right\}$.

f) $|\operatorname{tg} x| + 1 > 2|\operatorname{tg} x| \Rightarrow |\operatorname{tg} x| + 1 > 2|\operatorname{tg} x|$
 $\therefore |\operatorname{tg} x| < 1 \Rightarrow -1 < \operatorname{tg} x < 1$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x < 2\pi \right\}$.

83. Para $x \in [0, 2\pi]$, temos:



Portanto, nosso intervalo é $\left] \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right[$.

Para $x \in [2\pi, 3\pi]$, temos:



Portanto, nosso intervalo é $\left[\frac{17\pi}{6}, 3\pi\right]$.

Logo, o conjunto solução da inequação é:


$$S = \left[\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{17\pi}{6}, 3\pi\right]$$

Alternativa e.

84. Pelo enunciado, temos:

$$|\cos x| < \frac{1}{2} \Rightarrow \cos x < \frac{1}{2} \text{ ou } \cos x > -\frac{1}{2}$$

Representando os valores de x na circunferência trigonométrica, obtemos:



Portanto, o conjunto solução é formado por todos os números reais x tais que:


$$\frac{\pi}{3} < x < \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{4\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3}$$

Alternativa a.

85. a) $2 \cos^2 x - 7 \cos x + 3 < 0$

Fazendo a mudança de variável $\cos x = t$, obtemos a inequação $2t^2 - 7t + 3 < 0$.


A variação de sinal da função $f(t) = 2t^2 - 7t + 3$ é esquematizada por:



Assim: $f(t) < 0 \Rightarrow \frac{1}{2} < t < 3$

Retornando à variável original, temos

$\frac{1}{2} < \cos x < 3$, ou seja, $\cos x > \frac{1}{2}$, cujas soluções são representadas por:




Concluimos, então:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x < 2\pi \right\}$$

b) $4 \cos^2 x - 1 > 0$


Fazendo a mudança de variável $\cos x = t$, obtemos a inequação $4t^2 - 1 > 0$.

A variação de sinal da função $f(t) = 4t^2 - 1$ é esquematizada por:



Assim: $f(t) > 0 \Rightarrow t < -\frac{1}{2} \text{ ou } t > \frac{1}{2}$

Retornando à variável original, temos $\cos x < -\frac{1}{2}$ ou $\cos x > \frac{1}{2}$. A reunião dos conjuntos soluções dessas inequações é representada por:




Concluimos, então:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x < 2\pi \right\}$$

c) $\sen^2 x < 2 \sen x \Rightarrow \sen^2 x - 2 \sen x < 0$

Fazendo a mudança de variável $\sen x = t$, obtemos a inequação $t^2 - 2t < 0$.


A variação de sinal da função $f(t) = t^2 - 2t$ é esquematizada por:



Assim: $f(t) < 0 \Rightarrow 0 < t < 2$

Retornando à variável original, temos

$0 < \text{sen } x < 2$, ou seja, $\text{sen } x > 0$, cujas soluções são representadas por:



Concluimos, então:


$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \pi\}$$

d) $4 \cos^2 x - (2\sqrt{2} + 2) \cos x + \sqrt{2} \leq 0$

Fazendo a mudança de variável $\cos x = t$, obtemos a inequação $4t^2 - (2\sqrt{2} + 2)t + \sqrt{2} \leq 0$.

A variação de sinal da função


$f(t) = 4t^2 - (2\sqrt{2} + 2)t + \sqrt{2}$ é esquematizada por:



Assim: $f(t) \leq 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq t \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

Retornando à variável original, temos

$\frac{1}{2} \leq \cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, cujas soluções são representadas por:



Concluimos, então:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} \leq x \leq \frac{7\pi}{4} \right\}$$

Nota:

No caso de os alunos terem dificuldade na resolução da equação $4t^2 - (2\sqrt{2} + 2)t + \sqrt{2} = 0$, podem ser sugeridas duas formas de resolução:

I) Soma (S) e Produto (P) das raízes:

$$\begin{cases} S = \frac{2\sqrt{2} + 2}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \\ P = \frac{\sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

Concluimos, então, que as raízes são

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ e } \frac{1}{2}.$$

$$\text{II) } \Delta = 8 + 8\sqrt{2} + 4 - 16\sqrt{2} = 8 - 8\sqrt{2} + 4 = (2\sqrt{2} - 2)^2$$

$$\therefore t = \frac{2\sqrt{2} + 2 \pm \sqrt{(2\sqrt{2} - 2)^2}}{8} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = \frac{2\sqrt{2} + 2 + \sqrt{(2\sqrt{2} - 2)^2}}{8} \text{ ou}$$

$$t = \frac{2\sqrt{2} + 2 - \sqrt{(2\sqrt{2} - 2)^2}}{8}$$

$$\therefore t = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ ou } t = \frac{1}{2}$$

e) $\frac{\text{sen}^2 x}{3} + \frac{\cos x}{2} - \frac{1}{2} \leq 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{2 \text{sen}^2 x + 3 \cos x - 3}{6} \leq \frac{0}{6}$$

$$\therefore 2 \text{sen}^2 x + 3 \cos x - 3 \leq 0 \Rightarrow$$


$$\Rightarrow 2(1 - \cos^2 x) + 3 \cos x - 3 \leq 0$$

$$\therefore -2 \cos^2 x + 3 \cos x - 1 \leq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 \geq 0$$

Fazendo a mudança de variável $\cos x = t$, obtemos a inequação $2t^2 - 3t + 1 \geq 0$

A variação de sinal da função $f(t) = 2t^2 - 3t + 1$ é esquematizada por:




Assim: $f(t) \geq 0 \Rightarrow t \leq \frac{1}{2}$ ou $t \geq 1$

Retornando à variável original, temos $\cos x \leq \frac{1}{2}$

ou $\cos x \geq 1$, ou seja, $\cos x \leq \frac{1}{2}$ ou $\cos x = 1$.

A reunião dos conjuntos soluções dessa inequação e dessa equação é representada por:



Concluimos, então:



$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{3} \text{ ou } x = 0 \right\}$$

f) $(2 \cos^2 x - 1)(2 \cos x - 1) < 0$


Fazendo $\cos x = t$, temos: $(2t^2 - 1)(2t - 1) < 0$

Estudando a variação de sinal das funções

$f(t) = 2t^2 - 1$, $g(t) = 2t - 1$ e $f \cdot g$, obtemos:



Logo, $\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ou $\frac{1}{2} < \cos x < \frac{\sqrt{2}}{2}$, e, portanto:



Concluimos, então:



$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4} \right. \\ \left. \text{ou } \frac{5\pi}{3} < x < \frac{7\pi}{4} \right\}$$

g) $\sin x \left(\sin x - \frac{1}{2} \right) (2 \sin x - \sqrt{2}) > 0$

Fazendo $\sin x = t$, temos: $t \left(t - \frac{1}{2} \right) (2t - \sqrt{2}) > 0$


Estudando a variação de sinal das funções

$f(t) = t$, $g(t) = t - \frac{1}{2}$, $h(t) = 2t - \sqrt{2}$ e $f \cdot g \cdot h$, obtemos:



$$f(t) \cdot g(t) \cdot h(t) > 0 \Rightarrow 0 < t < \frac{1}{2} \text{ ou } t > \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Logo, $0 < \sin x < \frac{1}{2}$ ou $\sin x > \frac{\sqrt{2}}{2}$.



Concluimos, então, que o conjunto solução S é dado por:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \pi \right\}$$

h) $\left(\cos^2 x - \frac{3}{4} \right) \left(\sin^2 x - \frac{1}{2} \right) > 0 \Rightarrow$



$$\Rightarrow \left(1 - \sin^2 x - \frac{3}{4} \right) \left(\sin^2 x - \frac{1}{2} \right) > 0$$

$$\therefore \left(-\sin^2 x + \frac{1}{4} \right) \left(\sin^2 x - \frac{1}{2} \right) > 0$$

Fazendo $\sin x = t$, temos: $\left(-t^2 + \frac{1}{4} \right) \left(t^2 - \frac{1}{2} \right) > 0$


Estudando a variação de sinal das funções

$f(t) = -t^2 + \frac{1}{4}$, $g(t) = t^2 - \frac{1}{2}$ e $f \cdot g$, obtemos:



$$f(t) \cdot g(t) > 0 \Rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{2} < t < -\frac{1}{2} \text{ ou } \frac{1}{2} < t < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Logo, $-\frac{\sqrt{2}}{2} < \text{sen } x < -\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{2} < \text{sen } x < \frac{\sqrt{2}}{2}$; e, portanto:



Concluimos, então:


$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{6} \text{ ou } \frac{7\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{4} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x < \frac{11\pi}{6} \right\}$$

i) $\frac{4 \cos^2 x - 1}{2 \cos x - \sqrt{2}} \leq 0$

Fazendo $\cos x = t$, temos: $\frac{4t^2 - 1}{2t - \sqrt{2}} \leq 0$


Estudando a variação de sinal das funções

$f(t) = 4t^2 - 1$, $g(t) = 2t - \sqrt{2}$ e $\frac{f}{g}$, obtemos:



$$\frac{f(t)}{g(t)} \leq 0 \Rightarrow t \leq -\frac{1}{2} \text{ ou } \frac{1}{2} \leq t < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Logo, $\cos x \leq -\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{2} \leq \cos x < \frac{\sqrt{2}}{2}$; e, portanto:



Concluimos, então:


$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} \leq x < \frac{7\pi}{4} \right\}$$

j) $\frac{4 \cos^2 x - 3}{\cos x} \leq 0$

Fazendo $\cos x = t$, temos: $\frac{4t^2 - 3}{t} \leq 0$


Estudando a variação de sinal das funções

$f(t) = 4t^2 - 3$, $g(t) = t$ e $\frac{f}{g}$, obtemos:



$$\frac{f(t)}{g(t)} \leq 0 \Rightarrow t \leq -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ou } 0 < t \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Logo, $\cos x \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ou $0 < \cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$; e, portanto:



Concluimos, então:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} \leq x \leq \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x \leq \frac{11\pi}{6} \right\}$$


k) $\frac{-2 \cos^2 x + 1}{\text{sen } x} > 0 \Rightarrow \frac{-2(1 - \text{sen}^2 x) + 1}{\text{sen } x} > 0$


$$\therefore \frac{2 \text{sen}^2 x - 1}{\text{sen } x} > 0$$

Fazendo $\text{sen } x = t$, temos: $\frac{2t^2 - 1}{t} > 0$

Estudando a variação de sinal das funções


$f(t) = 2t^2 - 1$, $g(t) = t$ e $\frac{f}{g}$, obtemos:





$$\frac{f(t)}{g(t)} > 0 \Rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{2} < t < 0 \text{ ou } t > \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Logo, $-\frac{\sqrt{2}}{2} < \text{sen } x < 0$ ou $\text{sen } x > \frac{\sqrt{2}}{2}$, e, portanto:



Concluimos, então:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4} \text{ ou } \pi < x < \frac{5\pi}{4} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x < 2\pi \right\}$$


86. a) $\text{tg}^2 x - \sqrt{3} \text{tg } x \leq 0$

Fazendo $\text{tg } x = t$, temos:


$$t^2 - \sqrt{3}t \leq 0$$

Estudando a variação de sinal da função

$$f(t) = t^2 - \sqrt{3}t, \text{ obtemos:}$$



Assim, $f(t) \leq 0 \Rightarrow 0 \leq t \leq \sqrt{3}$; e, portanto:
 $0 \leq \text{tg } x \leq \sqrt{3}$



$$\text{Logo, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3} \text{ ou } \pi \leq x \leq \frac{4\pi}{3} \right\}.$$


b) $\text{tg}^3 x - \text{tg } x > 0$

Fazendo $\text{tg } x = t$, temos:


$$t^3 - t > 0 \Rightarrow t(t^2 - 1) > 0$$

Estudando a variação de sinal das funções

$$f(t) = t, g(t) = t^2 - 1 \text{ e } f \cdot g, \text{ obtemos:}$$



Assim, $f(t) \cdot g(t) > 0 \Rightarrow -1 < t < 0$ ou $t > 1$; e, portanto: $-1 < \text{tg } x < 0$ ou $\text{tg } x > 1$



$$\text{Logo, } S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} < x < \pi \text{ ou } \frac{5\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{2} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x < 2\pi \right\}.$$


c) $\text{tg}^2 x - 3 \geq 0$

Fazendo $\text{tg } x = t$, temos:


$$t^2 - 3 \geq 0$$

Estudando a variação de sinal da função

$$f(t) = t^2 - 3, \text{ obtemos:}$$



Assim, $f(t) \geq 0 \Rightarrow t \leq -\sqrt{3}$ ou $t \geq \sqrt{3}$; e, portanto:
 $\text{tg } x \leq -\sqrt{3}$ ou $\text{tg } x \geq \sqrt{3}$



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3} \text{ ou} \right.$

$\left. \frac{4\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{3} \text{ e } x \neq \frac{\pi}{2} \text{ e } x \neq \frac{3\pi}{2} \right\}$.


d) $3 \operatorname{tg}^2 x - 2\sqrt{3} \operatorname{tg} x - 3 \leq 0$

Fazendo $\operatorname{tg} x = t$, temos:

$3t^2 - 2\sqrt{3}t - 3 \leq 0$


Estudando a variação de sinal da função

$f(t) = 3t^2 - 2\sqrt{3}t - 3$, obtemos:



Assim, $f(t) \leq 0 \Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq t \leq \sqrt{3}$; e, portanto:

$-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq \operatorname{tg} x \leq \sqrt{3}$



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} \leq x \leq \frac{4\pi}{3} \text{ ou} \right.$

$\left. \frac{11\pi}{6} \leq x < 2\pi \right\}$.


e) $\operatorname{tg}^2 x - (1 + \sqrt{3}) \operatorname{tg} x + \sqrt{3} > 0$

Fazendo $\operatorname{tg} x = t$, temos:

$t^2 - (1 + \sqrt{3})t + \sqrt{3} > 0$


Estudando a variação de sinal da função

$f(t) = t^2 - (1 + \sqrt{3})t + \sqrt{3}$, obtemos:



Assim, $f(t) > 0 \Rightarrow t < 1 \text{ ou } t > \sqrt{3}$; e, portanto:

$\operatorname{tg} x < 1 \text{ ou } \operatorname{tg} x > \sqrt{3}$



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{4} \text{ ou} \right.$

$\left. \frac{4\pi}{3} < x < 2\pi \text{ e } x \neq \frac{\pi}{2} \text{ e } x \neq \frac{3\pi}{2} \right\}$.


f) $(\operatorname{tg}^2 x - 1)(3 \operatorname{tg} x - \sqrt{3}) \geq 0$

Fazendo $\operatorname{tg} x = t$, temos:

$(t^2 - 1)(3t - \sqrt{3}) \geq 0$


Estudando a variação de sinal das funções

$f(t) = t^2 - 1$, $g(t) = 3t - \sqrt{3}$ e $f \cdot g$, obtemos:



Assim: $f(t) \cdot g(t) \geq 0 \Rightarrow -1 \leq t \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ ou } t \geq 1$;

portanto: $-1 \leq \operatorname{tg} x \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ ou } \operatorname{tg} x \geq 1$



Logo:

$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou} \right.$


$\left. \frac{3\pi}{4} \leq x \leq \frac{7\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{4} \leq x < \frac{3\pi}{2} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} \leq x < 2\pi \right\}$

g) $\frac{\operatorname{tg}^2 x - 3}{\operatorname{tg} x + 1} \leq 0$


Fazendo $\operatorname{tg} x = t$, temos: $\frac{t^2 - 3}{t + 1} \leq 0$

Estudando a variação de sinal das funções

$f(t) = t^2 - 3$, $g(t) = t + 1$ e $\frac{f}{g}$, obtemos:



Assim, $\frac{f(t)}{g(t)} \leq 0 \Rightarrow t \leq -\sqrt{3}$ ou $-1 < t \leq \sqrt{3}$; e, portanto: $\operatorname{tg} x \leq -\sqrt{3}$ ou $-1 < \operatorname{tg} x \leq \sqrt{3}$




Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{\pi}{2} < x \leq \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} < x \leq \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x \leq \frac{5\pi}{3} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x < 2\pi \right\}$.

87. Fazendo a mudança de variável $\cos x = t$, temos:


$$2t^2 - 3t + 1 \leq 0$$

Pelo estudo do sinal da função $f(t) = 2t^2 - 3t + 1$, obtemos os valores de t para os quais $f(t) \leq 0$:



Assim, $f(t) \leq 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq t \leq 1$.

Logo, $\frac{1}{2} \leq \cos x \leq 1$.



Portanto, o conjunto solução é formado por todos os valores de x tais que: $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ ou $\frac{5\pi}{3} \leq x < 2\pi$
Alternativa a.

Exercícios contextualizados

88. Como uma volta corresponde a 360° , temos:

Volta	Ângulo	
1	—	360°
x	—	900°

$\therefore x = 2,5$

Alternativa d.

89. Entre a posição do número 12 até a de 1 hora tem $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$, portanto em 20 minutos o ponteiro das horas andou:

Ângulo	Tempo	
30°	—	60 min
x	—	20 min

$\therefore x = 10^\circ$

Portanto, o ponteiro das horas andou 70° (30° a cada hora, mais 10° em 20 minutos). Como o ponteiro dos minutos está na posição do número 4, que representa 20 minutos, e equivale a 120° em relação a posição zero hora, então o ângulo formado pelos ponteiros é $120^\circ - 70^\circ = 50^\circ$.


90. Como 24 h equivalem a $24 \cdot 60 \text{ min} = 1.440 \text{ min}$, podemos fazer:

Grau	Minuto	
360°	—	1.440 min
3°	—	x

$\therefore x = 12 \text{ min}$

Portanto, a diferença de nascer do Sol entre as duas cidades é de 12 minutos.

91. Pelos dados do enunciado, temos:



A medida do ângulo \widehat{APB} é dada por:
 $180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$

Logo, a medida α do ângulo \widehat{AOB} é:

$$360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 144^\circ = 36^\circ$$


Agora, calculamos o comprimento x da curva \widehat{AB} por uma regra de três:

Medida do ângulo	Comprimento
360° —————	$2\pi \cdot 400$
36° —————	x

$$\therefore x = 80\pi$$

Logo, a curva terá 80π metros de comprimento ou, aproximadamente, 251 m.

92. Pelos dados do enunciado, temos:



$$\operatorname{tg} \widehat{B} = \frac{12}{16} = 0,75$$

Na calculadora, calculamos o ângulo cuja tangente é 0,75, obtendo: $m(\widehat{ABC}) \approx 36,9^\circ$

Pelo teorema de Pitágoras, calculamos a medida do raio, obtendo $AB = 20$ m.


Finalmente, calculamos o comprimento x do arco \widehat{AC} por uma regra de três:

Medida do ângulo	Comprimento
360° —————	$2\pi \cdot 20$
$36,9^\circ$ —————	x

$$\therefore x = 4,1\pi \approx 12,87$$

Logo, o comprimento do arco é de aproximadamente 12,87 m.

93. a)



Como $i_1 // i_2$, temos que os ângulos colaterais \widehat{AOB} e \widehat{OBC} são suplementares, logo o ângulo central \widehat{AOB} mede 30° . Assim, o comprimento c do arco \widehat{AB} é dado pela regra de três:

Medida do ângulo central em grau	Comprimento do arco em km
360 —————	$2 \cdot \pi \cdot 6.370$
30 —————	c

$$\therefore c = \frac{3.185\pi}{3} \text{ km ou, aproximadamente, } 3.333,6 \text{ km.}$$

b) A medida do arco \widehat{AB} é 30° , que é a mesma do ângulo central \widehat{AOB} . A medida x desse arco em radiano é dada pela regra de três:

Medida do arco em grau	Medida do arco em radiano
360 —————	2π
30 —————	x

$$\therefore x = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

94. a) Lembrando que uma volta tem 2π rad, temos:

Medida do ângulo (rad)	Tempo (dia)
$\frac{50\pi}{683}$ —————	1
2π —————	x

$$\therefore x = 27,32 \text{ dias}$$

Logo, a Lua completa uma volta ao redor da Terra em 27,32 dias aproximadamente.

b) Primeiro, vamos transformar 36° em radianos:

Grau	Radiano
360° ———	2π
36° ———	x

$$\therefore x = 0,2\pi$$

Medida do ângulo (rad)	Tempo (dia)
------------------------	-------------

$$\frac{50\pi}{683} \text{ ——— } 1$$

$$0,2\pi \text{ ——— } y$$

$$\therefore y = 2,732 \text{ dias}$$

Logo, a Lua percorre um arco de 36° ao redor da Terra em 2,732 dias aproximadamente.

95. a) Lembrando que $1^\circ = 60'$, temos:

Medida do ângulo (minuto)	Comprimento (metro)
$360 \cdot 60$ ———	$2\pi \cdot 6.370.000$
1 ———	x

$$\therefore x \approx 1.853$$

Logo, 1 milha marítima mede aproximadamente 1.853 m.

b) Medida do ângulo (rad)

$$2\pi \text{ ——— } 2\pi \cdot 6.370.000$$

$$\frac{\pi}{60} \text{ ——— } x$$

$$\therefore x \approx 333.532$$

Logo, um arco de $\frac{\pi}{60}$ rad mede aproximadamente 333.532 m.

96. Quando a polia maior gira $\frac{4\pi}{3}$ rad (ou 240°), a menor

$$\text{gira } \alpha \text{ rad tal que: } \frac{\alpha}{\frac{4\pi}{3}} = \frac{12}{4} \Rightarrow \alpha = 4\pi$$

Alternativa d.

97. a) A medida x , em radiano, do arco é dada por:

$$x = \frac{30}{10} \text{ rad} = 3 \text{ rad}$$

Logo, a velocidade angular ω_a do ponto é:

$$\omega_a = \frac{3}{2} \text{ rad/min} = 1,5 \text{ rad/min}$$

Portanto, a velocidade angular do ponto P é 1,5 rad/min.

b) $\omega_a = \frac{3,6 \text{ rad}}{1 \text{ s}}$

Em 3 segundos, o ponto Q percorrerá:

$$3 \cdot 3,6 \text{ rad} = 10,8 \text{ rad}$$

Sendo R a medida, em centímetro, do raio da circunferência, temos:

$$\frac{54}{R} = 10,8 \Rightarrow R = 5$$

Portanto, a medida do raio dessa circunferência é 5 cm.

98. Temos que 100 rotações equivalem a $2\pi \cdot 100 = 200\pi$ radianos.

Então, o disco gira 200π radianos em 3 minutos. Assim:

Medida do ângulo (rad)	Tempo (s)
200π —————	$3 \cdot 60$
x —————	1

$$\therefore x = \frac{10\pi}{9} \approx 3,5$$

Logo, a velocidade do disco é $\frac{10\pi}{9}$ rad/s ou, aproximadamente, 3,5 rad/s.

99. a) Temos que 1.200 rotações equivalem a $2\pi \cdot 1.200 = 2.400\pi$ radianos.

Ou seja, a centrífuga gira 2.400π radianos em 1 minuto.

Medida do ângulo (rad)	Tempo (s)
2.400π —————	60
x —————	1

$$\therefore x = 40\pi$$

Logo, a velocidade da centrífuga é 40π rad/s.

- b) Radiano Grau

2π —————	360
40π —————	x

$$\therefore x = 7.200$$

Ou seja, a centrífuga gira 7.200° em 1 segundo. Transformando 1 s em hora, temos:

Medida do ângulo (grau)	Tempo (hora)
7.200 —————	$\frac{1}{3.600}$
x —————	1

$$\therefore x = 25.920.000$$

Logo, a velocidade da centrífuga é de $2,592 \cdot 10^7$ graus por hora.

- c) A centrífuga do item a tem velocidade de 40π rad/s. Então, em 8 minutos ela gira: $40\pi \cdot 8 \cdot 60$ rad, ou seja, 19.200π rad. Em 8 minutos, temos $20 \cdot 8 \cdot 60$ voltas, ou seja, 9.600 voltas.

Medida do ângulo	Comprimento
------------------	-------------

2π rad	—————	$2\pi \cdot 10$ cm
19.200π rad	—————	x

$$\therefore x = 192.000\pi \text{ cm} = 1,92\pi \text{ km} \approx 6 \text{ km}$$


Logo, a distância percorrida pelo tubo em 8 minutos é de aproximadamente 6 km.

100. a) No triângulo equilátero destacado na figura a seguir, temos:

$$\text{tg } 30^\circ = \frac{p}{1,86} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{p}{3,72}$$

$$\therefore p = \frac{3,72\sqrt{3}}{3} \Rightarrow p \approx \frac{3,72 \cdot 1,73}{3}$$

$$\therefore p \approx 2,1452$$



Logo, a medida do passo da rosca é 2,15 mm, aproximadamente.

- b) A cada volta do parafuso, cada crista da rosca se desloca um passo p no interior da peça de metal. Como 2.700° equivalem a 7,5 voltas, concluímos que a penetração do parafuso no interior da peça equivale a $7,5 \cdot 2,15$ mm, aproximadamente, ou seja, 16,125 mm.

101. a) Observando que uma volta tem 3,4 km de extensão, concluímos que 3,8 voltas têm:

$$3,8 \cdot 3,4 \text{ km} = 12,92 \text{ km}$$

b) $\frac{15,1}{3,4} \approx 4,44$

Logo, 15,1 km correspondem a 4 voltas completas (13,6 km) mais 1,5 km.

Portanto, a pessoa terá parado no marco 1,5 km.

- c) Na passagem pelo marco 2,5 km, as distâncias percorridas por uma pessoa que deu exatamente 5 voltas são:

$$2,5 \text{ km}; 5,9 \text{ km}; 9,3 \text{ km}; 12,7 \text{ km} \text{ e } 16,1 \text{ km}$$

A expressão que representa esses valores é:

$$x = 2,5 + k \cdot 3,4, \text{ com } k \in \mathbb{Z} \text{ e } 0 \leq k \leq 4$$

Expressão II.

102. a) A abscissa x pode ser representada pela função cosseno. Como o raio da roda-gigante mede 75 m, a abscissa pode ser representada em função do ângulo α por: $x = 75 \cdot \cos \alpha$
Agora, vamos representar o ângulo α em função do tempo t :

Medida do ângulo	Tempo (min)	
2π rad	30	$\Rightarrow \alpha = \frac{\pi t}{15}$
α rad	t	


Assim: $x = 75 \cdot \cos \frac{\pi t}{15}$

- b) Analogamente ao item a, temos: $y = 75 \cdot \sin \frac{\pi t}{15}$

- c) Observando que no instante inicial o ponto P está a uma altura de 90 m, temos:

$$h = 90 + 75 \cdot \sin \frac{\pi t}{15}$$

103. Sendo d o deslocamento vertical procurado, esquematizamos:



$$\sin (180 - \alpha) = \frac{d}{50}$$

Como $\sin (180 - \alpha) = \sin \alpha$, temos:

$$0,3 = \frac{d}{50} \Rightarrow d = 15$$

Logo, o deslocamento vertical será de 15 m.

104. No decorrer de cada dia, a temperatura T , em grau Celsius, no interior de uma câmara frigorífica pode ser descrita em função do tempo t , em hora, pela função $T(t) = -3 + 2 \sin \frac{\pi t}{6}$, em que $t = 0$ representa a meia-noite (0 hora).

a) $T(5) = -3 + 2 \sin \frac{5\pi}{6} = -3 + 2 \sin \frac{\pi}{6}$

$$T(5) = -3 + 2 \cdot \frac{1}{2} = -2$$

Logo, a temperatura às 5 h é -2 °C.

b) $T(7) = -3 + 2 \sin \frac{7\pi}{6} = -3 - 2 \sin \frac{\pi}{6}$

$$T(7) = -3 - 2 \cdot \frac{1}{2} = -4$$

Logo, a temperatura às 7 h é -4 °C.

c) $T(11) = -3 + 2 \sin \frac{11\pi}{6} = -3 - 2 \sin \frac{\pi}{6}$

$$T(11) = -3 - 2 \cdot \frac{1}{2} = -4$$

Logo, a temperatura às 11 h é -4 °C.

d) $T(17) = -3 + 2 \sin \frac{17\pi}{6} = -3 + 2 \sin \frac{\pi}{6}$

$$T(17) = -3 + 2 \cdot \frac{1}{2} = -2$$

Logo, a temperatura às 17 h é -2 °C.

- e) A temperatura máxima ocorre quando o seno assume seu valor máximo, ou seja, 1. Assim:

$$T_{\max} = -3 + 2 \cdot 1$$


$$\therefore T_{\max} = -1$$

- f) A temperatura mínima ocorre quando o seno assume seu valor mínimo, ou seja, -1 . Assim:

$$T_{\min} = -3 + 2 \cdot (-1)$$

$$\therefore T_{\min} = -5$$

105. Façamos um esquema:



$$\cos (180 - \alpha) = \frac{x}{8} \Rightarrow -\cos \alpha = \frac{x}{8}$$


$$\therefore -\left(-\frac{5}{8}\right) = \frac{x}{8} \Rightarrow x = 5$$

Aplicando o teorema de Pitágoras, temos:

$$8^2 = 5^2 + h^2 \Rightarrow h^2 = 39 \Rightarrow h = \sqrt{39}$$

Logo, a altura do piso superior em relação ao piso inferior é $\sqrt{39}$ m ou, aproximadamente, 6,24 m.

106. Sendo p a profundidade procurada, em metro, esquematizamos:



No triângulo BCP, temos: $\operatorname{tg} 45^\circ = 1 = \frac{p}{PB} \Rightarrow p = PB$
Logo, $AP = 230 - p$.

Como não temos a medida AC da hipotenusa do triângulo ACP, convém achar o valor de $\operatorname{tg} \alpha$. Substituindo $\sin \alpha$ por $\frac{15}{17}$ na relação fundamental da Trigonometria, temos:

$$\left(\frac{15}{17}\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{64}{289}$$

$$\therefore \cos \alpha = -\frac{8}{17} \text{ (não convém) ou } \cos \alpha = \frac{8}{17}$$

Assim: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{15}{17}}{\frac{8}{17}} = \frac{15}{8}$

Observando o triângulo ACP, temos:


$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{p}{AP} \Rightarrow \frac{15}{8} = \frac{p}{230 - p}$$

$$\therefore 8p = 3.450 - 15p \Rightarrow 23p = 3.450$$

$$\therefore p = 150$$

Portanto, a cratera tem 150 m de profundidade.

107. a) Indicando por x a medida, em metro, do afundamento vertical do ponto B, esquematizamos:



Assim, temos: $\text{sen } \alpha = \frac{x}{15,484}$


Como $\text{tg } \alpha = 0,06977$, obtemos $\text{sen } \alpha = 0,0696$ com o auxílio de uma calculadora. Logo:

$$\text{sen } \alpha = \frac{x}{15,484} \Rightarrow 0,0696 = \frac{x}{15,484}$$

$$\therefore x \approx 1,08$$

Ou seja, o afundamento vertical do ponto B foi de 1,08 m, aproximadamente.

- b) Indicando por d a distância vertical, em metro, entre os pontos mais alto e mais baixo da torre, esquematizamos:



Assim, temos que:

$$\text{sen } \alpha = \frac{d}{11,484} \Rightarrow 0,0696 = \frac{d}{11,484}$$


$$\therefore d \approx 0,8$$

Logo: $h = 55,86 + 0,8 = 56,66$

Ou seja, na parte mais elevada, a altura da torre mede 56,66 m, aproximadamente.

108. Como a tangente do ângulo \widehat{BAC} é negativa, concluímos que esse ângulo é obtuso.

Então, podemos esquematizar a situação do seguinte modo:



Temos:

$$\text{tg } \alpha = -\frac{12}{5} \Rightarrow \frac{\text{sen } \alpha}{\text{cos } \alpha} = -\frac{12}{5}$$

$$\therefore \text{cos } \alpha = -\frac{5 \text{sen } \alpha}{12} \quad (I)$$

Substituindo (I) na relação fundamental da Trigonometria, temos:

$$\text{sen}^2 \alpha + \left(-\frac{5 \text{sen } \alpha}{12}\right)^2 = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{169 \text{sen}^2 \alpha}{144} = 1$$

$$\therefore \text{sen } \alpha = -\frac{12}{13} \text{ (não convém) ou } \text{sen } \alpha = \frac{12}{13}$$

Lembrando que $\text{sen}(180^\circ - \alpha) = \text{sen } \alpha$, no triângulo ABP, temos:

$$\text{sen}(180^\circ - \alpha) = \frac{BP}{13} \Rightarrow \frac{12}{13} = \frac{BP}{13}$$

$$\therefore BP = 12$$

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo APB, concluímos que $AP = 5$.

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo PBC, temos:

$$12^2 + PC^2 = 20^2 \Rightarrow PC = 16$$

Assim, concluímos:

$$AC = PC - AP = 16 - 5$$

$$\therefore AC = 11 \text{ m}$$

109. a) $\frac{1}{4} = \frac{1 - \text{sen } x}{3} \Rightarrow \text{sen } x = \frac{1}{2}$

Como x é medida de um ângulo agudo, temos que $x = 30^\circ$.


Logo, o cabeceador vê $\frac{1}{4}$ da superfície da bola sob um ângulo de 60° .

- b) $\frac{1}{8} = \frac{1 - \text{sen } x}{2} \Rightarrow \text{sen } x = \frac{3}{4}$

Com o auxílio de uma calculadora científica, obtemos:

$$\alpha \approx 48,6^\circ$$

Logo, o cabeceador vê $\frac{1}{8}$ da superfície da bola sob um ângulo de $97,2^\circ$, aproximadamente.




Temos:

$$\begin{cases} \frac{7}{25} = \frac{1 - \operatorname{sen} x}{2} \\ \operatorname{sen} x = \frac{11}{11 + d} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{sen} x = \frac{11}{25} \\ \operatorname{sen} x = \frac{11}{11 + d} \end{cases}$$

$$\therefore \frac{11}{11 + d} = \frac{11}{25} \Rightarrow d = 14$$

Logo, a distância entre o olho de mira e a bola é 14 cm.

110. Esquemmatizando, temos:



Sabemos que: $n_1 \cdot \operatorname{sen} i = n_2 \cdot \operatorname{sen} r$

$$\text{Então: } \frac{5}{4} \cdot \operatorname{sen} \alpha = \frac{5\sqrt{3}}{4} \cdot \operatorname{sen} (90^\circ - \alpha)$$

$$\therefore \operatorname{sen} \alpha = \sqrt{3} \cdot \operatorname{sen} (90^\circ - \alpha)$$

Lembrando que $\operatorname{sen} (90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$, temos:

$$\operatorname{sen} \alpha = \sqrt{3} \cdot \cos \alpha$$

$$\therefore \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$$

Portanto, $\alpha = 60^\circ$.

111. $\operatorname{tg} x = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6}$, para $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$


Dividindo o comprimento do arco pela medida R do raio de curvatura, obtemos a medida do ângulo central correspondente, em radiano. Assim:

$$\frac{20}{R} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow R = \frac{120}{\pi}$$

Logo, o raio de curvatura mede $\frac{120}{\pi}$ m, ou aproximadamente 38,2 m.

112. Queremos os valores de t, com $0 \leq t \leq 24$, tais que:

$$T = -1 + 2 \cos \frac{\pi(t+1)}{6} < 0 \Rightarrow \cos \frac{\pi(t+1)}{6} < \frac{1}{2}$$



$$\text{Assim: } \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi < \frac{\pi(t+1)}{6} < \frac{5\pi}{3} + k \cdot 2\pi$$


$$\therefore 1 + 12k < t < 9 + 12k$$

Para $k = 0$, temos: $1 < t < 9$

Para $k = 1$, temos: $13 < t < 21$


Concluimos, então, que a temperatura esteve negativa entre 1 h e 9 h e entre 13 h e 21 h.

113. Sendo α a medida do ângulo \widehat{ABF} , esquematizamos:



Para AF superior a $900\sqrt{3}$ m, temos:

$$\operatorname{tg} \alpha > \frac{900\sqrt{3}}{900} \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha > \sqrt{3}$$




Assim: $60^\circ < \alpha < 90^\circ$ ou $240^\circ < \alpha < 270^\circ$ (não convém).

Logo, as possíveis medidas para o ângulo \widehat{ABF} são: 68° , 72° e 80°

Alternativa e.

114. Esquematisando a situação, temos:



Se $18 < d < 24$, temos:


$$\frac{8}{24} < \text{sen } \alpha < \frac{8}{18}$$

Com o auxílio de uma calculadora, obtemos:


$$19,47^\circ < \alpha < 26,39^\circ$$

Pré-requisitos para o capítulo 4


1. a)




b)



c)





d)




e)




f)




h)



i)



2. Os ângulos \widehat{BDA} e \widehat{BCA} são congruentes, pois estão inscritos em um mesmo arco. O ângulo \widehat{ABC} é reto, pois está inscrito em meia circunferência. Assim, esquematizamos:



Pela soma dos ângulos internos de um triângulo, concluímos que a medida do ângulo \widehat{BAC} é 60° .

3. a) Como a fórmula da área de um triângulo é dada por $\frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$, temos:

$$\frac{8 \cdot 5}{2} = 20$$

Portanto, a área desse triângulo é 20 cm^2 .

b) Considerando a medida da altura relativa ao lado \overline{AC} como x , temos:

$$20 = \frac{10 \cdot x}{2} \Rightarrow x = 4$$


Portanto, a medida da altura relativa ao lado \overline{AC} é 4 cm .

4. a) Sabemos que a soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela fórmula $S_i = (n - 2) \cdot 180$, sendo n o número de lados do polígono. Como o pentágono tem 5 lados, então:

$$S_i = (5 - 2) \cdot 180 = 540$$


Portanto, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540°.

- b) Como a soma de todos os ângulos é 540°, então para um pentágono regular cada ângulo tem medida $\frac{540^\circ}{5}$, ou seja, 108°.



Matemática sem fronteiras

1. Indicando por α a medida do ângulo \widehat{VTS} , temos:



$$\text{sen } \alpha = \frac{VS}{TS} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{sen } \alpha = \frac{108.204.000}{150.000.000}$$

$$\text{sen } \alpha = 0,72136$$


Com o auxílio de uma calculadora científica, concluímos:

$$\alpha \approx 46,17^\circ$$

2. Admitindo a hipótese de que a Terra é esférica e que as órbitas dos planetas do sistema solar são circulares e coplanares, tendo o Sol como centro, calculamos a distância entre a Terra e um planeta superior (planeta com raio orbital maior que o da Terra), a partir da distância d entre a Terra e o Sol. Para isso, escolhemos um momento em que o ângulo de vértice no Sol, cujos lados passam pela Terra e pelo planeta, assume sua medida máxima, com o que obtemos um triângulo retângulo, em cujo vértice do ângulo reto está a Terra, conforme explicado a seguir.


Na figura a seguir, o planeta superior, a Terra e o Sol estão alinhados, ocupando as posições P, T e S, respectivamente. Após uma medida t de tempo, em hora, o planeta e a Terra ocupam as posições P' e T', de modo que o planeta é visto da Terra na linha do horizonte. Nesse momento, a reta $\widehat{P'T'}$ é tangente

à órbita da Terra e, portanto, o ângulo $\widehat{ST'P'}$ é reto. Assim, concluímos que o ângulo de vértice no Sol, cujos lados passam pela Terra e pelo planeta, assume sua medida máxima α . Tendo em vista que todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol em um mesmo sentido (adote na figura o sentido anti-horário), que o período da órbita da Terra é de 24 h e que o período do planeta, em hora, é p , com $p > 24$, calculamos a medida α , em função de p e t .



(Nota: O período da órbita de todo planeta superior é muito maior que o da órbita da Terra. O menor desses períodos é o de Marte, que é de 686 dias, aproximadamente.)

3. Temos:



$$\cos 48,8^\circ = \frac{ST}{SM}$$

Com o auxílio de uma calculadora científica, concluímos:

$$0,6587 \approx \frac{150.000.000}{SM} \Rightarrow SM \approx 227.721.000$$

Logo, a distância entre o Sol e o planeta Marte é 227.721.000 km, aproximadamente.

Análise da resolução

COMENTÁRIO: O aluno cometeu um erro ao admitir que α é uma medida da primeira volta positiva da circunferência trigonométrica.

Resolução correta:

Fazendo a mudança de variável $2x = \alpha$, temos:

$$\text{sen } \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}$$

Retornando à variável original, obtemos:

$$2x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}$$

Como $0 \leq x < 2\pi$, concluímos que os únicos valores possíveis de k são 0 e 1:

- $k = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + 0\pi = \frac{\pi}{4}$

- $k = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + 1 \cdot \pi = \frac{5\pi}{4}$

Logo, $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$.