



# ITA 2023



## INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES

AULA 03

**Prof. Victor So**





# Sumário

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>1. RELAÇÕES</b>	<b>5</b>
<b>1.1. PAR ORDENADO</b>	<b>5</b>
1.1.1. DEFINIÇÃO	5
1.1.2. TEOREMA	5
<b>1.2. PRODUTO CARTESIANO</b>	<b>6</b>
1.2.1. DEFINIÇÃO	8
1.2.2. PROPRIEDADES	8
<b>1.3. RELAÇÃO BINÁRIA</b>	<b>10</b>
1.3.1. DEFINIÇÃO	10
1.3.2. DOMÍNIO E IMAGEM	10
1.3.3. CLASSIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES	11
1.3.4. RELAÇÃO INVERSA	14
1.3.5. RELAÇÃO COMPOSTA	15
<b>2. FUNÇÕES</b>	<b>20</b>
<b>2.1. DEFINIÇÃO</b>	<b>20</b>
2.1.1. DOMÍNIO, CONTRADOMÍNIO E IMAGEM	23
2.1.2. IMAGEM DE UM CONJUNTO ATRAVÉS DE UMA FUNÇÃO	24
2.1.3. GRÁFICO	24
<b>2.2. FUNÇÕES ELEMENTARES</b>	<b>25</b>
<b>2.3. FUNÇÃO COM 2 OU MAIS VARIÁVEIS</b>	<b>26</b>
<b>3. FUNÇÃO AFIM</b>	<b>29</b>
<b>3.1. DEFINIÇÃO</b>	<b>29</b>
3.1.1. FUNÇÃO CONSTANTE	29
3.1.2. FUNÇÃO IDENTIDADE	30
3.1.3. FUNÇÃO LINEAR	30
<b>3.2. COEFICIENTES DA FUNÇÃO AFIM</b>	<b>31</b>
<b>3.3. GRÁFICO</b>	<b>31</b>
3.3.1. IMAGEM	32
3.3.2. RAIZ DA FUNÇÃO AFIM	32
3.3.3. ESBOÇO	33
<b>3.4. MONOTONICIDADE</b>	<b>34</b>
3.4.1. CRESCENTE	34
3.4.3. DECRESCENTE	35
3.4.5. CONSTANTE	35
3.4.2. ESTRITAMENTE CRESCENTE	36
3.4.4. ESTRITAMENTE DECRESCENTE	37
3.4.5. MONOTONICIDADE DA FUNÇÃO AFIM	37
<b>3.5. SINAL DE UMA FUNÇÃO</b>	<b>39</b>
3.5.1. SINAL DA FUNÇÃO AFIM	40
3.5.2. FUNÇÃO MISTA	43



<b>4. INEQUAÇÕES</b>	<b>51</b>
<b>4.1. INEQUAÇÕES SIMULTÂNEAS</b>	<b>51</b>
<b>4.2. INEQUAÇÕES-PRODUTO</b>	<b>52</b>
<b>4.3. INEQUAÇÕES-QUOCIENTE</b>	<b>60</b>
<b>5. FUNÇÃO COMPOSTA E FUNÇÃO INVERSA</b>	<b>69</b>
<b>5.1. CLASSIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES</b>	<b>69</b>
5.1.1. FUNÇÃO INJETORA	69
5.1.2. FUNÇÃO SOBREJETORA	71
5.1.3. FUNÇÃO BIJETORA	72
<b>5.2. PARIDADE</b>	<b>73</b>
5.2.1. FUNÇÃO PAR	73
5.2.2. FUNÇÃO ÍMPAR	75
<b>5.3. FUNÇÃO COMPOSTA</b>	<b>76</b>
5.3.1. TEOREMA	80
5.3.2. PROPRIEDADES	81
<b>5.4. FUNÇÃO INVERSA</b>	<b>83</b>
5.4.1. DEFINIÇÃO	83
5.4.2. TEOREMA	84
5.4.3. PROPRIEDADES	85
<b>6. QUESTÕES NÍVEL 1</b>	<b>91</b>
<b>GABARITO</b>	<b>100</b>
<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>101</b>
<b>7. QUESTÕES NÍVEL 2</b>	<b>119</b>
<b>GABARITO</b>	<b>131</b>
<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>132</b>
<b>8. QUESTÕES NÍVEL 3</b>	<b>164</b>
<b>GABARITO</b>	<b>177</b>
<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>178</b>
<b>9. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA AULA</b>	<b>216</b>
<b>10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	<b>217</b>
<b>11. VERSÕES DAS AULAS</b>	<b>217</b>



## INTRODUÇÃO

Nessa aula iniciaremos o estudo das funções. Estudaremos conceitos de relações, par ordenado, produto cartesiano, funções e suas classificações, função composta e inversa.

Esse assunto costuma cair bastante nas provas. Ela será dividida em várias aulas para conseguirmos abordar todas as funções relevantes para a prova.

É muito importante que você entenda cada conceito e resolva muitos exercícios para fixação, elas o ajudarão a resolver os exercícios da sua prova!

Se você for um aluno com boa base nesse assunto, vá direto para a lista de questões e caso tenha alguma dúvida entre em contato conosco através do fórum de dúvidas do Estratégia ou se preferir:





## 1. RELAÇÕES

Antes de iniciarmos nosso estudo de funções, vamos estudar Relações. Esse assunto será importante para fundamentar nosso entendimento sobre funções. Então, vamos lá!

### 1.1. PAR ORDENADO

Na Matemática, temos situações onde a ordem dos elementos é importante para definir a solução de um problema. Por exemplo:

Encontrar  $x, y \in \mathbb{R}$  que satisfaça as equações:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Ao resolver essas equações, encontramos  $x = 1$  e  $y = 0$  como solução. Então, se representássemos essa solução usando conjuntos, diríamos que  $\{1, 0\}$  é solução do sistema. Mas, veja que  $\{1, 0\} \neq \{0, 1\}$ , então  $x = 0$  e  $y = 1$  também seria solução do sistema acima. Sabemos que isso não é verdade. Por isso, usamos o conceito de par ordenado para solucionar esse problema.

Nesse caso, usando o conceito de par ordenado para definir a solução, escrevemos:

$$(x, y) = (1, 0)$$

Para definir um par ordenado, usamos os parênteses "( )" no lugar das chaves "{ }". Como a ordem dos elementos importa, temos:

$$(1, 0) \neq (0, 1)$$

#### 1.1.1. DEFINIÇÃO

A definição de par ordenado, segundo o matemático Kuratowski, é dada por:

$$(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

Podemos usar essa definição para representar mais variáveis:

$$(x, y, z) = \{\{x\}, \{x, y\}, \{x, y, z\}\}$$

Nesse caso, chamamos  $(x, y, z)$  de tripla ordenada.

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = \{\{x_1\}, \{x_1, x_2\}, \dots, \{x_1, x_2, \dots, x_n\}\}$$

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$  é dita de n-upla ordenada.

#### 1.1.2. TEOREMA

$$(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \text{ e } b = d$$

Demonstração:

Usando a definição de Kuratowski, temos:

$$(a, b) = (c, d)$$



$$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$$

Pela igualdade, podemos escrever:

$$\begin{cases} \{a\} = \{c\} \\ \{a, b\} = \{c, d\} \end{cases}$$

ou

$$\begin{cases} \{a\} = \{c, d\} \\ \{a, b\} = \{c\} \end{cases}$$

Resolvendo os sistemas:

$$\begin{cases} \{a\} = \{c\} \\ \{a, b\} = \{c, d\} \end{cases}$$

$$\{a\} = \{c\} \Rightarrow a = c$$

$$\{a, b\} = \{c, d\} \Rightarrow b = d \text{ já que } a = c$$

Nesse caso,  $a = c$  e  $b = d$ .

$$\begin{cases} \{a\} = \{c, d\} \\ \{a, b\} = \{c\} \end{cases}$$

$$\{a\} = \{c, d\} \Rightarrow a = c = d$$

$$\{a, b\} = \{c\} \Rightarrow a = b = c$$

$$\Rightarrow a = b = c = d$$

Nesse caso, todos os elementos são iguais e  $a = c$  e  $b = d$  também é válido.


Com isso, concluímos:

$$(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \text{ e } b = d$$

## 1.2. PRODUTO CARTESIANO

Os pares ordenados podem ser representados em um plano cartesiano ortogonal. Esse plano foi criado pelo matemático René Descartes para mostrar alguns pontos no espaço. Podemos entendê-lo como um mapa, onde as coordenadas nela representadas nos levam a algum ponto do mapa.

O plano cartesiano é um sistema de coordenadas  $(x, y)$ . A sua representação é dada por:




O eixo  $x$  é chamado de eixo das abcissas (também pode ser chamado de  $Ox$ ) e o eixo  $y$  é chamado de eixo das ordenadas (ou  $Oy$ ). Ambos são perpendiculares entre si (possuem ângulo de  $90^\circ$  no ponto de intersecção). O encontro entre esses eixos é o ponto  $(0, 0)$  (ou ponto  $0$ ), esse ponto é chamado de origem do sistema.

Vamos representar alguns pontos nesse plano para entender melhor sua utilidade. Seja  $A, B, C, D$  os pontos:

$$A(1, 0), B(-2, 2), C(1, 4), D(-1, -2)$$

Para representar os pontos, adotaremos sempre o primeiro elemento do par ordenado como elemento do eixo  $x$  e o segundo elemento como elemento do eixo  $y$ . Localizando  $A, B, C, D$  no plano, temos:



Agora que sabemos o que é um plano cartesiano, vamos entender o conceito de produto cartesiano.



### 1.2.1. DEFINIÇÃO

Se  $A$  e  $B$  são dois conjuntos não vazios, o produto cartesiano entre eles é representado pela notação:

$$A \times B = \{(x, y) | x \in A \text{ e } y \in B\}$$

$A \times B$  lê-se "A cartesiano B".

$A \times B$  é um conjunto cujos elementos são pares ordenados da forma  $(x, y)$ .

Exemplo:

Seja  $A = \{2, 3\}$  e  $B = \{0, 1, 2\}$ .

1)  $A \times B = \{(2, 0), (2, 1), (2, 2), (3, 0), (3, 1), (3, 2)\}$

2)  $B \times A = \{(0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$

Perceba que no produto cartesiano devemos escrever todas as combinações possíveis entre os elementos dos conjuntos envolvidos. Desse modo, podemos escrever a seguinte relação:

$$n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$$

O produto cartesiano não se resume a apenas 2 conjuntos, podemos estendê-lo para  $n$  conjuntos:

$$A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots \times A_n = \{(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) | x_1 \in A_1 \wedge x_2 \in A_2 \wedge x_3 \in A_3 \wedge \dots \wedge x_n \in A_n\}$$

O número de elementos desse conjunto é dado por:

$$n(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n) = n(A_1) \cdot n(A_2) \cdot \dots \cdot n(A_n)$$

Vamos ver um exemplo de produto cartesiano com 3 conjuntos:

Seja  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{2, 3\}$ ,  $C = \{3, 4\}$ .

$$A \times B \times C = \{(1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 3, 3), (1, 3, 4), (2, 2, 3), (2, 2, 4), (2, 3, 3), (2, 3, 4)\}$$

### 1.2.2. PROPRIEDADES

**P1)**  $A \times \emptyset = \emptyset$

**P2)**  $A \times B \neq B \times A$ , com  $A \neq B$  e não vazios

**P3)**  $A^2 = A \times A$

**P4)**  $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

**P5)**  $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

Vamos demonstrar as propriedades P4 e P5:

P4)  $A \times (B \cup C) = \{(x, y) | x \in A \wedge y \in (B \cup C)\} = \{(x, y) | x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)\}$

Aplicando a distributiva:

$$\{(x, y) | x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)\} = \{(x, y) | (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)\}$$



Veja que  $(A \times B) = \{(x, y) | (x \in A \wedge y \in B)\}$  e  $(A \times C) = \{(x, y) | (x \in A \wedge y \in C)\}$ , então:

$$\{(x, y) | (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)\} = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$\therefore A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$P5) A \times (B \cap C) = \{(x, y) | x \in A \wedge y \in (B \cap C)\} = \{(x, y) | x \in A \wedge (y \in B \wedge y \in C)\}$$

Aplicando a distributiva:

$$\{(x, y) | x \in A \wedge (y \in B \wedge y \in C)\} = \{(x, y) | (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in A \wedge y \in C)\}$$

$$\{(x, y) | (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in A \wedge y \in C)\} = (A \times B) \cap (A \times C)$$


$$\therefore A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

Analisando a propriedade P3, se tomarmos  $A = \mathbb{R}$ , temos  $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ . Esse é o plano cartesiano.


Vamos ver um exemplo de representação de produto cartesiano no plano cartesiano:

Seja  $A = \{1, 2, 3\}$  e  $B = \{1, 2\}$ .

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}$$



Também existe outro modo de representar o produto cartesiano. Podemos usar o diagrama de flechas, veja:



### 1.3. RELAÇÃO BINÁRIA

#### 1.3.1. DEFINIÇÃO

Uma relação binária  $R$  de  $A$  em  $B$  é dada por:

$$R = \{(x, y) \in A \times B \mid p(x, y)\}$$

$p(x, y)$  representa um critério de relacionamento entre  $x \in A$  e  $y \in B$ .

Perceba que  $R$  é um subconjunto do conjunto  $A \times B$  e seus elementos  $(x, y)$  possuem a propriedade  $p(x, y)$ . Assim, podemos afirmar  $R \subset A \times B$ .

Para essa relação  $R$  de  $A$  em  $B$ :

$A$  é o conjunto de partida da relação  $R$ .

$B$  é o conjunto de chegada ou contradomínio da relação  $R$ .

Se  $(a, b) \in A \times B$  e  $p(a, b)$  é verdadeira, podemos usar a notação:

$$a R b \text{ ou } R(a) = b$$

Se  $(c, d) \in A \times B$  e  $p(c, d)$  é falsa:

$$c \not R d \text{ ou } R(c) \neq d$$

Chamamos de conjunto solução de uma relação o seguinte conjunto:

$$S = \{(a, b) \in A \times B \mid p(a, b) \text{ é } V\}$$

O conjunto  $S$  possui todos os elementos que satisfazem a propriedade da relação.

#### 1.3.2. DOMÍNIO E IMAGEM

Vamos ver o que é o domínio e a imagem de uma relação.

Seja  $R$  uma relação de  $A$  em  $B$  com  $x \in A$  e  $y \in B$ .

Domínio de  $R$  é o conjunto formado por todos os primeiros elementos dos pares ordenados de  $R$ . Sua notação é dada por:




$$D_R = \{a \in A \mid (a, y) \in R\}$$

Imagem de  $R$  é o conjunto de todos os segundos elementos dos pares ordenados de  $R$ :

$$Im_R = \{b \in B \mid (x, b) \in R\}$$

Vejamos uma representação genérica de uma relação  $R$  de  $A$  em  $B$  no plano cartesiano.  
Seja  $R \subset A \times B$ :



Note que  $D_R \subset A$  e  $Im_R \subset B$ .

### 1.3.3. CLASSIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES


Seja  $R \subset A^2$ .

#### 1) Reflexiva

$R$  é reflexiva em  $A^2$  quando  $\forall a \in A$ , temos  $(a, a) \in R$

Exemplo:

Sejam  $A = [0, 2]$  e  $R_1, R_2 \subset A^2$  representados no plano cartesiano:



$R_1$  é reflexiva e  $R_2$  não é reflexiva.


Para ser reflexiva, os elementos do conjunto devem conter a reta  $y = x$ . Apenas  $R_1$  satisfaz essa condição.

## 2) Simétrica

$R$  é simétrica em  $A^2$  quando para  $(a, b) \in R$ , temos  $(b, a) \in R$

Vejamos uma representação gráfica de um  $R$  simétrico em  $A^2$ .

Sejam  $A = [0, 2]$  e  $R \subset A^2$ :




## 3) Antissimétrica

$R$  é antissimétrica em  $A^2$  quando  $(a, b) \in R$  e  $(b, a) \in R$ , temos  $a = b$

Vejamos uma representação gráfica de um  $R$  antissimétrica em  $A^2$ .

Sejam  $A = [0, 2]$  e  $R \subset A^2$ :



#### 4) Transitiva

**$R$  é transitiva em  $A^2$  quando  $(a, b) \in R$  e  $(b, c) \in R$ , temos  $(a, c) \in R$**

Exemplo:

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid x - y : 2\}$$

Para  $(a, b) \in R$ , temos  $a - b = 2k_1, k_1 \in \mathbb{Z}$ .

Para  $(b, c) \in R$ , temos  $b - c = 2k_2, k_2 \in \mathbb{Z}$ .

Somando as duas equações, obtemos:

$$a - c = 2(k_1 + k_2) = 2k_3$$

$$\Rightarrow (a, c) \in R$$

$\therefore R$  é transitiva

Nesse exemplo, também podemos ter outras classificações para  $R$ . Veja:

$$\forall a \in \mathbb{Z}, a - a = 0 = 2 \cdot 0$$

$$\Rightarrow (a, a) \in R$$

$\therefore R$  é reflexiva

Se  $(a, b) \in R$ , temos  $a - b = 2k, k \in \mathbb{Z}$

Multiplicando a equação acima por  $-1$ :

$$b - a = 2(-k)$$

Disso, concluímos que  $(b, a) \in R$ .

$\therefore R$  é simétrica

Das 4 classificações acima, podemos ter mais duas:

**$R$  é uma relação de equivalência  $\Leftrightarrow R$  é reflexiva, simétrica e transitiva**

**$R$  é uma relação de ordem  $\Leftrightarrow R$  é reflexiva, antissimétrica e transitiva**



Uma relação específica é a relação identidade. Ela é dada por:

$$\text{Relação identidade} = \{(x, y) \in A^2 \mid x = y\}$$

### 1.3.4. RELAÇÃO INVERSA


Seja  $R \subset A \times B$ , a relação inversa de  $R$  é denotada por  $R^{-1}$  e definida por:

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R\}$$

A relação inversa  $R^{-1}$  é obtida invertendo-se a ordem dos pares ordenados da relação  $R$ .

Exemplo:

Sejam  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 2\}$  e  $B = \{y \in \mathbb{R} \mid 2 \leq y \leq 4\}$ . Vamos representar no plano cartesiano as relações  $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2x\}$  e sua inversa  $R^{-1}$ :



Perceba que os gráficos de  $R$  e  $R^{-1}$  são simétricos em relação à reta  $y = x$ .

Se usarmos a definição de  $R$  ser simétrica, temos:

$$R \text{ é simétrica se } (a, b) \in R, \text{ temos } (b, a) \in R$$

Mas da definição de inversa de  $R$ :

$$(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R^{-1}$$

Como  $R$  é simétrica,  $(b, a)$  também pertence a  $R$ :

$$(b, a) \in R \Rightarrow (a, b) \in R^{-1}$$

Assim, todos os elementos de  $R$  também pertencem a  $R^{-1}$ .

Disso, concluímos:

$$R \text{ é simétrica} \Leftrightarrow R = R^{-1}$$



### 1.3.5. RELAÇÃO COMPOSTA

Seja  $R \in A \times B$  e  $T \in B \times C$ . Se  $a \in A, b \in B, c \in C$ , temos:

$$a R b \Rightarrow R(a) = b$$

$$b T c \Rightarrow T(b) = c$$

Uma relação composta de  $R$  com  $T$  é dada por:


$$R(a) = b \text{ e } T(b) = c \Rightarrow T(R(a)) = c$$

$T(R(a))$  pode ser reescrita como  $ToR(a)$ , essa é a notação usual para representar uma relação composta de  $R$  com  $T$ .

Veja a definição da relação composta:

$$ToR = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B \text{ tal que } (a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in T\}$$

Podemos ver a representação das relações através do diagrama de flechas:



Um erro muito comum nos alunos ao ver a nomenclatura  $ToR$  de  $A$  em  $C$  é inverter a ordem das relações devido a  $T$  estar escrito antes de  $R$ .

Para solucionar esse problema, devemos entender que  $ToR = T(R(x))$ . Assim, entenderemos que  $x$  nos levará a  $R(x)$  e com  $R(x)$  encontraremos  $T(R(x))$ .


Ou, se a questão envolver diagrama de flechas, basta lembrar que na relação composta as relações iniciam da direita à esquerda:





Exemplo:

Sejam os conjuntos  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{a, b, c, d\}$  e  $C = \{1, 2, a, b\}$ . Encontre a relação composta  $ToR$ , sendo as relações  $R$  e  $T$  representadas pelo diagrama abaixo:



As informações representadas pelo diagrama de flechas podem ser extraídas da seguinte maneira:

Devemos analisar os elementos indicados pelas flechas. Os elementos que possuem flechas saindo deles serão os primeiros elementos de um par ordenado e os elementos indicados por estas flechas serão os segundos elementos desse par ordenado.

Para  $R$ :

Veja que o elemento 1 possui uma flecha saindo dela e esta chega em  $a$  e  $b$ . Dessa forma, podemos escrever:

$$(1, a), (1, b) \in R$$

Analogamente para os outros elementos:

$$(3, c), (5, d) \in R$$

Assim, o conjunto  $R$  é dado por:

$$R = \{(1, a), (1, b), (3, c), (5, d)\}$$

Para  $T$ :

$$T = \{(a, 1), (c, 2), (c, a), (d, a), (d, b)\}$$

Para a relação composta  $ToR$ :

$ToR$  é uma relação que leva elementos do conjunto  $A$  a elementos do conjunto  $C$ . Para encontrar quais são os pares ordenados dessa relação, devemos analisar o caminho que as flechas percorrem.



O elemento 1 do conjunto  $A$  chega no elemento  $a$  do conjunto  $B$ . Esse elemento  $a$  chega no elemento 1 do conjunto  $C$ . Então, o elemento 1 do conjunto  $A$  chega no elemento 1 do conjunto  $C$ . Assim,  $(1, 1) \in ToR$ .

O elemento 1 do conjunto  $A$  também chega no elemento  $b$  do conjunto  $B$ . Porém, esse  $b$  não chega em nenhum elemento do conjunto  $C$ . Então, esse caminho não retorna nenhum elemento da relação composta.

Do mesmo modo para os outros elementos:

$$3 \rightarrow c \rightarrow 2 \Rightarrow (3, 2) \in ToR$$

$$3 \rightarrow c \rightarrow a \Rightarrow (3, a) \in ToR$$

$$5 \rightarrow d \rightarrow a \Rightarrow (5, a) \in ToR$$

$$5 \rightarrow d \rightarrow b \Rightarrow (5, b) \in ToR$$

A relação composta é dada por:

$$ToR = \{(1, 1), (3, 2), (3, a), (5, a), (5, b)\}$$



**1.** Considere a relação  $R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 | x + 2y = 12\}$ . Determinar:

- a)  $R$
- b) Domínio, imagem e  $R^{-1}$
- c)  $RoR$
- d)  $R^{-1}oR$

**Resolução:**

a)  $R$

Os pares ordenados são formados por números naturais. Vamos analisar a propriedade da relação:

$$x + 2y = 12$$

$$2y = 12 - x$$

$$y = 6 - \frac{x}{2}$$

O elemento  $y$  deve ser natural, então da propriedade acima,  $x$  deve ser múltiplo de 2 para  $y$  não ser fracionário. Encontrando os pares ordenados:

$$x = 0 \rightarrow y = 6$$

$$x = 2 \rightarrow y = 5$$

$$x = 4 \rightarrow y = 4$$



$$x = 6 \rightarrow y = 3$$

$$x = 8 \rightarrow y = 2$$

$$x = 10 \rightarrow y = 1$$

$$x = 12 \rightarrow y = 0$$

$$x = 14 \rightarrow y = -1 \notin \mathbb{N}$$

Apenas os pares ordenados naturais devem ser considerados na relação  $R$ . Portanto:

$$R = \{(0, 6), (2, 5), (4, 4), (6, 3), (8, 2), (10, 1), (12, 0)\}$$

b) Domínio, imagem e  $R^{-1}$

O domínio é dado por todos os primeiros elementos dos pares ordenados de  $R$ :

$$D_R = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12\}$$

A imagem é dada por todos os segundos elementos dos pares ordenados de  $R$ :


$$Im_R = \{6, 5, 4, 3, 2, 1, 0\}$$

Para encontrar  $R^{-1}$ , devemos inverter a ordem dos pares ordenados de  $R$ :

$$R^{-1} = \{(6, 0), (5, 2), (4, 4), (3, 6), (2, 8), (1, 10), (0, 12)\}$$

c)  $RoR$

Pelo diagrama de flechas:



De acordo com o diagrama:

$$12 \rightarrow 0 \rightarrow 6 \Rightarrow (12, 6) \in RoR$$

$$8 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \Rightarrow (8, 5) \in RoR$$

$$4 \rightarrow 4 \rightarrow 4 \Rightarrow (4, 4) \in RoR$$

$$0 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \Rightarrow (0, 3) \in RoR$$

$$RoR = \{(12, 6), (8, 5), (4, 4), (0, 3)\}$$




d)  $R^{-1} \circ R$

Sabendo que:

$$R = \{(0,6), (2,5), (4,4), (6,3), (8,2), (10,1), (12,0)\}$$

$$R^{-1} = \{(6,0), (5,2), (4,4), (3,6), (2,8), (1,10), (0,12)\}$$

O diagrama de flechas de  $R^{-1} \circ R$  é dado por:



Analisando o diagrama, temos:

$$R^{-1} \circ R = \{(12, 12), (10, 10), (8, 8), (6, 6), (4, 4), (2, 2), (0, 0)\}$$

Perceba que essa relação composta é a relação identidade.

Podemos encontrar a relação composta sem o uso do diagrama da seguinte forma:

Para  $R^{-1} \circ R$ , devemos analisar os elementos de  $R$  e  $R^{-1}$ . Associamos a imagem de  $R$  com o domínio de  $R^{-1}$ :

$$R = \{(0,6), (2,5), (4,4), (6,3), (8,2), (10,1), (12,0)\}$$

$$R^{-1} = \{(6,0), (5,2), (4,4), (3,6), (2,8), (1,10), (0,12)\}$$

Assim, o domínio de  $R^{-1} \circ R$  será o domínio de  $R$  com a imagem de  $R^{-1}$  dos elementos associados:

$$(0,6) \rightarrow (6,0) \Rightarrow (0,0)$$

$$(2,5) \rightarrow (5,2) \Rightarrow (2,2)$$

⋮

$$(12,0) \rightarrow (0,12) \Rightarrow (12,12)$$

$$\therefore R^{-1} \circ R = \{(0,0), (2,2), (4,4), (6,6), (8,8), (10,10), (12,12)\}$$




## 2. FUNÇÕES

Após o estudo das Relações, podemos proceder com o assunto de Funções. Uma função  $f$  equivale a uma relação com algumas restrições. Veremos nesse capítulo quais condições devem ser satisfeitas para uma relação ser considerada função. Por se tratar de uma relação, podemos aproveitar as definições e propriedades estudadas no capítulo anterior para fundamentar o entendimento desse tema.

### 2.1. DEFINIÇÃO

Dados dois conjuntos  $A$  e  $B$ . Uma função  $f: A \rightarrow B$  (função de  $A$  em  $B$ ) é uma relação binária que relaciona elementos do conjunto  $A$  em elementos do conjunto  $B$ .

Veja:



Esse é um exemplo que relaciona os números  $\{1, 2, 3\}$  à sua paridade  $\{par, ímpar\}$ .


A definição formal de função é dada por:

$$f: A \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x \in A, \exists y \in B \text{ tal que } f(x) = y$$

$f$  transforma  $x \in A$  em  $y \in B$ .


Então, dessa definição temos que satisfazer duas condições para uma relação ser função:

- I) Todo elemento  $x$  pertencente a  $A$  deve ser relacionado a algum elemento  $y$  pertencente a  $B$ .
- II) Um  $x$ , elemento de  $A$ , não pode se relacionar a mais de um  $y$ , elemento de  $B$ .



Exemplos:


**É função**



Nesse caso, as duas condições são satisfeitas. Todos os elementos de  $A$  se relacionam a todos os elementos de  $B$  e nenhum elemento de  $A$  possui dois correspondentes em  $B$ .




### É função




As duas condições também são satisfeitas nesse caso. Perceba que o fato de 4 e 5 estarem relacionados ao mesmo elemento  $b$  não contradiz nenhuma das duas condições para ser função.

### É função



Todos os elementos de  $A$  se relacionam ao mesmo elemento de  $B$ . Nenhuma das duas condições foi violada. Essa relação também é função.


### Não é função



Nesse caso, a condição (I) foi violada. O elemento 5 de  $A$  não possui correspondente em  $B$ . Logo, essa relação não é função.




### Não é função



A condição (II) foi violada. O elemento 5 de  $A$  possui mais de um correspondente em  $B$ .

### 2.1.1. DOMÍNIO, CONTRADOMÍNIO E IMAGEM

Seja a função  $f: A \rightarrow B$  representada pelo diagrama de flechas abaixo:



O domínio da função  $f$  é o conjunto  $A$  e ela é denotada por:

$$D_f = A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

O contradomínio de  $f$  é o conjunto  $B$  e ela pode ser escrita como:

$$CD_f = B = \{a, b, c, d, e\}$$

A imagem de  $f$  é o conjunto formado pelos elementos  $y \in B$ , tal que  $\forall x \in A, f(x) = y$ . Ela pode ser escrita dessa forma:

$$Im_f = \{a, b, c\}$$

Perceba que em uma função  $f$  de  $A$  em  $B$ , o conjunto  $A$  sempre será o domínio de  $f$ .



## 2.1.2. IMAGEM DE UM CONJUNTO ATRAVÉS DE UMA FUNÇÃO

Podemos representar a imagem de um conjunto através da função.

Usando o diagrama de flechas acima, temos:


$$f(A) = Im_f = \{a, b, c\}$$

$f(A)$  é a imagem da função  $f$ .


## 2.1.3. GRÁFICO

A representação gráfica de uma função  $f$  de  $A \subset \mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$  pode ser feita através do plano cartesiano. Para esboçar seu gráfico, consideramos que  $f$  gera pares ordenados da forma  $(x, y)$  tal que  $y = f(x)$ , com  $x \in A$  e  $y \in \mathbb{R}$ .

Vamos ver alguns exemplos de funções  $f$  no plano cartesiano:



A relação  $f$  de  $A$  em  $\mathbb{R}$  representada acima, com  $A = [0, 3]$ , é função. As retas verticais que passam pela relação  $f$  possuem apenas 1 ponto de encontro na relação (pontos representados em azul). Isso satisfaz a condição de definição de função. Os elementos de  $A = [0, 3]$  representados no eixo  $x$  correspondem a um único valor em  $\mathbb{R}$ , representado no eixo  $y$ .



A relação  $f$  de  $A$  em  $\mathbb{R}$  representada acima, com  $A = [1, 3]$ , não é função. Pois há retas verticais que encontram o gráfico de  $f$  em 2 pontos. Isso viola a condição de  $x \in A$  possuir apenas um correspondente em  $y \in \mathbb{R}$ .

Assim, para verificarmos se uma relação  $f$  de  $A$  em  $B$  é função através da representação cartesiana, devemos verificar se as retas paralelas ao eixo  $y$  encontram o gráfico de  $f$  em apenas um só ponto.

## 2.2. FUNÇÕES ELEMENTARES

Abaixo estão as principais funções que podem ser cobradas no vestibular:

1) Função Afim

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } f(x) = ax + b, a, b \in \mathbb{R}$$

2) Função Racional

$$f: \mathbb{R} - \left\{ -\frac{d}{c} \right\} \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

3) Função Quadrática

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } f(x) = ax^2 + bx + c; a \neq 0$$

4) Função Modular

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } f(x) = |x|$$

5) Função Exponencial

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } f(x) = a^x; a > 0 \text{ e } a \neq 1$$



6) Função Logarítmica

$$f: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } f(x) = \log_a x; a > 0 \text{ e } a \neq 1$$

7) Função Máximo Inteiro

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } f(x) = [x]$$

8) Função Trigonométrica

$$f: A \rightarrow B \text{ e } f(x) = \text{sen}x \text{ ou } f(x) = \text{cos}x \text{ ou } f(x) = \text{tg}x$$

9) Cosseno hiperbólico em  $x$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

10) Seno hiperbólico em  $x$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

11) Tangente hiperbólico em  $x$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

As funções afim, racional, quadrática, modular, exponencial, logarítmica, máximo inteiro e trigonométrica são os principais tipos de funções que veremos. Para cada uma dessas funções, teremos capítulos específicos abordando todos os assuntos cobrados na prova.

### 2.3. FUNÇÃO COM 2 OU MAIS VARIÁVEIS

Vimos funções com apenas 1 variável, mas podemos também ter funções com mais variáveis. Vejamos alguns exemplos:

I)  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x; y) = x^2 + y^2$$

Esse é um exemplo de função com duas variáveis,  $x$  e  $y$ . Basicamente, o que muda é a adição de mais uma variável. Podemos atribuir  $x = 1$  e  $y = 2$  e a função retornará:

$$f(1; 2) = 1^2 + 2^2 = 1 + 4 \Rightarrow f(1; 2) = 5$$

II)  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$f(x; y; z) = (2x - y + z; x + y - z)$$

Aqui, temos um exemplo de função com 3 variáveis que retorna como resultado o par ordenado  $(2x - y + z; x + y - z)$ .

Fazendo  $x = 1$ ,  $y = 2$  e  $z = 3$ , temos:

$$f(1; 2; 3) = (2 \cdot 1 - 2 + 3; 1 + 2 - 3) \Rightarrow f(1; 2; 3) = (3; 0)$$




III)  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

Esse é um exemplo de função que transforma n-uplas ordenadas em m-uplas ordenadas.




2. Classifique as relações abaixo, indicando se são ou não função. Caso positivo, determine seu domínio, contradomínio e imagem.


a)




b)



c)



d)



**Resolução:**

a) A relação  $R$  não é função, pois o elemento  $-1$  possui dois correspondentes (0 e 3).

b) A relação  $T$  é função. Todos os elementos do conjunto  $A$  possuem correspondentes em  $B$  e cada um deles é associado a um único elemento de  $B$ .

O domínio de  $T$  é o conjunto  $A$ :

$$D_T = \{-1, 0, 1\}$$

O contradomínio é o conjunto  $B$ :

$$CD_T = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

A imagem de  $T$  é composta por todos os elementos de  $B$  que são associados a algum elemento de  $A$ :

$$Im_T = \{0, 2, 6\}$$

c) A relação  $S$  é função. Todos elementos de  $A$  correspondem a algum elemento de  $B$  e cada um deles possui apenas um elemento associado a eles.

$$D_S = \{-1, 0, 1\}$$

$$CD_S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$Im_S = \{2, 4\}$$



d) A relação  $V$  não é função, pois o elemento 1 do conjunto  $A$  não corresponde a nenhum elemento em  $B$ .

**Gabarito:**

a)  $R$  não é função.

b)  $T$  é função.  $D_T = \{-1, 0, 1\}$ ,  $CD_T = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $Im_T = \{0, 2, 6\}$

c)  $S$  é função.  $D_S = \{-1, 0, 1\}$ ,  $CD_S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $Im_S = \{2, 4\}$

d)  $V$  não é função.

## 3. FUNÇÃO AFIM

Vamos iniciar o estudo da nossa primeira função: a função afim.

### 3.1. DEFINIÇÃO

A função afim é uma função cuja definição é dada por:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b, a, b \in \mathbb{R}$$

Dependendo dos valores de  $a, b$  da definição acima, podemos ter casos específicos de função. Vamos ver quais são eles.


#### 3.1.1. FUNÇÃO CONSTANTE

Uma função  $f$  de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$  é chamada de constante quando cada elemento  $x \in \mathbb{R}$  corresponde a um mesmo elemento  $c \in \mathbb{R}$ . Essa função é definida por:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = b, b \in \mathbb{R}$$

Esta função é um caso específico, onde  $a = 0$  e  $b \in \mathbb{R}$ . A transformação  $f$  de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$  associa para cada  $x \in \mathbb{R}$  um mesmo valor  $b \in \mathbb{R}$ .

Graficamente, ela será uma reta horizontal ao eixo  $x$ :



A imagem de  $f$  é  $Im_f = \{b\}$ .




### 3.1.2. FUNÇÃO IDENTIDADE

A função identidade  $f$  é a relação  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  que associa  $x$  ao próprio  $x$ . Sua definição é dada por:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$$

Graficamente:




Nesse caso, a imagem de  $f$  é  $Im_f = \mathbb{R}$ .

### 3.1.3. FUNÇÃO LINEAR

A função linear é uma função afim com o coeficiente  $b = 0$ . Ela é definida por:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax, a \neq 0$$

Graficamente:



Esta reta passa pela origem do sistema e possui imagem  $Im_f = \mathbb{R}$ .

Excluindo a função constante, todas as outras funções afins são consideradas funções de primeiro grau devido à dependência delas com a variável  $x$ . A função constante não possui essa dependência e por isso não pode receber essa classificação.

### 3.2. COEFICIENTES DA FUNÇÃO AFIM

Dada a função afim:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b, a, b \in \mathbb{R}$$

$a, b$  são chamados de coeficientes da função e  $x$  é a sua variável.

**$a$  é denominado de coeficiente angular e  $b$  é o coeficiente linear.**

Exemplos:

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_1(x) = 2x + 1$$

O coeficiente angular de  $f_1$  é 2 e seu coeficiente linear é 1.

$$f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_2(x) = -x - 10$$

O coeficiente angular de  $f_2$  é  $-1$  e seu coeficiente linear é  $-10$ .

### 3.3. GRÁFICO

No estudo das funções, a sua representação gráfica nos permite extrair informações importantes. Por exemplo, podemos usá-la para resolver inequações e também estudar o sinal da função. Antes de aprendermos a esboçar uma função, estudaremos como encontrar sua imagem e sua raiz.



### 3.3.1. IMAGEM

Para encontrarmos o conjunto imagem de uma função  $f$ , devemos analisar o domínio de  $f$  e ver o que acontece com a variável  $y = f(x)$  quando analisamos o seu domínio. Veja:

Vamos encontrar o conjunto imagem da função:

$$f: [0, 10] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x + 2$$

Substituindo  $f(x) = y$  e isolando  $x$ :

$$y = 3x + 2 \Rightarrow x = \frac{y - 2}{3}$$

Como  $D_f = [0, 10]$ , temos:

$$0 \leq x \leq 10$$

$$0 \leq \frac{y - 2}{3} \leq 10$$

Multiplicando as desigualdades acima por 3:

$$0 \leq y - 2 \leq 30$$

Somando 2 nas desigualdades:

$$0 + 2 \leq y - 2 + 2 \leq 30 + 2$$

$$2 \leq y \leq 32$$

Dessa forma, concluímos:

$$D_f = [0, 10] \Rightarrow Im_f = [2, 32]$$

### 3.3.2. RAIZ DA FUNÇÃO AFIM

Raiz de uma função é todo  $x$  que resulta  $f(x) = 0$ . Ela também é conhecida como zero de uma função.

Para determinarmos a raiz da função afim, devemos substituir  $f(x) = 0$  e resolver a equação resultante. Veja:

$$f(x) = ax + b$$

Substituindo  $f(x) = 0$ , encontramos a seguinte equação:

$$ax + b = 0$$

Vamos resolver a equação:

$$ax + b = 0 \Rightarrow ax = -b \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

Assim, a única solução da equação é dada por  $x = -b/a$ .

Exemplo:

Encontre a raiz de  $f(x) = 3x + 6$ .

Substituindo  $f(x) = 0$ , obtemos a equação:



$$3x + 6 = 0$$

Resolvendo a equação:

$$3x + 6 = 0 \Rightarrow x = -2$$

Então para  $x = -2$ , temos  $f(-2) = 0$ .

### 3.3.3. ESBOÇO

Como construímos o gráfico de uma função?

Uma função  $f$  de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$  retorna pares ordenados da forma  $(x, y)$ , onde  $x$  pertence ao domínio de  $f$  e  $y$  pertence à imagem de  $f$ . Para representar uma função dada no plano cartesiano, devemos verificar a forma da função e encontrar alguns pares ordenados.

Vamos desenhar o gráfico da seguinte função dada por:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$$

Devemos encontrar os principais pares ordenados da função. Para o caso da função afim, podemos encontrar os pontos onde  $f(x) = 0$  (raiz da função) e  $x = 0$ .


$$f(x) = 0 \Rightarrow 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1/2$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$$

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = 2 \cdot 0 + 1 = 1$$


$$\Rightarrow (0, 1)$$

Sabemos que o gráfico da função afim é uma reta e temos 2 pontos do gráfico. Para esboçar o gráfico, devemos representar os 2 pontos no plano cartesiano e traçar uma reta que passa por eles. Representando os 2 pontos:





Traçando a reta, obtemos:




### 3.4. MONOTONICIDADE

Podemos classificar as funções de acordo com seu comportamento em determinado intervalo. Vamos ver as possibilidades abaixo:

#### 3.4.1. CRESCENTE

$f: A \rightarrow B$  e  $I \subset A$   
 $f: A \rightarrow B$  é crescente em  $I \Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in I$  e  $x_1 > x_2$ , temos  $f(x_1) \geq f(x_2)$

Exemplo gráfico:



$f$  é crescente em  $I = [1,3]$ .

Do gráfico, temos:



$$x_1 < x_2 < x_3 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) < f(x_3)$$

A função não decresce ao longo do intervalo  $I$ .


Perceba que entre 1 e  $x_1$ , a função é constante e entre  $x_2$  e 3, a função é estritamente crescente.

### 3.4.3. DECRESCENTE

$$f: A \rightarrow B \text{ e } I \subset A$$

$$f: A \rightarrow B \text{ é decrescente em } I \Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in I \text{ e } x_1 > x_2, \text{ temos } f(x_1) \leq f(x_2)$$

Exemplo gráfico:



$f$  é decrescente em  $I = [1,3]$ .

Do gráfico, temos:

$$x_1 < x_2 < x_3 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) > f(x_3)$$

A função não cresce ao longo do intervalo  $I$ .

Perceba que entre 1 e  $x_1$ , a função é constante e entre  $x_2$  e 3, a função é estritamente decrescente.


### 3.4.5. CONSTANTE

$$f: A \rightarrow B \text{ e } I \subset A$$

$$f: A \rightarrow B \text{ é constante em } I \Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in I, \text{ temos } f(x_1) = f(x_2)$$



Exemplo gráfico:



A função  $f$  é constante no intervalo  $I$ .


$$\forall x_1, x_2 \in I, f(x_1) = f(x_2) = c$$

### 3.4.2. ESTRITAMENTE CRESCENTE

$$f: A \rightarrow B \text{ e } I \subset A$$

$f: A \rightarrow B$  é *estritamente crescente* em  $I \Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in I \text{ e } x_1 > x_2, \text{ temos } f(x_1) > f(x_2)$

Exemplo gráfico:



$f$  é estritamente crescente em  $I$ .




Para qualquer  $x_1 < x_2 \in I$ , temos  $f(x_1) < f(x_2)$ .

### 3.4.4. ESTRITAMENTE DECRESCENTE

$$f: A \rightarrow B \text{ e } I \subset A$$

$f: A \rightarrow B$  é *estritamente decrescente* em  $I \Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in I \text{ e } x_1 > x_2, \text{ temos } f(x_1) < f(x_2)$

Exemplo gráfico:



$f$  é estritamente decrescente em  $I$ .

Para qualquer  $x_1 < x_2 \in I$ , temos  $f(x_2) < f(x_1)$ .

Das classificações acima, uma função  $f$  é dita monótona se for crescente ou decrescente. Se  $f$  for estritamente crescente ou estritamente decrescente, ela é dita estritamente monótona.

### 3.4.5. MONOTONICIDADE DA FUNÇÃO AFIM

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b, a \neq 0$ .

Vamos analisar a monotonicidade da função afim não constante. Tomando  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ , temos:

$$f(x_1) = ax_1 + b$$

$$f(x_2) = ax_2 + b$$

Subtraindo as duas equações:

$$f(x_2) - f(x_1) = a(x_2 - x_1)$$



$$\Rightarrow a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Vamos analisar o sinal do coeficiente angular  $a$  para  $f$  crescente e decrescente:

1)  $f$  crescente

Sendo  $f(x) = ax + b$ , uma função crescente, podemos escrever:

$$x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1)$$

Das desigualdades acima:

$$\begin{aligned} x_2 > x_1 &\Rightarrow x_2 - x_1 > 0 \\ f(x_2) > f(x_1) &\Rightarrow f(x_2) - f(x_1) > 0 \end{aligned}$$

Isso implica em:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$$

Se o coeficiente angular é dado por:

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$$

Assim, concluímos:

$$\mathbf{f \text{ é crescente} \Rightarrow a > 0}$$

2)  $f$  decrescente

Sendo  $f(x) = ax + b$ , uma função decrescente, podemos escrever:

$$x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$$

Das desigualdades acima:

$$\begin{aligned} x_2 > x_1 &\Rightarrow x_2 - x_1 > 0 \\ f(x_2) < f(x_1) &\Rightarrow f(x_2) - f(x_1) < 0 \end{aligned}$$


Isso implica em:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0$$

Se o coeficiente angular é dado por:

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0$$

$$\mathbf{\therefore f \text{ é decrescente} \Rightarrow a < 0}$$




### 3.5. SINAL DE UMA FUNÇÃO



Esse assunto é bastante cobrado nas questões de inequação nos vestibulares. Vamos aprender os conceitos fundamentais e ver sua aplicabilidade para cada tipo de inequação.


Estudar o sinal de uma função significa encontrar os valores de  $x \in D_f$  para  $f(x) < 0$ ,  $f(x) = 0$ ,  $f(x) > 0$ . Podemos fazer isso analiticamente ou graficamente. Quando  $f$  está representado no plano cartesiano, podemos encontrar o sinal da função analisando o sinal das ordenadas dos pontos de  $f$ . Vamos ver um exemplo:





Analisando o gráfico, conseguimos ver quais os valores de  $x$  resultam em  $f(x) < 0$ ,  $f(x) = 0$  e  $f(x) > 0$ . Tomando o eixo das abscissas como referência, vemos que a curva  $y = f(x)$  é positiva quando ela estiver acima do eixo e é negativa quando ela estiver abaixo do eixo.

Vamos redesenhar o gráfico indicando os sinais da função no eixo  $x$ :



Observando o gráfico acima, podemos ver que não importa a forma da curva  $y = f(x)$ , precisamos apenas observar se a curva está acima ou abaixo do eixo das abscissas e tomar como base para análise as raízes de  $f$  (pontos onde  $y = f(x) = 0$ ).

Simplificando o gráfico, obtemos:



Dessa forma, concluímos:

$$f(x) = 0 \Rightarrow x \in \{-2, 1, 4, 8\}$$

$$f(x) > 0 \Rightarrow x < -2 \text{ ou } 1 < x < 4 \text{ ou } x > 8$$

$$f(x) < 0 \Rightarrow -2 < x < 1 \text{ ou } 4 < x < 8$$

### 3.5.1. SINAL DA FUNÇÃO AFIM

Seja  $f$  uma função afim. Então ela é dada por:

$$f(x) = ax + b$$

Sabemos que a raiz de  $f$  é:

$$x = -\frac{b}{a}$$



Lembrando que  $f$  é crescente para  $a > 0$  e decrescente para  $a < 0$ . Vamos analisar o sinal de  $f$  para cada um desses casos.

a)  $a > 0$

Podemos analisar o sinal da função analiticamente ou graficamente. Iremos estudar os dois métodos.

Analiticamente:

Devemos verificar quais valores de  $x$  resultam em  $f(x) > 0$  e  $f(x) < 0$ :

$$f(x) > 0 \Rightarrow ax + b > 0 \Rightarrow ax > -b \Rightarrow x > -\frac{b}{a}$$


$$f(x) < 0 \Rightarrow ax + b < 0 \Rightarrow ax < -b \Rightarrow x < -\frac{b}{a}$$

Dessa forma, concluímos:

$$f(x) > 0 \Rightarrow x > -\frac{b}{a}$$

$$f(x) < 0 \Rightarrow x < -\frac{b}{a}$$

Representando no eixo  $x$ :




Podemos encontrar esse resultado diretamente pelo método gráfico. Veja:

Graficamente:


Por esse método, devemos encontrar as raízes de  $f$ . Nesse caso, temos raiz única:

$$x = -\frac{b}{a}$$

Sabendo que  $a > 0$  implica  $f$  crescente e que  $f$  é uma reta, temos:



Lembrando que  $f$  é positivo quando a curva está acima do eixo  $x$  e que  $f$  é negativo quando está abaixo, podemos concluir:



O método gráfico é útil para visualizar o que ocorre com a função para os diferentes valores de  $x$ . Veremos mais adiante que no estudo das funções de segundo grau, ela será uma ferramenta muito poderosa para a resolução de questões.

Vamos analisar o outro caso de  $f$ .

b)  $a < 0$

Analiticamente:

Nesse caso, devemos nos atentar para o sinal de desigualdade. Veja:

$$f(x) > 0 \Rightarrow ax + b > 0 \Rightarrow ax > -b \Rightarrow x < -\frac{b}{a}$$

$$f(x) < 0 \Rightarrow ax + b < 0 \Rightarrow ax < -b \Rightarrow x > -\frac{b}{a}$$

Perceba que o sinal de desigualdade deve ser invertido quando isolamos  $x$  já que  $a < 0$ .

ESCLARECENDO!



Lembrando da aula de desigualdade no conjunto dos reais, temos a seguinte propriedade:

$$a \geq b \text{ e } c \leq 0 \rightarrow ac \leq bc$$

Sendo  $a < 0$ , vamos multiplicar  $ax > -b$  por  $1/a$ :


$$\begin{aligned} ax > -b \text{ e } \frac{1}{a} < 0 &\rightarrow \left(\frac{1}{a}\right)ax < -b\left(\frac{1}{a}\right) \\ &\Rightarrow x < -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

Concluimos:

$$f(x) > 0 \Rightarrow x < -\frac{b}{a}$$

$$f(x) < 0 \Rightarrow x > -\frac{b}{a}$$

Representando o resultado no eixo  $x$ :




Vejamos como obter o mesmo resultado pelo método gráfico.

Graficamente:

A raiz de  $f$  é:

$$x = -\frac{b}{a}$$

Como  $a < 0$  e  $f$  é decrescente, obtemos:




### 3.5.2. FUNÇÃO MISTA

Função mista também é conhecida como função determinada por intervalos. Como o nome diz, ela é uma função composta por diferentes funções de acordo com o intervalo estabelecido. Veja um exemplo:

$$f(x) = \begin{cases} -x - 2, & x < 1 \\ x - 2, & 1 \leq x < 3 \\ -x + 4, & x \geq 3 \end{cases}$$

O gráfico dessa função é dado por:



Para cada intervalo determinado,  $f$  assume diferentes funções. O exemplo acima é uma função mista de funções afins. Perceba que no ponto  $x = 1$ , a reta  $-x - 2$  possui um círculo aberto na sua extremidade direita (onde  $x = 1$ ). Isso indica que  $x = 1$  não é elemento dessa reta. Na reta  $x - 2$ , 1 é elemento da função e por isso o círculo é fechado nesse ponto.



**3.** Obter a equação da reta que passa pelo ponto  $(1, 2)$  e tem coeficiente angular 2.

**Resolução:**

A equação da reta com coeficiente angular 2 é dada por:

$$y = f(x) = ax + b \Rightarrow y = 2x + b$$

Para encontrar o valor do coeficiente linear  $b$ , devemos substituir o ponto na função:

$$(1, 2) \Rightarrow x = 1 \text{ e } y = 2$$

$$y = 2x + b$$

$$2 = 2(1) + b$$

$$b = 0$$

$$\Rightarrow y = 2x$$

**Gabarito:**  $y = 2x$



4. Dado a tabela abaixo e sabendo que  $f$  é uma função afim, determine  $y = f(x)$ .

$y$	$x$
5	2
-2	0

**Resolução:**

Seja  $f$  uma função afim, temos:

$$y = f(x) = ax + b$$

Dos dados da tabela, podemos inferir:

$$x = 2 \Rightarrow y = 5$$

$$5 = a(2) + b \Rightarrow 2a + b = 5$$

$$x = 0 \Rightarrow y = -2$$

$$-2 = a(0) + b \Rightarrow b = -2$$

$$2a + b = 5 \Rightarrow 2a + (-2) = 5 \Rightarrow 2a = 7 \Rightarrow a = 7/2$$

Logo,  $f$  é dado por:

$$f(x) = \frac{7}{2}x - 2$$

**Gabarito:**  $f(x) = \frac{7}{2}x - 2$

5. Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Estude o sinal das funções abaixo:

a)  $f(x) = 2x + 1$

b)  $f(x) = -x + 3$

c)  $f(x) = x + 1/2$


**Resolução:**

a)  $f(x) = 2x + 1$

Vamos encontrar a raiz de  $f$ :

$$f(x) = 0 \Rightarrow 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1/2$$

Como o coeficiente angular de  $f$  é  $a = 2 > 0$ , temos  $f$  crescente. Então:




b)  $f(x) = -x + 3$

Encontrando a raiz de  $f$ :

$$-x + 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

Como  $a = -1 < 0$ , temos  $f$  decrescente. Logo:




c)  $f(x) = x + 1/2$

Vamos resolver analiticamente:



$$f(x) > 0 \Rightarrow x + \frac{1}{2} > 0 \Rightarrow x > -1/2$$


$$f(x) < 0 \Rightarrow x + \frac{1}{2} < 0 \Rightarrow x < -1/2$$

Representando no eixo  $x$ :



**Gabarito:**





c)

6. Esboce o gráfico e estude o sinal das funções abaixo definidas em  $\mathbb{R}$ :

$$a) f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{2} + 1, & x \leq 2 \\ x - 3, & x > 2 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \leq 1 \\ x - 2, & 1 < x \leq 3 \\ -2x + 8, & x > 3 \end{cases}$$

**Resolução:**

$$a) f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{2} + 1, & x \leq 2 \\ x - 3, & x > 2 \end{cases}$$

Para esboçar o gráfico da função mista, devemos analisar cada intervalo separadamente. Vamos analisar o primeiro intervalo.

Para  $x \leq 2$ , temos a seguinte função afim:


$$f(x) = -\frac{x}{2} + 1 = 0$$

$$-\frac{x}{2} = -1 \Rightarrow x = 2$$

Encontramos o ponto  $(2, 0)$  e sabemos que a função afim é uma reta. Precisamos encontrar outro ponto da função. Por conveniência, vamos encontrar o valor de  $f(0)$  ( $0 < 2$  pertence ao intervalo estabelecido):

$$f(0) = -\frac{0}{2} + 1 = 1$$

Temos os pontos  $(2, 0)$  e  $(0, 1)$ . O gráfico de  $f$  para  $x \leq 2$  é dado pela reta:



Resta analisar o outro intervalo.



Para  $x > 2$ :


$$f(x) = x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow x = 3$$

Como o coeficiente angular de  $f$  é positivo, temos que  $f$  é crescente nesse intervalo. Devemos analisar qual o valor de  $f$  quando  $x = 2$  (extremidade do intervalo  $x > 2$ ). Assim, encontramos:

$$f(2) = 2 - 3 = -1$$

Inserindo os pontos  $(2, -1)$  e  $(3, 0)$  e traçando a reta, obtemos o gráfico de  $f$  (lembrando que o ponto  $x = 2$  deverá ser um ponto aberto por não pertencer ao intervalo da função):



Analisando o esboço acima, podemos extrair as seguintes informações:

$$f(x) > 0 \Rightarrow x < 2 \text{ ou } x > 3$$

$$f(x) < 0 \Rightarrow 2 < x < 3$$

Representando no eixo  $x$ :



$$b) f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \leq 1 \\ x - 2, & 1 < x \leq 3 \\ -2x + 8, & x > 3 \end{cases}$$

Temos três funções afins, isto é, três retas. Vamos analisar cada intervalo.




Para  $x \leq 1$ , temos  $f(x) = x + 2$ . Sua raiz é dada por:

$$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

Encontramos o ponto  $(-2, 0)$ , precisamos de mais um ponto. Vamos calcular a ordenada de  $f$  quando  $x = 0$ :

$$f(0) = 0 + 2 = 2$$

Disso, obtemos  $(0, 2)$ . Representando  $f$  no intervalo dado, temos:



Para  $1 < x \leq 3$ , temos  $f(x) = x - 2$ . A raiz é dada por:


$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Precisamos ver qual o valor de  $f$  quando  $x = 1$  e  $x = 3$  (extremidades do intervalo  $1 < x \leq 3$ ):

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = 1 - 2 = -1$$

$$x = 3 \Rightarrow f(3) = 3 - 2 = 1$$

Pontos:  $(1, -1)$ ,  $(3, 1)$ ,  $(2, 0)$ . Representando no plano cartesiano:




Para  $x > 3$ , temos  $f(x) = -2x + 8$ . Desse modo:

$$-2x + 8 = 0 \Rightarrow x = 4$$


Para  $x = 3$ :

$$f(3) = -2(3) + 8 = 2$$

Pontos:  $(4, 0)$ ,  $(3, 2)$ . Traçando a última reta, obtemos o gráfico de  $f$ :



Do esboço acima, podemos representá-lo no eixo  $x$  indicando o sinal de  $f$ :



\*Para representar o gráfico acima, devemos pegar as raízes de  $f$  e os extremos de cada intervalo e analisar o sinal de acordo com cada função.

## 4. INEQUAÇÕES

Outro assunto muito recorrente nos vestibulares. Vamos estudar esse tema para todas as funções que são cobradas na prova e aprender como resolvê-las. Para essa aula, veremos primeiramente inequações envolvendo funções de primeiro grau. Antes de começar, vejamos quais os possíveis casos de inequações.

### 4.1. INEQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

Sejam  $f, g, h: A \rightarrow \mathbb{R}$ , três funções na variável  $x$ . As inequações simultâneas são da forma:

$$f(x) < g(x) < h(x)$$

Para resolver esse tipo de inequação, devemos separá-lo em duas inequações:

$$f(x) < g(x)$$

$$g(x) < h(x)$$

Se  $S_1$  é a solução de  $f(x) < g(x)$  e  $S_2$  é a solução de  $g(x) < h(x)$ , a solução da inequação será dada por:

$$S = S_1 \cap S_2$$

Exemplo:

Resolva a seguinte inequação definida em  $\mathbb{R}$ :

$$x - 3 < -x + 3 < 2x + 4$$

Temos inequações simultâneas. Vamos dividi-las em duas inequações e resolvê-las:

I)  $x - 3 < -x + 3$

II)  $-x + 3 < 2x + 4$

Resolvendo analiticamente:

I)  $x - 3 < -x + 3$

$$2x < 6 \Rightarrow x < 3$$

$$S_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 3\}$$

II)  $-x + 3 < 2x + 4$

$$-1 < 3x \Rightarrow -\frac{1}{3} < x \Rightarrow x > -\frac{1}{3}$$


$$S_2 = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x > -\frac{1}{3}\right\}$$



A solução é dada pela intersecção das duas soluções:

$$S = S_1 \cap S_2 = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{3} < x < 3 \right\}$$

Representando as soluções no eixo  $x$ , podemos visualizar melhor o resultado:



## 4.2. INEQUAÇÕES-PRODUTO

Sejam  $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ , duas funções na variável  $x$ . Podemos ter 4 casos de inequações-produto, veja:

$$f(x) \cdot g(x) < 0$$

$$f(x) \cdot g(x) \leq 0$$

$$f(x) \cdot g(x) > 0$$

$$f(x) \cdot g(x) \geq 0$$

A resolução de cada uma dessas inequações segue a mesma ideia. Vamos resolver a inequação  $f(x) \cdot g(x) > 0$ .

Quando resolvemos inequações-produto, devemos nos atentar ao sinal de cada função envolvida. No caso, o produto das duas funções deve resultar em um número positivo. Para isso acontecer, as duas devem possuir o mesmo sinal. As possibilidades são:

I)  $f(x) > 0$  e  $g(x) > 0$

Ou

II)  $f(x) < 0$  e  $g(x) < 0$

A solução será dada pela união da solução desses dois casos. Sendo  $S_1$ , a solução do caso (I) e  $S_2$ , a solução do caso (II), a solução será dada por:



$$S = S_1 \cup S_2$$

Vamos ver um exemplo:

Resolva a seguinte inequação definida em  $\mathbb{R}$ :

$$(x - 1)(x + 1) > 0$$

Vamos resolver algebricamente:

I)  $x - 1 > 0$  e  $x + 1 > 0$

$$x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$$

$$x + 1 > 0 \Rightarrow x > -1$$

Assim, fazendo a intersecção das duas soluções, obtemos:

$$S_1 = \{x \in \mathbb{R} | x > 1\}$$

II)  $x - 1 < 0$  e  $x + 1 < 0$

$$x - 1 < 0 \Rightarrow x < 1$$


$$x + 1 < 0 \Rightarrow x < -1$$

$$S_2 = \{x \in \mathbb{R} | x < -1\}$$

Portanto, a solução é dada pela união dessas duas soluções:

$$S = S_1 \cup S_2 = \{x \in \mathbb{R} | x > 1 \text{ ou } x < -1\}$$

Representando no eixo  $x$ :



Além do método acima, existe um modo de resolver diretamente a inequação-produto apenas com o estudo do sinal das funções envolvidas. Veja:


$$(x - 1)(x + 1) > 0$$

Vamos estudar o sinal de cada função:



$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$f(x) = x - 1$  é uma função crescente, então representando o seu sinal no eixo  $x$ , temos:



Não é necessário desenhar a reta no eixo  $x$  para encontrar o sinal da função. Isso é feito apenas para lembrar que quando temos uma função crescente, os números à direita da raiz da função resultam em números positivos e à esquerda resultam em negativos. Então, vamos tentar memorizar esse fato para acelerar a nossa velocidade de resolução de exercícios. Com isso, a reta no eixo  $x$  pode ser reescrita da seguinte forma:



Perceba que acima do eixo  $x$ , representamos os valores de  $x$  e abaixo do eixo representamos os valores que  $x - 1$  assume para os valores de  $x$ .


Para a outra função:

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

$g(x) = x + 1$  é uma função crescente, logo:



Juntando os dois eixos com seus respectivos sinais, obtemos o sinal do produto  $(x - 1)(x + 1)$ :





Poderíamos ter multiplicado as funções para obter  $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$ . Com isso, bastaria analisar o sinal da função quadrática resultante. Por enquanto, resolveremos as questões com base no que aprendemos até aqui, estudaremos funções quadráticas na próxima aula.

ESCLARECENDO!





Como desenhamos o quadro acima?

Devemos construir o quadro de sinais unindo o resultado do estudo do sinal de cada função. O quadro ficará desse modo:

	$-1$	$1$	$x$
$x - 1$	-	-	+
$x + 1$	-	+	+
$(x - 1)(x + 1)$			
	$-1$	$1$	


Para descobrir o sinal da função produto, combinamos o sinal das duas que a compõem. Lembrando que negativo com negativo resulta em positivo e que negativo com positivo resulta em negativo, temos:

	$-1$	$1$	$x$
$x - 1$	-	-	+
$x + 1$	-	+	+
$(x - 1)(x + 1)$	+		
	$-1$	$1$	




Com esse quadro, sabemos quais valores de  $x$  resultam em valores positivos ou negativos.

Se quisermos  $(x - 1)(x + 1) > 0$ :




Para  $(x - 1)(x + 1) < 0$ :



Para  $(x - 1)(x + 1) \geq 0$  ou  $(x - 1)(x + 1) \leq 0$ , basta trocar o círculo aberto pelo círculo fechado para indicar que  $-1$  e  $1$  fazem parte da solução.


$(x - 1)(x + 1) \geq 0$ :



Algebricamente, isso é equivalente a:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \text{ ou } x \geq 1\}$$

$(x - 1)(x + 1) \leq 0$ :



$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 1\}$$



Além do método acima, podemos resolver a inequação de forma mais rápida usando o método da multiplicidade das raízes das funções envolvidas. Vamos ver sua aplicabilidade nesse exemplo:

$$(x - 1)(x + 1) > 0$$

Devemos encontrar as raízes das funções envolvidas  $x - 1$  e  $x + 1$ :

$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

Representamos as raízes na reta  $x$  levando em consideração se as raízes pertencem à solução. No caso,  $\pm 1$  não pertencem à solução devido ao sinal da desigualdade, logo representamos essas raízes com o círculo aberto:



Para descobrir o sinal no intervalo  $x$ , devemos arbitrar um valor para  $x$  e encontrar o sinal resultante. Vamos ver o que ocorre quando  $x = 0$ :

$$x = 0 \Rightarrow (x - 1)(x + 1) = (0 - 1)(0 + 1) = (-1)(1) = -1$$

O sinal resultante é negativo ( $-1$ ) e o número  $0$  está entre  $-1$  e  $1$ . Dessa forma, todos os números entre  $-1$  e  $1$  são negativos:



Para encontrar o sinal do resto do intervalo, devemos verificar a multiplicidade das raízes da função. Se a multiplicidade da raiz for ímpar, o sinal do intervalo ao passar pela raiz é trocado. Se a multiplicidade for par, o sinal do intervalo é mantido.

No exemplo, a multiplicidade da raiz  $1$  é ímpar (multiplicidade  $1$ ), portanto o intervalo do lado direito da raiz  $1$  possui sinal oposto ao lado esquerdo:



Da mesma forma para a raiz  $-1$ , por possuir multiplicidade ímpar, trocamos seu sinal no lado esquerdo da raiz:



Com o eixo completo, basta encontrar os valores que interessam:



Disso, resulta:

$$S = \{x \in \mathbb{R} | -1 < x < 1\}$$

O método acima acelera a resolução das questões. Recomendo praticar esse método para aumentar sua velocidade. As resoluções das questões dessa aula serão feitas pelo método do quadro de sinais para melhor visualização do resultado.

Vamos ver um exemplo com raízes de multiplicidade par:

$$(x - 1)^4(2x + 3)(x - 3) \geq 0$$


Raízes:

$$(x - 1)^4 = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ multiplicidade } 4 \text{ (par)}$$

$$2x + 3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2} \text{ multiplicidade } 1 \text{ (ímpar)}$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3 \text{ multiplicidade } 1 \text{ (ímpar)}$$

As raízes fazem parte da solução, pois o sinal de desigualdade é "≥". Logo, representamos elas na reta real com o círculo fechado:




Vamos verificar o sinal quando  $x = 0$ :


$$(0 - 1)^4(2(0) + 3)(0 - 3) = (-1)^4(3)(-3) = -9$$

Logo, 0 resulta em números negativos no intervalo:


$$-\frac{3}{2} < 0 < 1$$




1 é uma raiz de multiplicidade par, logo ao passarmos por essa raiz, o sinal permanece igual:




3 possui multiplicidade ímpar, então devemos trocar o sinal:



$-3/2$  possui multiplicidade ímpar, logo trocamos o sinal:



A inequação pede os valores  $\geq 0$ , com isso:



A solução é dada por:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -3/2 \text{ ou } x = 1 \text{ ou } x > 3\}$$

### 4.3. INEQUAÇÕES-QUOCIENTE

Sejam  $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ , duas funções na variável  $x$ . As possibilidades de inequações-quociente são:

$$\frac{f(x)}{g(x)} > 0$$



$$\frac{f(x)}{g(x)} < 0$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$$

Para resolver esse tipo de inequação, seguimos a mesma ideia usada para as inequações-produto construindo o quadro de sinais das funções envolvidas. A diferença é que devemos nos atentar à função do denominador, esta deverá ser diferente de zero como condição de existência. Vamos ver um exemplo:

Resolva a seguinte inequação definida em  $\mathbb{R}$ :

$$\frac{3x + 9}{x - 1} \geq 2$$

Temos que zerar o outro lado da inequação para encontrar a solução. Vamos subtrair 2 nos dois lados da inequação:

$$\begin{aligned} \frac{3x + 9}{x - 1} - 2 &\geq 2 - 2 \\ \frac{3x + 9 - 2(x - 1)}{x - 1} &\geq 0 \\ \frac{3x + 9 - 2x + 2}{x - 1} &\geq 0 \\ \frac{x + 11}{x - 1} &\geq 0 \end{aligned}$$

Encontramos a inequação-quociente acima. Antes de resolvê-la, temos que encontrar sua condição de existência (denominador sempre deve ser diferente de zero!):

$$x - 1 \neq 0$$

$$x \neq 1$$

Agora podemos proceder para o estudo do sinal:


$$f(x) = x + 11 = 0 \Rightarrow x = -11$$

$f$  é crescente

$$g(x) = x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$g$  é crescente

Estudo do sinal:



Perceba que o círculo aberto no ponto  $x = 1$  para indicar que ela não pertence à solução do problema.

$$S = \{x \in \mathbb{R} | x \leq -11 \text{ ou } x > 1\}$$

PRESTEMAS  
ATENÇÃO!

$$\frac{3x+9}{x-1} \geq 2$$

Ao vermos uma inequação com a forma acima, podemos ficar tentados a fazer a regra do cruzado para simplificar a inequação e erroneamente obteríamos:

$$\begin{aligned} (3x + 9) &\geq 2(x - 1) \\ (3x + 9) - 2(x - 1) &\geq 0 \\ 3x + 9 - 2x + 2 &\geq 0 \\ x + 11 &\geq 0 \end{aligned}$$

Fazendo desse modo, perdemos o denominador e conseqüentemente encontramos um resultado incorreto.

Normalmente, as inequações dos vestibulares não estarão na forma simplificada:

$$\frac{f(x)}{g(x)} > 0$$

Elas serão da seguinte forma:

$$\frac{f(x)}{g(x)} > h(x)$$

Para resolver esse tipo de inequação, basta subtrair  $h(x)$  nos dois lados da inequação para proceder com o estudo do sinal:



$$\frac{f(x)}{g(x)} - h(x) > 0$$

$$\frac{f(x) - h(x)g(x)}{g(x)} > 0$$

O estudo do sinal envolverá as funções  $t(x) = f(x) - h(x)g(x)$  e  $g(x)$ . O resultado será a análise do sinal de  $t(x)/g(x)$ .



**7. Resolva as seguintes inequações definidas em  $\mathbb{R}$ :**

- a)  $-2 < x + 1 < 5$
- b)  $-3 < 2x + 5 < x$
- c)  $2 - x < 3x + 2 < 4x + 1$
- d)  $(2x + 1)(x + 5) \geq 0$
- e)  $(x + 1)(2x + 4) \leq 0$
- f)  $(x + 3)(-2x + 4)(x - 1) > 0$
- g)  $\frac{2x+1}{-x+1} \geq 0$
- h)  $\frac{x+1}{(x+2)(x-3)} \leq 0$
- i)  $\frac{3x+4}{x-4} \geq 3$
- j)  $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-2} - \frac{3}{x-3} < 0$

**Resolução:**

a)  $-2 < x + 1 < 5$

$$-2 < x + 1 \Rightarrow x + 1 > -2 \Rightarrow x > -3$$

$$x + 1 < 5 \Rightarrow x < 4$$

A solução é dada pela intersecção das duas acima:


$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 4\}$$

b)  $-3 < 2x + 5 < x$

$$-3 < 2x + 5 \Rightarrow 2x + 5 > -3 \Rightarrow 2x > -8 \Rightarrow x > -4$$

$$2x + 5 < x \Rightarrow x + 5 < 0 \Rightarrow x < -5$$

Nesse caso, não temos solução. A intersecção das duas soluções acima gera o conjunto vazio!



$$S = \emptyset$$

c)  $2 - x < 3x + 2 < 4x + 1$

$$2 - x < 3x + 2 \Rightarrow -4x < 0 \Rightarrow 4x > 0 \Rightarrow x > 0$$

$$3x + 2 < 4x + 1 \Rightarrow -x < -1 \Rightarrow x > 1$$

A solução é dada pela intersecção das duas acima:

$$S = \{x \in \mathbb{R} | x > 1\}$$

d)  $(2x + 1)(x + 5) \geq 0$

Inequação-produto, vamos resolver pelo estudo do sinal:

$$2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

$2x + 1$  é crescente:




$$x + 5 = 0 \Rightarrow x = -5$$

$x + 5$  é crescente:



Juntando o estudo do sinal das duas funções, obtemos o quadro de sinais abaixo:



$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq -5 \text{ ou } x \geq -\frac{1}{2} \right\}$$

e)  $(x + 1)(2x + 4) \leq 0$


$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

$x + 1$  é crescente

$$2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$2x + 4$  é crescente

Estudo do sinal:



$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq -1\}$$

f)  $(x + 3)(-2x + 4)(x - 1) > 0$

$$x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$$

$x + 3$  é crescente


$$-2x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$-2x + 4$  é decrescente

$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$x - 1$  é crescente

Estudo do sinal:



$$S = \{x \in \mathbb{R} | x < -3 \text{ ou } 1 < x < 2\}$$

g)  $\frac{2x+1}{-x+1} \geq 0$

Temos uma inequação-quociente. Vamos analisar sua condição de existência:

$$-x + 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$$

Fazendo o estudo do sinal:


$$2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

$2x + 1$  é crescente

$$-x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$-x + 1$  é decrescente

Quadro de sinais:



$$S = \{x \in \mathbb{R} | -\frac{1}{2} \leq x < 1\}$$

h)  $\frac{x+1}{(x+2)(x-3)} \leq 0$

Nesse caso, temos duas condições de existência:

$$x + 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq -2$$

$$x - 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$$



A inequação acima pode ser resolvida pelo estudo do sinal. Veja:

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

$x + 1$  é crescente

$$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$x + 2$  é crescente

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

$x - 3$  é crescente

Unindo as condições do problema, obtemos o seguinte quadro de sinais:

		-2	-1	3	$x$
$x + 1$		-	-	+	+
$x + 2$		-	+	+	+
$x - 3$		-	-	-	+
$\frac{x + 1}{(x + 2)(x - 3)}$		-	+	-	+

$$S = \{x \in \mathbb{R} | x < -2 \text{ ou } -1 \leq x < 3\}$$

i)  $\frac{3x+4}{x-4} \geq 3$

$$\frac{3x+4}{x-4} - 3 \geq 0 \Rightarrow \frac{3x+4-3(x-4)}{x-4} \geq 0 \Rightarrow \frac{3x+4-3x+12}{x-4} \geq 0$$

$$\frac{16}{x-4} \geq 0$$

Note que temos uma condição de existência:  $x - 4 \neq 0$ .

A solução é dada pelo estudo do sinal de  $x - 4$ :

$$x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$$

Como  $x \neq 4$ , temos:

$$S = \{x \in \mathbb{R} | x > 4\}$$

j)  $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-2} - \frac{3}{x-3} < 0$

Condição de existência:

$$x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$$

$$x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$$

$$x - 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$$



Resolvendo a inequação:

$$\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-2} - \frac{3}{x-3} < 0$$

$$\frac{(x-2)(x-3) + 2(x-1)(x-3) - 3(x-1)(x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)} < 0$$

$$\frac{x^2 - 5x + 6 + 2(x^2 - 4x + 3) - 3(x^2 - 3x + 2)}{(x-1)(x-2)(x-3)} < 0$$

$$\frac{x^2 - 5x + 6 + 2x^2 - 8x + 6 - 3x^2 + 9x - 6}{(x-1)(x-2)(x-3)} < 0$$

$$\frac{-4x + 6}{(x-1)(x-2)(x-3)} < 0$$

Estudo do sinal:

$$-4x + 6 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

$-4x + 6$  é decrescente

$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

$x - 1, x - 2, x - 3$  são crescentes

		1	$\frac{3}{2}$	2	3	$x$
$-4x + 6$		+	+	-	-	-
$x - 1$		-	+	+	+	+
$x - 2$		-	-	-	+	+
$x - 3$		-	-	-	-	+
$\frac{-4x + 6}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}$		-	+	-	+	-

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x < 1 \text{ ou } \frac{3}{2} < x < 2 \text{ ou } x > 3 \right\}$$



## 5. FUNÇÃO COMPOSTA E FUNÇÃO INVERSA



Vamos entender os principais conceitos desse tema e ver como ele pode ser cobrado na prova.

### 5.1. CLASSIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES

#### 5.1.1. FUNÇÃO INJETORA

A definição de função injetora é dada por:

$$f: A \rightarrow B$$

$$f \text{ é injetora} \Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in A, \text{ temos } x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$


Também podemos usar:

$$f: A \rightarrow B$$


$$f \text{ é injetora} \Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in A, \text{ temos } f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Para uma função ser injetora, devemos ter todos os elementos do conjunto  $A$  associados a elementos distintos em  $B$ .


Vamos ver exemplos de funções injetoras e não injetoras:



Nesse exemplo, todos os valores de  $x$  são associados a elementos distintos em  $y$ .



No exemplo acima, vemos que existem valores de  $x$  que são associados ao mesmo  $y$ .  
Exemplo usando diagrama de flechas:



Note que funções estritamente crescentes ou estritamente decrescentes são sempre injetoras!



### 5.1.2. FUNÇÃO SOBREJETORA

A definição de função sobrejetora é dada por:

$$f: A \rightarrow B$$

$$f \text{ é sobrejetora} \Leftrightarrow \forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y$$

Essa definição diz que dada a equação  $f(x) = y$ , devemos ter pelo menos uma solução em  $x \in A$ .


Também podemos usar:

$$f: A \rightarrow B$$


$$f \text{ é sobrejetora} \Leftrightarrow \text{Im}_f = B$$

Para uma função ser sobrejetora, a imagem da função deve ser equivalente ao seu contradomínio.

Exemplos usando diagrama de flechas:



Perceba que para uma função ser sobrejetora, devemos ter  $n(B) \leq n(A)$  (desse modo, todos os elementos de  $B$  terão algum correspondente em  $A$ ).



A imagem de  $f$  é igual ao conjunto  $B$ .



Exemplo algébrico:

Seja  $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow B$  dado por:

$$f(x) = x$$

A função  $f$  não é sobrejetora para  $B = \mathbb{R}$ , pois o domínio de  $f$  é o conjunto dos reais positivos e isso resulta em  $Im_f = \mathbb{R}_+ \neq \mathbb{R}$ . Logo, para  $f$  ser sobrejetora, temos que definir  $B = \mathbb{R}_+$ .

Com isso, podemos ver que qualquer função pode ser sobrejetora desde que o contradomínio seja igual à imagem da função.

### 5.1.3. FUNÇÃO BIJETORA

$$f: A \rightarrow B$$

$$f \text{ é bijetora} \Leftrightarrow f \text{ é injetora e } f \text{ é sobrejetora}$$

A condição de uma função ser bijetora é satisfazer as condições de ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo.

Exemplo:

Seja  $f: A \rightarrow B$  dado por:

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

Vamos verificar se  $f$  é sobrejetora.

Primeiro, devemos ver sua condição de existência:

$$cx + d \neq 0 \Rightarrow x \neq -\frac{d}{c}$$

Considerando o conjunto dos reais, temos:

$$A = \mathbb{R} - \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$$

Agora, vamos usar a definição:

$$f \text{ é sobrejetora} \Leftrightarrow \forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y$$

Então, fazendo  $f(x) = y$  e colocando  $x$  em função de  $y$ , temos:

$$\frac{ax + b}{cx + d} = y$$

$$ax + b = cxy + dy$$

$$ax - cxy = dy - b$$

$$x(a - cy) = dy - b$$

$$x = \frac{dy - b}{a - cy}$$

Condição de existência:



$$a - cy \neq 0 \Rightarrow y \neq \frac{a}{c}$$

Observando a equação de  $x$  em função de  $y$ , podemos ver que existe  $x \in A$ , com  $y \neq a/c$ , que é solução para a equação:

$$x = \frac{dy - b}{a - cy}$$

$\therefore f$  é sobrejetora

Vamos verificar se ela é injetora. Usando a definição:

**$f$  é injetora**  $\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in A$ , temos  **$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$**

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\frac{ax_1 + b}{cx_1 + d} = \frac{ax_2 + b}{cx_2 + d}$$

$$(ax_1 + b)(cx_2 + d) = (ax_2 + b)(cx_1 + d)$$

$$acx_1x_2 + adx_1 + bcx_2 + bd = acx_1x_2 + adx_2 + bcx_1 + bd$$

$$adx_1 + bcx_2 = adx_2 + bcx_1$$

$$adx_1 - bcx_1 = adx_2 - bcx_2$$

$$(ad - bc)x_1 = (ad - bc)x_2$$

Se  $ad - bc \neq 0$ , temos:

$$x_1 = x_2$$

$\therefore f$  é injetora, com  $ad - bc \neq 0$

Como  $f$  é injetora e sobrejetora, temos que  $f$  é bijetora.

## 5.2. PARIDADE

### 5.2.1. FUNÇÃO PAR


$$f: A \rightarrow B$$

$$f \text{ é par} \Leftrightarrow \forall x \in A \text{ e } -x \in A, \text{ temos } f(-x) = f(x)$$


Uma função é dita par quando satisfaz a condição:

$$f(-x) = f(x)$$

Graficamente,  $f$  deve ser simétrica em relação ao eixo  $y$ . Vejamos alguns exemplos:



O gráfico acima é um exemplo de função par.



Esse é um exemplo de função não par, pois o gráfico não é simétrico em relação ao eixo  $y$ .

Exemplo algébrico:

$$f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Vamos verificar se  $f(x) = f(-x)$ .

Para  $x > 0$ , temos  $f(x) = x$ .  $-x$  é negativo, então  $f(-x) = -(-x) = x$ . Dessa forma:

$$f(x) = x = f(-x) \Rightarrow f(x) = f(-x)$$

$\therefore f$  é par



## 5.2.2. FUNÇÃO ÍMPAR

$$f: A \rightarrow B$$

$$f \text{ é ímpar} \Leftrightarrow \forall x \in A \text{ e } -x \in A, \text{ temos } f(-x) = -f(x)$$


O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem do plano cartesiano.

Exemplos:

Seja  $f: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  dado por:

$$f(x) = 2x$$

Esboçando o gráfico da função, podemos ver que ela é ímpar:



Também podemos provar algebricamente:

Para  $x \in [-a, a]$ , temos:

$$f(x) = 2x$$

$$f(-x) = 2(-x) = -2x = -f(x)$$

Com isso, vemos que:

$$f(-x) = -f(x)$$

$$\therefore f \text{ é ímpar}$$



INDO MAIS  
FUNDO!



Qualquer função pode ser escrita como a soma de uma função par e uma função ímpar! Para dada função  $f: A \rightarrow B$ , temos:

$$f(x) = \frac{f(x)+f(-x)-f(-x)+f(x)}{2}$$

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x)+f(-x)}{2}}_{P(x)} + \underbrace{\frac{f(x)-f(-x)}{2}}_{I(x)}$$

Note que

$$P(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} \Rightarrow P(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} \therefore P(x) = P(-x)$$

$$I(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2} \Rightarrow I(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} \therefore I(-x) = -I(x)$$

$P$  é a função par e  $I$  é a função ímpar!


### 5.3. FUNÇÃO COMPOSTA

Vimos no capítulo de Relações, o conceito de relação composta. Vamos relembrar:

Seja  $R \in A \times B$  e  $T \in B \times C$ , a relação composta de  $T$  em  $R$  é:

$$ToR = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B \text{ tal que } (a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in T\}$$

Diagrama de flechas:



Podemos aplicar o mesmo conceito de relação composta às funções.




Vamos ver uma definição de função composta.


Uma função composta genérica de  $f: A \rightarrow B$  e  $g: B' \rightarrow C$ , com  $f(A) \subset B'$ , é dada por  $h: A \rightarrow C$  tal que:

$$h(x) = g(f(x)) = g \circ f(x)$$

Vejamos o diagrama de flechas dessa composição. Para  $f: A \rightarrow B$ :




Para  $g: B' \rightarrow C$ :




Perceba que consideramos  $B' \neq B$  para generalizar o resultado.

Nesse diagrama, temos  $B \cap B' \neq \emptyset$ .


Consideramos que  $f(A) \subset B'$ , então unindo os diagramas de flechas, obtemos:



Como  $f(A) \subset B'$  e  $g(B') \subset C$ , temos  $g(f(A)) \subset g(B') \subset C$ :



Seja  $h: A \rightarrow C$  tal que  $h = g \circ f$ :



Usamos o diagrama de flechas para visualizar o que ocorre com uma função composta genérica. Vamos ver sua definição algébrica:

Seja  $f: A \rightarrow B$  e  $g: B' \rightarrow C$ , com  $f(A) \subset B'$ .

$$\forall x \in A, \exists y \in B \text{ tal que } f(x) = y$$

Se  $f(A) \subset B'$ , então  $y \in f(A)$  implica  $y \in B'$ .


$$\forall y \in B', \exists z \in C \text{ tal que } g(y) = z$$

Unindo os resultados acima, temos:

$$\forall x \in A, \exists z \in C \text{ tal que } g(f(x)) = z$$

Sendo  $h: A \rightarrow C$  com  $h(x) = g(f(x)) = gof(x)$ ,  $h$  é chamada de composta de  $f$  com  $g$ .

Geralmente, as questões envolvendo compostas considerarão  $B' = B$ :





Exemplos:

Sejam as funções  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que:

$$f(x) = x + 3$$

$$g(x) = x^2$$

A composta  $gof$  é dada por:

$$gof(x) = g(f(x)) = g(x + 3) = (x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

Para a composta  $fog$ :

$$fog(x) = f(g(x)) = f(x^2) = x^2 + 3$$

Como  $gof \neq fog$ , podemos afirmar que essa operação é não comutativa.

Também podemos fazer a composta  $fof$ :

$$fof(x) = f(f(x)) = f(x) + 3 = (x + 3) + 3 = x + 6$$

### 5.3.1. TEOREMA

Sejam as funções  $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D$ , temos:

$$(hog)of = ho(gof)$$

Diz-se que essa operação é associativa.

Demonstração:

Para qualquer  $x \in A$ , temos:

$$f(x) = y, g(y) = z, h(z) = w$$

Fazendo as composições:

$$((hog)of)(x) = (hog)(f(x)) = (hog)(y) = h(g(y)) = h(z) = w$$

$$(gof)(x) = g(f(x)) = g(y) = z$$

$$(ho(gof))(x) = h(gof(x)) = h(z) = w$$

$$\therefore (hog)of = ho(gof)$$

Exemplo:

Sejam  $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$f(x) = x + 3$$

$$g(x) = x^2$$

$$h(x) = 2x - 1$$

Vamos encontrar  $(hog)of$ :

$$hog(x) = h(g(x)) = 2g(x) - 1 = 2x^2 - 1$$

$$((hog)of)(x) = hog(f(x)) = 2(f(x))^2 - 1 = 2(x + 3)^2 - 1 = 2(x^2 + 6x + 9) - 1$$



$$\Rightarrow 2x^2 + 12x + 17$$

Para  $ho(gof)$ :

$$\begin{aligned} (ho(gof))(x) &= h(gof(x)) = 2gof(x) - 1 \\ gof(x) &= g(f(x)) = [f(x)]^2 = (x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \\ (ho(gof))(x) &= 2(x^2 + 6x + 9) - 1 = 2x^2 + 12x + 17 \end{aligned}$$

### 5.3.2. PROPRIEDADES

$$\text{P1) } \left\{ \begin{array}{l} f: A \rightarrow B \text{ injetora} \\ g: B \rightarrow C \text{ injetora} \Rightarrow gof \text{ é injetora} \\ gof: A \rightarrow C \end{array} \right.$$

$$\text{P2) } \left\{ \begin{array}{l} f: A \rightarrow B \text{ sobrejetora} \\ g: B \rightarrow C \text{ sobrejetora} \Rightarrow gof \text{ é sobrejetora} \\ gof: A \rightarrow C \end{array} \right.$$

$$\text{P3) } \left\{ \begin{array}{l} f: A \rightarrow B \text{ bijetora} \\ g: B \rightarrow C \text{ bijetora} \Rightarrow gof \text{ é bijetora} \\ gof: A \rightarrow C \end{array} \right.$$

$$\text{P4) } \left\{ \begin{array}{l} f: A \rightarrow B \\ g: B \rightarrow C \\ gof: A \rightarrow C \text{ injetora} \end{array} \right. \Rightarrow f \text{ é injetora e } g \text{ é função}$$

$$\text{P5) } \left\{ \begin{array}{l} f: A \rightarrow B \\ g: B \rightarrow C \\ gof: A \rightarrow C \text{ sobrejetora} \end{array} \right. \Rightarrow g \text{ é sobrejetora}$$

$$\text{P6) } \left\{ \begin{array}{l} f: A \rightarrow B \\ g: B \rightarrow C \\ gof: A \rightarrow C \text{ bijetora} \end{array} \right. \Rightarrow f \text{ é injetora e } g \text{ é sobrejetora}$$

Demonstração:

$$\text{P1) } \left\{ \begin{array}{l} f: A \rightarrow B \text{ injetora} \\ g: B \rightarrow C \text{ injetora} \Rightarrow gof \text{ é injetora} \\ gof: A \rightarrow C \end{array} \right.$$

$$\forall x_1, x_2 \in A, \text{ temos } gof(x_1) = gof(x_2)$$

$$\Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2))$$

Como  $g$  é injetora, temos:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

Sendo  $f$  também injetora, obtemos:

$$x_1 = x_2$$

Logo, encontramos a seguinte informação:

$$gof(x_1) = gof(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$



Essa é a definição de função injetora, portanto  $g \circ f$  é injetora.

$$\text{P2) } \left\{ \begin{array}{l} f: A \rightarrow B \text{ sobrejetora} \\ g: B \rightarrow C \text{ sobrejetora} \\ g \circ f: A \rightarrow C \end{array} \Rightarrow g \circ f \text{ é sobrejetora} \right.$$

Usando a definição de sobrejetora para  $f$  e  $g$ , temos:

$$\forall z \in C, \exists y \in B \text{ tal que } g(y) = z$$

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y$$

Juntando as duas informações, obtemos:

$$\forall z \in C, \exists x \in A \text{ tal que } g(f(x)) = z$$

Dessa forma:

$$g \circ f(x) = z$$

Logo,  $g \circ f$  é sobrejetora.

$$\text{P3) } \left\{ \begin{array}{l} f: A \rightarrow B \text{ bijetora} \\ g: B \rightarrow C \text{ bijetora} \\ g \circ f: A \rightarrow C \end{array} \Rightarrow g \circ f \text{ é bijetora} \right.$$

Essa propriedade é um corolário. Podemos usar as propriedades P1 e P2 para concluir que  $f, g$  bijetoras implica  $g \circ f$  bijetora.

$$\text{P4) } \left\{ \begin{array}{l} f: A \rightarrow B \\ g: B \rightarrow C \\ g \circ f: A \rightarrow C \text{ injetora} \end{array} \Rightarrow f \text{ é injetora e } g \text{ é função} \right.$$

$$\forall x_1, x_2 \in A, \text{ vamos supor } f(x_1) = f(x_2)$$

Considerando que  $g$  é função, podemos aplicar  $g$  em  $f$ :

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2))$$

$$g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$$

Como  $g \circ f$  é injetora, temos:

$$x_1 = x_2$$

Com isso, concluímos:

$$\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$f$  é injetora

$g$  deve ser função



$$P5) \begin{cases} f: A \rightarrow B \\ g: B \rightarrow C \\ \text{gof}: A \rightarrow C \text{ sobrejetora} \end{cases} \Rightarrow g \text{ é sobrejetora}$$

Usando a definição de  $\text{gof}$  ser sobrejetora:

$$\forall z \in C, \exists x \in A \text{ tal que } \text{gof}(x) = z$$

Aplicando a definição de função em  $f$ :

$$\forall x \in A, \exists y \in B \text{ tal que } f(x) = y$$

Juntando as informações:

$$\forall z \in C, \exists y \in B \text{ tal que } g(y) = z$$

Portanto,  $g$  é sobrejetora.

$$P6) \begin{cases} f: A \rightarrow B \\ g: B \rightarrow C \\ \text{gof}: A \rightarrow C \text{ bijetora} \end{cases} \Rightarrow f \text{ é injetora e } g \text{ é sobrejetora}$$

Essa propriedade é um corolário, consequência das propriedades P4 e P5.


## 5.4. FUNÇÃO INVERSA

### 5.4.1. DEFINIÇÃO

Uma função  $f: A \rightarrow B$  é inversível se, e somente se, sua relação inversa  $f^{-1}: B \rightarrow A$  for também uma função.


Definimos a função inversa de  $f$  como  $f^{-1}$ .

Vejam um exemplo usando diagrama:



$f$  não é inversível, pois ao fazer a inversa, o conjunto  $B$  torna-se o domínio de  $f^{-1}$  e como condição de função, todos os elementos de  $B$  devem ser associados a algum elemento de  $A$ . Pelo diagrama, sabemos que isso não é satisfeito.

Vejam um exemplo de função inversível:



Pelo diagrama, podemos ver que  $g$  e  $g^{-1}$  são funções. Logo,  $g$  é inversível.

$f^{-1}$  é uma relação inversa de  $f$ . Vimos no capítulo de relação inversa que os pares ordenados da relação inversa podem ser obtidos invertendo-se os pares ordenados da própria relação. A nossa relação em análise é a função  $f$ , com isso, podemos escrever:

$$(x, y) \in f \Leftrightarrow (y, x) \in f^{-1}$$

Os pares ordenados de  $f^{-1}$  são obtidos trocando-se a ordem dos pares. Usando a propriedade acima, vamos ver o que acontece quando aplicamos a inversa em  $f^{-1}$ :

$$(y, x) \in f^{-1} \Leftrightarrow (x, y) \in (f^{-1})^{-1}$$

$$(x, y) \in f \Leftrightarrow (y, x) \in f^{-1} \Leftrightarrow (x, y) \in (f^{-1})^{-1}$$

$$(x, y) \in f \Leftrightarrow (x, y) \in (f^{-1})^{-1}$$

O resultado acima nos mostra que  $f = (f^{-1})^{-1}$ , isto é, a inversa da inversa de  $f$  é a própria função  $f$ .

### 5.4.2. TEOREMA

**Uma função  $f: A \rightarrow B$  é inversível se, e somente se,  $f$  for bijetora.**

Demonstração:

Devemos demonstrar os dois lados do teorema.

1) Se  $f: A \rightarrow B$  é inversível, então  $f$  é bijetora.

Sendo  $f: A \rightarrow B$  inversível, temos  $f^{-1}: B \rightarrow A$  é função.

Da definição de  $f^{-1}$  ser função:

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } f^{-1}(y) = x$$

Então, podemos escrever:

$$(y, x) \in f^{-1}$$

Isso implica:



$$(x, y) \in f$$

Logo,  $\forall y \in B$  temos  $(x, y) \in f$ . Dessa informação, temos  $Im_f = B$ .

Portanto,  $f$  é sobrejetora.

Vamos demonstrar que  $f$  é injetora pela redução ao absurdo:

Sejam  $x_1, x_2 \in A$  com  $x_1 \neq x_2$ . Supondo que  $f(x_1) = f(x_2) = y$ , temos  $f^{-1}(y) = x_1$  e  $f^{-1}(y) = x_2$ . Chegamos a um absurdo, pois  $f^{-1}$  é função e cada  $y \in B$  pode ter apenas uma imagem. Desse modo, podemos concluir:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

$f$  é injetora.

II) Se  $f$  é bijetora, então  $f: A \rightarrow B$  é inversível.

Se  $f: A \rightarrow B$  é inversível, então  $f^{-1}: B \rightarrow A$  é função.

Sendo  $f$  bijetora, temos que  $f$  é injetora e sobrejetora.

Usando a definição de sobrejetora de  $f$ :

$$Im_f = B$$

Dessa forma, podemos escrever:

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } (x, y) \in f$$

Logo,  $(y, x) \in f^{-1}$ .

Usando a definição de injetora de  $f$ :

Seja  $y \in B$  e  $x_1, x_2 \in A$  tal que:

$$(y, x_1) \in f^{-1} \text{ e } (y, x_2) \in f^{-1}$$

Essa informação implica:

$$(x_1, y) \in f \text{ e } (x_2, y) \in f$$

Como estabelecido inicialmente,  $f$  é injetora. Logo,  $x_1 = x_2$ .

$\therefore f^{-1}$  é função

### 5.4.3. PROPRIEDADES

Considerando  $f: A \rightarrow B$  e  $g: B \rightarrow C$  funções bijetoras, temos:

**P1)**  $f \circ f^{-1}(y) = y \Rightarrow f \circ f^{-1} = I_B$  e  $f^{-1} \circ f(x) = x \Rightarrow f^{-1} \circ f = I_A$  ( $I_X$  é a função identidade ( $f(x) = x$ ) do conjunto  $X$ )

**P2)** A inversa de  $f$  é única

**P3)** ( $f: A \rightarrow B$  inversível e monotônica)  $\Rightarrow$  ( $f^{-1}: B \rightarrow A$  é de mesma monotonicidade de  $f$ )


**P4)**  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Demonstrações:

**P1)**  $f \circ f^{-1}(y) = y = I_B$  e  $f^{-1} \circ f(x) = x = I_A$  ( $I_A$  é a função identidade do conjunto  $A$ )



Pelo diagrama de flechas:



**P2)** A inversa de  $f$  é única

Sejam as funções  $g_1, g_2$  inversas de  $f$ :

$$\begin{cases} g_1: B \rightarrow A \\ g_2: B \rightarrow A \end{cases}$$

Sendo inversas, podemos usar P1 e obter:

$$f \circ g_1 = I_B \text{ e } g_1 \circ f = I_A$$

$$f \circ g_2 = I_B \text{ e } g_2 \circ f = I_A$$

Como  $I_B$  é a função identidade do conjunto  $B$  e o domínio de  $g_1$  é  $B$ , podemos escrever:

$$g_1 = g_1 \circ I_B$$

Substituindo  $I_B = f \circ g_2$ :

$$g_1 \circ I_B = g_1 \circ (f \circ g_2)$$

Usando o teorema da função composta:

$$g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2$$

Substituindo  $g_1 \circ f = I_A$ :

$$\begin{aligned} (g_1 \circ f) \circ g_2 &= I_A \circ g_2 = g_2 \\ \Rightarrow g_1 &= g_2 \end{aligned}$$

Portanto, a inversa é única.

**P3)** ( $f: A \rightarrow B$  inversível e monotônica)  $\Rightarrow$  ( $f^{-1}: B \rightarrow A$  é de mesma monotonicidade de  $f$ )

Vamos supor que  $f$  é estritamente decrescente (a demonstração para as outras monotonicidades seguem a mesma ideia). Dessa forma, podemos escrever:

$$x_1 > x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Usando a propriedade P1  $f^{-1} \circ f(x) = x$ , temos:



$$f^{-1} \circ f(x_1) > f^{-1} \circ f(x_2) \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Reescrevendo os termos:

$$f(x_1) < f(x_2) \Leftrightarrow f^{-1}(f(x_1)) > f^{-1}(f(x_2))$$

Portanto, concluímos que  $f^{-1}$  também é estritamente decrescente.

**P4)**  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$


As funções  $f$  e  $g$  são inversíveis, pois elas são bijetoras.

Usando as propriedades da função composta, temos:

$$f, g \text{ bijetoras} \Rightarrow g \circ f \text{ bijetora}$$

Como  $g \circ f$  é bijetora,  $g \circ f$  é inversível.

Vamos representar as funções pelo diagrama de flechas:



Pela propriedade P1, podemos escrever:

$$f^{-1} \circ f = I_A$$

$$f \circ f^{-1} = I_B$$

$$g^{-1} \circ g = I_C$$

$$g \circ g^{-1} = I_C$$

Queremos provar que  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ . Note que:

$$(g \circ f)^{-1} \circ (g \circ f) = I_A$$

$$(g \circ f) \circ (g \circ f)^{-1} = I_C$$

Então, se substituirmos  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$  devemos encontrar a seguinte igualdade:

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = I_A$$

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = I_C$$

Para demonstrar a propriedade, precisamos provar que as igualdades acima são válidas.



Vamos desenvolver  $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f)$ . Usando a propriedade associativa da composta:

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = [(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ g] \circ f = [f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g)] \circ f$$

Substituindo  $g^{-1} \circ g = I_B$ :

$$[f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g)] \circ f = [f^{-1} \circ I_B] \circ f$$

Mas  $f^{-1} \circ I_B = f^{-1}$ , pois  $I_B$  resulta no domínio de  $f^{-1}$ :

$$[f^{-1} \circ I_B] \circ f = f^{-1} \circ f = I_A$$

$$\therefore (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = I_A$$

Agora, provando a outra igualdade:

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = [(g \circ f) \circ f^{-1}] \circ g^{-1} = [g \circ (f \circ f^{-1})] \circ g^{-1}$$

Substituindo  $f \circ f^{-1} = I_B$ :

$$[g \circ (f \circ f^{-1})] \circ g^{-1} = [g \circ I_B] \circ g^{-1}$$

$g \circ I_B = g$ , pois  $I_B$  é a função identidade do domínio de  $g$ :

$$[g \circ I_B] \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = I_C$$

$$\therefore (g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = I_C$$

Portanto, provamos as igualdades e, com isso, podemos afirmar:

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$



**8.** Determine a função inversa das funções abaixo:

a)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $f(x) = 3x + 1$

b)  $f: A \rightarrow B$  e  $f(x) = \frac{3x+2}{x-4}$

**Resolução:**

a)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $f(x) = 3x + 1$

Antes de encontrar a inversa de uma função, devemos verificar se ela é inversível. Para isso, basta provar que ela é bijetora.

Para provar que  $f$  é injetora, podemos usar dois métodos:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Ou

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Vamos demonstrar pelos dois métodos:



$$I) x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow 3x_1 \neq 3x_2 \Rightarrow 3x_1 + 1 \neq 3x_2 + 1 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$II) f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 3x_1 + 1 = 3x_2 + 1 \Rightarrow 3x_1 = 3x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$$

Portanto, provamos que  $f$  é injetora.

ESCLARECENDO!



\*Observações: Para usar o método (I), devemos partir de  $x_1 \neq x_2$  e manipulá-lo para chegar até  $f(x_1) \neq f(x_2)$ . Para o método (II), devemos partir de  $f(x_1) = f(x_2)$  e provar que  $x_1 = x_2$ .

Agora, devemos provar que  $f$  é sobrejetora. Também podemos provar por dois caminhos diferentes:

$$f: A \rightarrow B$$

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y$$

Ou

$$Im_f = B$$

Vamos provar pelos dois métodos:

$$I) \forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y$$

Para provar desse modo, primeiro fazemos  $f(x) = y$  e isolamos  $x$ :

$$f(x) = y \Rightarrow y = 3x + 1$$

$$x = \frac{y-1}{3}$$

Agora, temos que mostrar que existe solução em  $x \in A$ . No caso,  $A = \mathbb{R}$  e  $B = \mathbb{R}$ . Como  $x \in \mathbb{R}$ , temos que qualquer  $y \in \mathbb{R}$  satisfaz a equação. Logo,  $f$  é sobrejetora.

$$II) Im_f = B$$

Basta provar que a imagem de  $f$  é o contradomínio.

Sendo  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $f(x) = 3x + 1$ :

Como  $x \in \mathbb{R}$ , temos  $3x + 1 \in \mathbb{R}$ . Logo,  $Im_f = \mathbb{R}$ .

$\therefore f$  é sobrejetora

Disso resulta que  $f$  é bijetora e possui inversa.

Para encontrar a inversa da função  $f$ , basta fazer  $x = f^{-1}(y)$  e substituir na equação de  $x$  em função de  $y$ :

$$x = \frac{y-1}{3}$$



$$f^{-1}(y) = \frac{y-1}{3}$$

b)  $f: A \rightarrow B$  e  $f(x) = \frac{3x+2}{x-4}$

Essa função possui condição de existência. O denominador deve ser diferente de zero:

$$x - 4 \neq 0 \Rightarrow x \neq 4$$

Vamos definir  $A = \mathbb{R} - \{4\}$ .

Antes de encontrar a inversa, devemos provar que  $f$  é bijetora.

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{4\}, f(x_1) = f(x_2)$$

$$\Rightarrow \frac{3x_1+2}{x_1-4} = \frac{3x_2+2}{x_2-4}$$

$$(3x_1 + 2)(x_2 - 4) = (3x_2 + 2)(x_1 - 4)$$

$$3x_1x_2 - 12x_1 + 2x_2 - 8 = 3x_1x_2 - 12x_2 + 2x_1 - 8$$

$$2x_2 + 12x_2 = 2x_1 + 12x_1$$

$$14x_2 = 14x_1$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

$\therefore f$  é injetora

$\forall y \in B, f(x) = y:$

$$\frac{3x+2}{x-4} = y$$

$$3x + 2 = yx - 4y$$

$$2 + 4y = yx - 3x$$

$$2 + 4y = x(y - 3)$$

$$x = \frac{2+4y}{y-3}$$

$x$  possui solução em  $\mathbb{R} - \{4\}$  se  $y - 3 \neq 0$ :

$$y - 3 \neq 0 \Rightarrow y \neq 3$$

Então, devemos definir  $B = \mathbb{R} - \{3\}$  para  $x$  ter solução e  $f$  ser sobrejetora.

A inversa de  $f$  é dada por:

$$x = \frac{2+4y}{y-3}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{2+4y}{y-3}$$

**Gabarito:** a)  $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{3}$     b)  $f^{-1}(y) = \frac{2+4y}{y-3}$



## 6. QUESTÕES NÍVEL 1

1. (EEAR/2003)

A função  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  definida por  $f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{se } n \text{ é par} \\ \frac{n+1}{2}, & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$  é

- a) Bijetora
- b) Somente injetora
- c) Somente sobrejetora
- d) Não injetora e não sobrejetora

2. (EEAR/2003)

É par a função  $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

- a)  $f(x) = \frac{1}{x^2}$
- b)  $f(x) = \frac{1}{x}$
- c)  $f(x) = x$
- d)  $f(x) = x^5$

3. (EEAR/2005)


O maior valor inteiro de  $k$  que torna crescente a função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = 2 - (3 + 5k)x$ , é

- a) 1
- b) 0
- c) -1
- d) -2

4. (EEAR/2007)

Considere o gráfico da função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e as afirmativas a seguir:

- I.  $D(f) = \mathbb{R}$
- II.  $Im(f) = \mathbb{R}$
- III.  $f(-1) = f(1)$
- IV.  $f$  é crescente no intervalo  $[1, 3]$ .



Das 4 afirmativas,


- a) Todas são verdadeiras
- b) Apenas uma é falsa
- c) Duas são falsas.
- d) Apenas uma é verdadeira.

5. (EEAR/2008)


Considere os gráficos.



Função I



Função II



Função III

É(são) injetora(s) a(s) função(ões)

- a) I e III, apenas
- b) III, apenas
- c) I, apenas
- d) I, II e III.

6. (EEAR/2008)

Para que  $f(x) = (2m - 6)x + 4$  seja crescente em  $\mathbb{R}$ , o valor real de  $m$  deve ser tal que


- a)  $m > 3$
- b)  $m < 2$
- c)  $m < 1$



d)  $m = 0$

7. (EEAR/2009)

Sejam os gráficos de  $f(x) = ax + b$  e  $g(x) = cx + d$ .



Podemos afirmar que

- a)  $a > 0$  e  $b < 0$
- b)  $a < 0$  e  $d > 0$
- c)  $b > 0$  e  $d > 0$
- d)  $c > 0$  e  $d < 0$

8. (EEAR/2010)


A função  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , definida por  $f(x) = 3x + 2$ ,

- a) É apenas injetora.
- b) É apenas sobrejetora.
- c) É injetora e sobrejetora.
- d) Não é injetora e nem sobrejetora.


9. (EEAR/2010)

Considerando  $D = [0, 10]$  o domínio de uma função  $y = f(x)$ , um gráfico que poderia representá-la é


a)




b)



c)



d)



10. (EEAR/2011)

A função  $g: [-5, 5] \rightarrow B$  tem como imagem o conjunto  $I = [20, 30]$ . Para que ela seja sobrejetora é necessário que  $B$  seja igual ao intervalo

- a)  $[5, 20]$ .
- b)  $[-5, 20]$ .
- c)  $[-5, 30]$ .
- d)  $[20, 30]$

11. (EEAR/2011)

A função definida por  $y = m(x - 1) + 3 - x$ ,  $m \in \mathbb{R}$ , será crescente, se

- a)  $m \geq 0$
- b)  $m > 1$
- c)  $-1 < m < 1$
- d)  $-1 < m \leq 0$

12. (EEAR/2013)


Para que uma função seja invertível, é necessário que ela seja:



- a) Sobrejetora e positiva
- b) Bijetora e positiva
- c) Apenas bijetora
- d) Apenas injetora

13. (EEAR/2013)

Analisando o gráfico da função  $f$  da figura, percebe-se que, nos intervalos  $[-5, -2]$  e  $[-1, 2]$  de seu domínio, ela é, respectivamente,



- a) Crescente e crescente
- b) Crescente e decrescente
- c) Decrescente e crescente
- d) Decrescente e decrescente

14. (EEAR/2015)

Sejam  $f$  e  $g$  funções polinomiais de primeiro grau, tais que o gráfico de  $f$  passa por  $(2, 0)$  e o de  $g$ , por  $(-2, 0)$ . Se a interseção dos gráficos é o ponto  $(0, 3)$ , é correto afirmar que

- a)  $f$  e  $g$  são crescentes
- b)  $f$  e  $g$  são decrescentes.
- c)  $f$  é crescente e  $g$  é decrescente
- d)  $f$  é decrescente e  $g$  é crescente

15. (ESA/2017)

Com relação às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras podemos afirmar que:

- a) Se é injetora e não é sobrejetora então ela é bijetora.
- b) Se é sobrejetora então ela é injetora.
- c) Se é injetora e sobrejetora então ela é bijetora.



- d) Se é injetora então ela é sobrejetora.
- e) Se é sobrejetora e não é injetora então ela é bijetora.

16. (ESA/2016)

Sejam as funções reais dadas por  $f(x) = 5x + 1$  e  $g(x) = 3x - 2$ . Se  $m = f(n)$ , então  $g(m)$  vale:

- a)  $15n + 1$
- b)  $14n - 1$
- c)  $3n - 2$
- d)  $15n - 15$
- e)  $14n - 2$

17. (EEAR/2005)

Seja a função  $f$  de  $\mathbb{R} - \{3\}$  em  $\mathbb{R} - \{1\}$ , definida por  $f(x) = \frac{x+3}{x-3}$ . Pela inversa de  $f$ , o número 5 é imagem do número

- a)  $\frac{1}{4}$
- b)  $\frac{1}{3}$
- c) 4
- d) 3

18. (EEAR/2007)

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  a função definida por  $f(x) = \frac{1+x}{3}$  e  $g$  a função inversa de  $f$ . Então,  $g(2)$  é:

- a) -4
- b) -1
- c) 3
- d) 5

19. (EEAR/2010)

Sejam  $f$  e  $g$  duas funções inversas entre si. Se  $f(x) = 3x - 2$ , então  $g(1)$  é igual a:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

**20. (EEAR/2014)**

Seja a função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = 4x - 3$ . Se  $f^{-1}$  é a função inversa de  $f$ , então  $f^{-1}(5)$  é

- a) 17
- b)  $\frac{1}{17}$
- c) 2
- d)  $\frac{1}{2}$

**21. (EEAR/2015)**

Seja  $f(x) = 4x + 3$  uma função inversível. A fórmula que define a função inversa  $f^{-1}(x)$  é:

- a)  $\frac{x-4}{3}$
- b)  $\frac{x-3}{4}$
- c)  $\frac{2x+3}{4}$
- d)  $\frac{2x+4}{3}$

**22. (EEAR/2002)**

O gráfico de uma função  $f$  é o segmento de reta que une os pontos  $(-3, 4)$  e  $(3, 0)$ . Se  $f^{-1}$  é a função inversa de  $f$ , então  $f^{-1}(2)$  é

- a) 2
- b) 0
- c)  $-\frac{3}{2}$
- d)  $\frac{3}{2}$

**23. (EEAR/2017)**

Sabe-se que a função  $f(x) = \frac{x+3}{5}$  é invertível. Assim,  $f^{-1}(3)$  é

- a) 3
- b) 4
- c) 6
- d) 12

**24. (EEAR/2018)**


Se  $f(x) = \frac{1+3x}{x+3}$ , com  $x \in \mathbb{R}$  e  $x \neq -3$ , é uma função invertível, o valor de  $f^{-1}(2)$  é



- a) -2
- b) -1
- c) 3
- d) 5

**25. (EEAR/2003)**

Seja a função inversível  $f$  de gráfico abaixo.



A lei que define  $f^{-1}$  é

- a)  $y = 3x + \frac{3}{2}$
- b)  $y = 2x - \frac{3}{2}$
- c)  $y = \frac{2x}{3} + 2$
- d)  $y = \frac{3x}{2} - 3$

**26. (EEAR/2011)**

Funções bijetoras possuem função inversa porque elas são invertíveis, mas devemos tomar cuidado com o domínio da nova função obtida. Identifique a alternativa que apresenta a função inversa de  $f(x) = x + 3$ .

- a)  $f(x)^{-1} = x - 3$
- b)  $f(x)^{-1} = x + 3$
- c)  $f(x)^{-1} = -x - 3$
- d)  $f(x)^{-1} = -x + 3$
- e)  $f(x)^{-1} = 3x$

**27. (EsPCEX/2004)**


Sejam as funções reais  $f(x)$  e  $g(x)$ . Se  $f(x) = x + 2$  e  $f(g(x)) = x/2$ , pode-se afirmar que a função inversa de  $g(x)$  é:



- a)  $g^{-1}(x) = \frac{f(x)}{2}$
- b)  $g^{-1}(x) = \frac{x+4}{2}$
- c)  $g^{-1}(x) = f(x)$
- d)  $g^{-1}(x) = 2f(x)$
- e)  $g^{-1}(x) = \frac{x-4}{2}$

**28. (EsPCEEx/2012)**

Na figura abaixo está representado o gráfico de uma função real do 1º grau  $f(x)$ . A expressão algébrica que define a função inversa de  $f(x)$  é



- a)  $y = \frac{x}{2} + 1$
- b)  $y = x + \frac{1}{2}$
- c)  $y = 2x - 2$
- d)  $y = -2x + 2$
- e)  $y = 2x + 2$

**29. (EsPCEEx/2014)**

Considere a função bijetora  $f: [1, +\infty) \rightarrow (-\infty, 3]$ , definida por  $f(x) = -x^2 + 2x + 2$  e seja  $(a, b)$  o ponto de interseção de  $f$  com sua inversa. O valor numérico da expressão  $a + b$  é:

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8
- e) 10

**30. (ESA/2012)**

Se  $f(2x + 1) = x^2 + 2x$ , então  $f(2)$  vale:



- a)  $\frac{5}{4}$
- b)  $\frac{3}{2}$
- c)  $\frac{1}{2}$
- d)  $\frac{3}{4}$
- e)  $\frac{5}{2}$

**31. (ESA/2015)**

Sejam  $f$  a função dada por  $f(x) = 2x + 4$  e  $g$  a função dada por  $g(x) = 3x - 2$ . A função composta deve ser dada por

- a)  $f(g(x)) = 6x$
- b)  $f(g(x)) = 6x + 4$
- c)  $f(g(x)) = 2x - 2$
- d)  $f(g(x)) = 3x + 4$
- e)  $f(g(x)) = 3x + 2$

<b>GABARITO</b>
-----------------

- 1. c
- 2. a
- 3. c
- 4. b
- 5. b
- 6. a
- 7. d
- 8. a
- 9. b
- 10. d
- 11. b
- 12. c
- 13. b
- 14. d
- 15. c
- 16. a
- 17. c
- 18. d
- 19. b
- 20. c
- 21. b
- 22. b



- 23. d
- 24. d
- 25. d
- 26. a
- 27. d
- 28. c
- 29. b
- 30. a
- 31. a

## RESOLUÇÃO

### 1. (EEAR/2003)

A função  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  definida por  $f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{se } n \text{ é par} \\ \frac{n+1}{2}, & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$  é

- a) Bijetora
- b) Somente injetora
- c) Somente sobrejetora
- d) Não injetora e não sobrejetora

#### Comentários

Para analisarmos a função, basta olharmos a imagens de alguns números naturais:

$$x = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots\}$$

Observe que  $f(x)$  para cada  $x$  acima, na mesma ordem, será:

$$f(x) = \left\{ \frac{1+1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3+1}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5+1}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7+1}{2}, \frac{8}{2}, \dots \right\} = \{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, \dots\}$$

Isto é, para  $x = 2k$  (par):

$$f(2k) = k$$

Para  $x = 2k - 1$  (ímpar):

$$f(2k - 1) = \frac{(2k - 1) + 1}{2} = \frac{2k}{2} = k$$

Assim, veja que o conjunto imagem dessa função será o conjunto dos naturais (contradomínio) e, portanto, ela é sobrejetora. Entretanto, ela não pode ser injetora, pois:

$$f(2k) = f(2k - 1) = k$$

Isto é, existem números distintos no domínio de  $f$ , no caso:  $2k$  e  $2k - 1$ , que geram uma mesma imagem ( $k$ ). Portanto, ela não é injetora, mas é sobrejetora, pois como vimos:

$$f(x) = \{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, \dots\} = \mathbb{N}$$

**Gabarito: "c".**



**2. (EEAR/2003)**

É par a função  $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

- a)  $f(x) = \frac{1}{x^2}$
- b)  $f(x) = \frac{1}{x}$
- c)  $f(x) = x$
- d)  $f(x) = x^5$

**Comentários**

Função par é aquela que satisfaz, para todo seu domínio:

$$f(x) = f(-x)$$

Analisando  $f(-x)$  da letra a):

$$f(-x) = \frac{1}{(-x)^2} = \frac{1}{x^2} = f(x) \Rightarrow f(x) = f(-x) \forall x \in \mathbb{R}^*$$

Portanto, a função da letra a) é par. Marque-a. Se analisar  $f(-x)$  para as demais alternativas, verá que não são iguais a  $f(x)$ .

**Gabarito: "a".**

---

**3. (EEAR/2005)**

O maior valor inteiro de  $k$  que torna crescente a função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = 2 - (3 + 5k)x$ , é

- a) 1
- b) 0
- c) -1
- d) -2

**Comentários**

A função dada é de primeiro grau. Sabemos que uma função de primeiro grau é crescente apenas se seu coeficiente angular é positivo. Portanto:

$$-(3 + 5k) > 0 \Rightarrow 3 + 5k < 0 \Rightarrow 5k < -3 \Rightarrow k < -\frac{3}{5} = -0,6$$

Assim, o maior inteiro  $k$  menor que  $-0,6$  é  $-1$ .

**Gabarito: "c".**

---


**4. (EEAR/2007)**

Considere o gráfico da função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e as afirmativas a seguir:

- I.  $D(f) = \mathbb{R}$
- II.  $Im(f) = \mathbb{R}$
- III.  $f(-1) = f(1)$



IV.  $f$  é crescente no intervalo  $[1, 3]$ .



Das 4 afirmativas,

- a) Todas são verdadeiras
- b) Apenas uma é falsa
- c) Duas são falsas.
- d) Apenas uma é verdadeira.

### Comentários

Analisando as afirmativas:


- I. Verdadeiro. O domínio está definido em " $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ", sendo o primeiro  $\mathbb{R}$  da expressão.
- II. Falso. Veja que não existe  $f(x) \in (5, +\infty)$ . Portanto  $Im(f) \neq \mathbb{R}$ .
- III. Verdadeiro, pelo gráfico, vemos que  $f(-1) = f(1) = 0$
- IV. Verdadeiro, pelo gráfico, em  $[1,3]$  temos uma reta de coeficiente angular positivo. Graficamente, a função cresce com o aumento de  $x$  e, portanto, é crescente nesse intervalo.

Dessa maneira, há apenas uma alternativa falsa.

**Gabarito: "b".**

5. (EEAR/2008)

Considere os gráficos.



É(são) injetora(s) a(s) função(ões)

- a) I e III, apenas



- b) III, apenas
- c) I, apenas
- d) I, II e III.

**Comentários**

Analisando a injetividade das funções I, II e III:

- I. A função I não é injetora, pois possui valores na imagem  $y = f(x)$  que são os mesmos para vários  $x$  distintos. Exemplo  $y_0 = f(0) = f(a) = f(b)$ ,  $a < 0$  e  $b > 0$ .
- II. Também não é injetora, pois cada imagem  $y$  dessa função é advinda de dois elementos distintos do domínio:  $y = f(x_1) = f(x_2)$ , com  $x_2 \neq x_1$
- III. Essa função é injetora, pois para todo  $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

Assim, apenas III é injetora.

**Gabarito: “b”.**

**6. (EEAR/2008)**

Para que  $f(x) = (2m - 6)x + 4$  seja crescente em  $\mathbb{R}$ , o valor real de  $m$  deve ser tal que

- a)  $m > 3$
- b)  $m < 2$
- c)  $m < 1$
- d)  $m = 0$

**Comentários**


Veja que  $f(x)$  é de primeiro grau, isto é, do tipo  $f(x) = ax + b$ . Para que uma função de primeiro grau seja crescente, basta que seu coeficiente angular  $a$  seja positivo. Portanto, basta que:

$$2m - 6 > 0 \Rightarrow 2m > 6 \Rightarrow m > 3$$

**Gabarito: “a”.**

**7. (EEAR/2009)**

Sejam os gráficos de  $f(x) = ax + b$  e  $g(x) = cx + d$ .



Podemos afirmar que



- a)  $a > 0$  e  $b < 0$
- b)  $a < 0$  e  $d > 0$
- c)  $b > 0$  e  $d > 0$
- d)  $c > 0$  e  $d < 0$

**Comentários**

Analisando à primeira vista, vemos que  $f$  e  $g$  são crescentes, isto é, possuem coeficientes angulares  $a$  e  $c$ , respectivamente, positivos. Portanto:

$$\boxed{a > 0}$$

$$\boxed{c > 0}$$

Agora, vamos analisar seus coeficientes lineares, isto é,  $b$  e  $d$ . Para  $f$ , analisando o gráfico, quando  $x = 0$ ,  $f(0) > 0$ . Portanto:

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = a \cdot 0 + b > 0 \Rightarrow \boxed{b > 0}$$

Já para  $g$ , analisando o gráfico, quando  $x = 0$ ,  $g(0) < 0$ . Portanto:

$$x = 0 \Rightarrow g(0) = c \cdot 0 + d < 0 \Rightarrow \boxed{d < 0}$$

Assim, a única alternativa que contém verdades é a letra d).

**Gabarito: “d”.**

**8. (EEAR/2010)**

A função  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , definida por  $f(x) = 3x + 2$ ,

- a) É apenas injetora.
- b) É apenas sobrejetora.
- c) É injetora e sobrejetora.
- d) Não é injetora e nem sobrejetora.

**Comentários**

Vamos fazer uma tabela de alguns elementos do domínio e suas respectivas imagens:

$x$	1	2	3	4	5	6	7	8	...
$f(x)$	5	8	11	14	17	20	23	26	...

Assim, perceba que o conjunto imagem não será o conjunto dos naturais (que é o contradomínio). Portanto, como o conjunto Imagem não é igual ao contra domínio, a função não é sobrejetora.

Por outro lado, se:

$$f(a) = f(b) \Rightarrow 3a + 2 = 3b + 2 \Rightarrow 3a = 3b \Rightarrow a = b$$

$$\boxed{f(a) = f(b) \Rightarrow a = b}$$




Essa expressão emoldurada acima caracteriza uma função injetora. Dessa maneira, a função é apenas injetora.

**Gabarito: "a".**


**9. (EEAR/2010)**

Considerando  $D = [0, 10]$  o domínio de uma função  $y = f(x)$ , um gráfico que poderia representá-la é


a)




b)



c)



d)



**Comentários**

Se o domínio da função é  $D = [0, 10]$ , então a região em  $x$  onde o gráfico dela está deve ser entre  $0 \leq x \leq 10$ . Veja que as alternativas c) e d) portanto já não podem ser marcadas; c) está errada pois tem gráfico acima de  $x$  negativo; d) está errada pois não inclui  $x = 10$  (bola aberta).



Assim só temos as alternativas a) e b) possíveis. Entretanto, veja que a) não é gráfico de uma função, pois não existe função tal que um único  $x$  gere duas imagens distintas (tome  $x \approx 5$  e veja que está relacionado com 3 valores distintos de  $y$ ). Portanto, apenas b) pode ser gráfico de função.

**Gabarito: “b”.**

---

**10. (EEAR/2011)**

A função  $g: [-5, 5] \rightarrow B$  tem como imagem o conjunto  $I = [20, 30]$ . Para que ela seja sobrejetora é necessário que  $B$  seja igual ao intervalo

- a)  $[5, 20]$ .
- b)  $[-5, 20]$ .
- c)  $[-5, 30]$ .
- d)  $[20, 30]$

**Comentários**

A definição de função sobrejetora, é a função que tem o conjunto contradomínio igual ao conjunto Imagem. Portanto,  $g$  será sobrejetora quando seu contradomínio for  $[20,30]$ . Entretanto, na notação:

$$g: [-5, 5] \rightarrow B$$

$[-5, 5]$  se refere ao domínio de  $g$ , enquanto  $B$  é o contradomínio de  $g$ . Portanto,  $g$  será sobrejetora quando seu contradomínio  $B$  for igual ao seu conjunto imagem  $I = [20, 30]$ :

$$B = [20, 30]$$

**Gabarito: “d”.**

---

**11. (EEAR/2011)**

A função definida por  $y = m(x - 1) + 3 - x$ ,  $m \in \mathbb{R}$ , será crescente, se

- a)  $m \geq 0$
- b)  $m > 1$
- c)  $-1 < m < 1$
- d)  $-1 < m \leq 0$

**Comentários**

Rearrmando a expressão de  $f$  para o formato  $f(x) = ax + b$

$$f(x) = m(x - 1) + 3 - x = mx - m + 3 - x = x(m - 1) + 3 - m$$

Sabemos que para que uma função do primeiro grau  $f(x) = ax + b$  seja crescente, apenas basta que seu coeficiente angular  $a$  deve ser positivo. No nosso caso,  $a = m - 1$ . Portanto:

$$m - 1 > 0 \Rightarrow m > 1$$

**Gabarito: “b”.**

---

**12. (EEAR/2013)**



Para que uma função seja invertível, é necessário que ela seja:

- a) Sobrejetora e positiva
- b) Bijetora e positiva
- c) Apenas bijetora
- d) Apenas injetora


**Comentários**

Para que uma função seja invertível, sua função inversa tem que existir, obviamente. A função inversa só existe se a função  $f$  for injetora e sobrejetora, isto é, bijetora.

**Gabarito: “c”.**

**13. (EEAR/2013)**

Analisando o gráfico da função  $f$  da figura, percebe-se que, nos intervalos  $[-5, -2]$  e  $[-1, 2]$  de seu domínio, ela é, respectivamente,



- a) Crescente e crescente
- b) Crescente e decrescente
- c) Decrescente e crescente
- d) Decrescente e decrescente

**Comentários**

É pedido que analisemos o gráfico da função no intervalo de  $x$   $[-5, -2]$  e  $[-1, 2]$ :

No intervalo  $[-5, -2]$ , isto é,  $-5 \leq x \leq -2$ , vemos que a função é uma reta crescente ( $y$  cresce com o aumento de  $x$ ). Portanto, ela é crescente no intervalo  $[-5, -2]$ .

Já no intervalo de  $[-1, 2]$ , isto é,  $-1 \leq x \leq 2$ , vemos que a função é uma reta decrescente ( $y$  diminui com o aumento de  $x$ ). Portanto ela é decrescente no intervalo  $[-1, 2]$ .

**Gabarito: “b”.**

**14. (EEAR/2015)**

Sejam  $f$  e  $g$  funções polinomiais de primeiro grau, tais que o gráfico de  $f$  passa por  $(2, 0)$  e o de  $g$ , por  $(-2, 0)$ . Se a interseção dos gráficos é o ponto  $(0, 3)$ , é correto afirmar que

- a)  $f$  e  $g$  são crescentes



- b)  $f$  e  $g$  são decrescentes.
- c)  $f$  é crescente e  $g$  é decrescente
- d)  $f$  é decrescente e  $g$  é crescente

### Comentários

Se  $f$  e  $g$  são retas, para analisar se são crescentes, basta calcularmos seus coeficientes angulares. Assim, fazendo isso para  $f(x) = ax + b$ , sabendo que ele passa pelos pontos  $(2,0)$  e  $(0,3)$ :

$$\Rightarrow f(2) = 0 \Rightarrow 0 = a \cdot 2 + b \Rightarrow b = -2a$$

$$f(0) = 3 \Rightarrow 3 = a \cdot 0 + b \Rightarrow b = 3 \Rightarrow -2a = 3 \Rightarrow a = -\frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow f(x) = -\frac{3x}{2} + 3$$

Assim, vemos que o coeficiente angular de  $f$  é  $a = -\frac{3}{2} < 0$ . Portanto,  $f$  é decrescente.

Agora, calculando a equação de  $g(x) = cx + d$ , sabendo que ele passa pelos pontos  $(-2,0)$  e  $(0,3)$ :

$$f(-2) = 0 \Rightarrow 0 = -2c + d \Rightarrow d = 2c$$

$$f(0) = 3 \Rightarrow 3 = c \cdot 0 + d \Rightarrow d = 3 \Rightarrow 2c = 3 \Rightarrow c = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow g(x) = \frac{3x}{2} + 3$$

Assim, o coeficiente angular de  $g$  é  $c = \frac{3}{2} > 0$ . Portanto,  $g$  é crescente.

**Gabarito: "d".**

### 15. (ESA/2017)

Com relação às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras podemos afirmar que:

- a) Se é injetora e não é sobrejetora então ela é bijetora.
- b) Se é sobrejetora então ela é injetora.
- c) Se é injetora e sobrejetora então ela é bijetora.
- d) Se é injetora então ela é sobrejetora.
- e) Se é sobrejetora e não é injetora então ela é bijetora.

### Comentários

- O conceito de função injetora é independente do conceito de ser sobrejetora. Então ser injetora não implica em ser sobrejetora, e vice-versa.
- Uma função  $f: D \rightarrow C_d$  é sobrejetora quando o seu contradomínio  $C_d$  é igual ao seu conjunto Imagem  $Im(f) = \{y \mid y = f(x)\}$ .
- Uma função é injetora quando a cada elemento distinto  $y_0$  do conjunto imagem  $\{y \mid y = f(x)\}$  só existe um único  $x_0$  no domínio de  $f$  tal que  $f(x_0) = y_0$ .
- Uma função é bijetora quando é injetora e também é sobrejetora.



Sendo assim, podemos marcar a alternativa

**Gabarito: “c”.**

---

**16. (ESA/2016)**

Sejam as funções reais dadas por  $f(x) = 5x + 1$  e  $g(x) = 3x - 2$ . Se  $m = f(n)$ , então  $g(m)$  vale:

- a)  $15n + 1$
- b)  $14n - 1$
- c)  $3n - 2$
- d)  $15n - 15$
- e)  $14n - 2$

**Comentários**

Sabemos que  $m = f(n)$ . Queremos  $g(m)$ , então:

$$m = f(n) \Rightarrow g(m) = g(f(n))$$

Mas  $f(x) = 5x + 1$ :

$$\Rightarrow f(n) = 5n + 1$$

Assim, como  $g(x) = 3x - 2$ , então:

$$\begin{aligned} g(f(n)) &= 3f(n) - 2 = 3 \cdot (5n + 1) - 2 = 15n + 3 - 2 = 15n + 1 \\ \Rightarrow g(m) &= g(f(n)) = 15n + 1 \end{aligned}$$

**Gabarito: “a”.**

---

**17. (EEAR/2005)**

Seja a função  $f$  de  $\mathbb{R} - \{3\}$  em  $\mathbb{R} - \{1\}$ , definida por  $f(x) = \frac{x+3}{x-3}$ . Pela inversa de  $f$ , o número 5 é imagem do número

- a)  $\frac{1}{4}$
- b)  $\frac{1}{3}$
- c) 4
- d) 3

**Comentários**

Queremos calcular o número que gera imagem 5 quando aplicado na função inversa. Isto é, queremos  $y$  tal que:

$$f^{-1}(y) = 5$$

Mas lembra que a função  $f^{-1}$ , por definição, leva a imagem de  $f$  (nesse caso,  $y$ ) no  $x$  que o gerou. Portanto:

$$y = f(5) \Rightarrow y = \frac{5+3}{5-2} = \frac{8}{2} = 4$$

**Gabarito: “c”.**

---



**18. (EEAR/2007)**

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  a função definida por  $f(x) = \frac{1+x}{3}$  e  $g$  a função inversa de  $f$ . Então,  $g(2)$  é:

- a) -4
- b) -1
- c) 3
- d) 5

**Comentários**

Para encontrarmos a função inversa, substituímos na expressão de  $f(x)$ :

$$\begin{aligned} f(x) &\leftarrow x; x \leftarrow y = g(x): \\ \Rightarrow x &= \frac{1+y}{3} \Rightarrow 3x - 1 = y \Rightarrow g(x) = 3x - 1 \\ &\Rightarrow g(2) = 6 - 1 = 5 \end{aligned}$$

**Gabarito: “d”.**

---

**19. (EEAR/2010)**

Sejam  $f$  e  $g$  duas funções inversas entre si. Se  $f(x) = 3x - 2$ , então  $g(1)$  é igual a:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

**Comentários**

Achando a função inversa  $g(x)$ , trocando na expressão de  $f(x)$ :

$$\begin{aligned} f(x) &\leftarrow x; x \leftarrow y = g(x) \\ \Rightarrow x &= 3y - 2 \Rightarrow 3y = x + 2 \Rightarrow y = \boxed{g(x) = \frac{x+2}{3}} \end{aligned}$$

Portanto,  $g(1)$ :

$$g(1) = \frac{1+2}{3} = 1$$

**Gabarito: “b”.**

---

**20. (EEAR/2014)**

Seja a função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = 4x - 3$ . Se  $f^{-1}$  é a função inversa de  $f$ , então  $f^{-1}(5)$  é

- a) 17
- b)  $\frac{1}{17}$
- c) 2
- d)  $\frac{1}{2}$



### Comentários

Resolvendo de um outro modo:

$$f^{-1}(5) = x_0$$

Se aplicarmos a função em ambos os lados:

$$f(f^{-1}(5)) = f(x_0) \Rightarrow 5 = f(x_0) = 4x_0 - 3$$

$$\Rightarrow 5 = 4x_0 - 3 \Rightarrow 4x_0 = 8 \Rightarrow x_0 = \frac{8}{4} = 2$$

$$\Rightarrow x_0 = f^{-1}(5) = 2$$

### Gabarito: “c”.

#### 21. (EEAR/2015)

Seja  $f(x) = 4x + 3$  uma função inversível. A fórmula que define a função inversa  $f^{-1}(x)$  é:

a)  $\frac{x-4}{3}$

b)  $\frac{x-3}{4}$

c)  $\frac{2x+3}{4}$

d)  $\frac{2x+4}{3}$

### Comentários

Vamos resolver de um jeito não muito usual, semelhante ao modo como resolvemos o passado:

$$f^{-1}(x) = y$$

Aplicando a função em ambos os lados da equação:

$$f(f^{-1}(x)) = f(y)$$

Por definição,  $f(f^{-1}(x)) = x$ . Daí:

$$x = f(y) = 4y + 3$$

$$\Rightarrow x - 3 = 4y \Rightarrow y = \boxed{f^{-1}(x) = \frac{x - 3}{4}}$$

### Gabarito: “b”.

#### 22. (EEAR/2002)

O gráfico de uma função  $f$  é o segmento de reta que une os pontos  $(-3, 4)$  e  $(3, 0)$ . Se  $f^{-1}$  é a função inversa de  $f$ , então  $f^{-1}(2)$  é

a) 2

b) 0

c)  $-\frac{3}{2}$



d)  $\frac{3}{2}$

**Comentários**

Achando primeiramente a equação de  $f(x) = ax + b$ , já que é uma reta.  $f(x)$  passa pelos pontos  $(-3, 4)$  e  $(3, 0)$ . Assim esses pontos satisfazem sua equação:

$$\begin{cases} 4 = -3a + b \\ 0 = 3a + b \end{cases} \Rightarrow 2b = 4 \Rightarrow b = 2 \Rightarrow a = -\frac{2}{3}$$

Portanto,  $f(x) = -\frac{2x}{3} + 2$ . Para calcular a função inversa, substituímos na expressão de  $f$ , as variáveis mudadas:

$$\begin{aligned} f(x) &\leftarrow x; \quad x \leftarrow y = f^{-1}(x) \\ \Rightarrow x &= -\frac{2y}{3} + 2 \Rightarrow 2y = 6 - 3x \Rightarrow y = f^{-1}(x) = \frac{6 - 3x}{2} \\ \Rightarrow f^{-1}(2) &= \frac{6 - 6}{2} = 0 \end{aligned}$$

**Gabarito: “b”.**

**23. (EEAR/2017)**

Sabe-se que a função  $f(x) = \frac{x+3}{5}$  é invertível. Assim,  $f^{-1}(3)$  é

- a) 3
- b) 4
- c) 6
- d) 12

**Comentários**

Fazendo a modificação das variáveis na expressão de  $f(x)$  para achar a função inversa:

$$\begin{aligned} f(x) &\leftarrow x; \quad x \leftarrow y = f^{-1}(x) \\ x &= \frac{y + 3}{5} \Rightarrow 5x = y + 3 \Rightarrow y = f^{-1}(x) = 5x - 3 \\ \Rightarrow f^{-1}(3) &= 5 \cdot 3 - 3 = 12 \end{aligned}$$

**Gabarito: “d”.**

**24. (EEAR/2018)**

Se  $f(x) = \frac{1+3x}{x+3}$ , com  $x \in \mathbb{R}$  e  $x \neq -3$ , é uma função invertível, o valor de  $f^{-1}(2)$  é

- a) -2
- b) -1
- c) 3
- d) 5

**Comentários**



Calculando a função inversa, fazendo a substituição das variáveis na expressão de  $f(x)$ , onde o  $x$  (elemento do conjunto imagem de  $f^{-1}$ ) passará a ser  $y = f^{-1}(x)$  e onde  $f(x)$  (elemento do domínio de  $f^{-1}$ ) passará a ser o  $x$ :

$$f(x) \leftarrow x; \quad x \leftarrow y = f^{-1}(x):$$


$$x = \frac{1 + 3y}{y + 3} \Rightarrow xy + 3x = 1 + 3y \Rightarrow y(x - 3) = 1 - 3x \Rightarrow y = \boxed{f^{-1}(x) = \frac{1 - 3x}{x - 3}}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(2) = \frac{1 - 6}{2 - 3} = \frac{-5}{-1} = 5$$

**Gabarito: "d".**

**25. (EEAR/2003)**

Seja a função inversível  $f$  de gráfico abaixo.



A lei que define  $f^{-1}$  é

- a)  $y = 3x + \frac{3}{2}$
- b)  $y = 2x - \frac{3}{2}$
- c)  $y = \frac{2x}{3} + 2$
- d)  $y = \frac{3x}{2} - 3$

**Comentários**

Podemos achar a expressão de  $f(x) = ax + b$ , pois pelo gráfico dessa reta, ela passa pelos pontos  $(0,2)$  e  $(3,4)$  e, portanto, essas coordenadas satisfazem sua equação:

$$\begin{cases} 2 = a \cdot 0 + b \\ 4 = 3a + b \end{cases} \Rightarrow b = 2 \Rightarrow 3a = 2 \Rightarrow a = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{2x}{3} + 2$$

Fazendo a mudança de variáveis para calcular a inversa:

$$f(x) \leftarrow x; \quad x \leftarrow y = f^{-1}(x)$$

$$x = \frac{2y}{3} + 2 \Rightarrow 3x - 6 = 2y \Rightarrow y = \boxed{f^{-1}(x) = \frac{3x - 6}{2}}$$



$$\Rightarrow f^{-1}(x) = y = \frac{3x}{2} - 3$$

**Gabarito: “d”.**

**26. (EEAR/2011)**

Funções bijetoras possuem função inversa porque elas são invertíveis, mas devemos tomar cuidado com o domínio da nova função obtida. Identifique a alternativa que apresenta a função inversa de  $f(x) = x + 3$ .

- a)  $f(x)^{-1} = x - 3$
- b)  $f(x)^{-1} = x + 3$
- c)  $f(x)^{-1} = -x - 3$
- d)  $f(x)^{-1} = -x + 3$
- e)  $f(x)^{-1} = 3x$

**Comentários**

A função inversa  $f(x)^{-1}$  é tal que sua imagem  $y$  é igual ao domínio de  $f(x)$  ( $y = x$ ) e seu domínio  $x$  é igual à imagem de  $f$  ( $x = f(x)$ ). Assim, na expressão de  $f(x)$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= x + 3 \\ \Rightarrow x &= y + 3 \Rightarrow y = x - 3 \\ \Rightarrow y &= f(x)^{-1} = x - 3 \end{aligned}$$

**Gabarito: “a”.**

**27. (EsPCEX/2004)**

Sejam as funções reais  $f(x)$  e  $g(x)$ . Se  $f(x) = x + 2$  e  $f(g(x)) = x/2$ , pode-se afirmar que a função inversa de  $g(x)$  é:

- a)  $g^{-1}(x) = \frac{f(x)}{2}$
- b)  $g^{-1}(x) = \frac{x+4}{2}$
- c)  $g^{-1}(x) = f(x)$
- d)  $g^{-1}(x) = 2f(x)$
- e)  $g^{-1}(x) = \frac{x-4}{2}$

**Comentários**

Vamos achar  $g(x)$  primeiramente, sendo que  $f(x) = x + 2$ :

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= \frac{x}{2} \Rightarrow g(x) + 2 = \frac{x}{2} \Rightarrow g(x) = \frac{x}{2} - 2 = \frac{x - 4}{2} \\ \Rightarrow g(x) &= \frac{x - 4}{2} \end{aligned}$$




Para achar a função inversa  $g^{-1}(x)$ , sabemos que  $g(x)$  são elementos de seu domínio (vai passar a ser  $x$  na expressão de  $f$ ) e que  $x$  são elementos de sua imagem (vai passar a ser  $y = g^{-1}(x)$  na expressão de  $f$ ):

$$\begin{aligned} x &= \frac{y - 4}{2} \Rightarrow y = 2x + 4 = 2(x + 2) \\ \Rightarrow y &= g^{-1}(x) = 2 \cdot (x + 2) = 2f(x) \\ \Rightarrow g^{-1}(x) &= 2f(x) \end{aligned}$$

**Gabarito: "d".**

**28. (EsPCEx/2012)**

Na figura abaixo está representado o gráfico de uma função real do 1º grau  $f(x)$ . A expressão algébrica que define a função inversa de  $f(x)$  é



- a)  $y = \frac{x}{2} + 1$
- b)  $y = x + \frac{1}{2}$
- c)  $y = 2x - 2$
- d)  $y = -2x + 2$
- e)  $y = 2x + 2$

**Comentários**

Calculando primeiramente a função  $f$  pelos dados no gráfico: a reta  $f(x) = ax + b$  passa pelos pontos  $(0,1)$  e  $(-2,0)$ , isto é, essas coordenadas satisfazem à equação da reta  $y = f(x)$ :

$$\begin{cases} 1 = a \cdot 0 + b \\ 0 = -2a + b \end{cases} \Rightarrow b = 1 \Rightarrow -2a + 1 = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{x}{2} + 1$$

Assim, para calcular a função inversa, basta substituímos, na expressão de  $f(x)$ :

$$\begin{aligned} f(x) &\leftarrow x \\ x &\leftarrow y = f^{-1}(x) \\ \Rightarrow x &= \frac{y}{2} + 1 \Rightarrow \frac{y}{2} = x - 1 \Rightarrow y = 2x - 2 \\ \Rightarrow f^{-1}(x) &= \boxed{y = 2x - 2} \end{aligned}$$

**Gabarito: "c".**



**29. (EsPCEEx/2014)**

Considere a função bijetora  $f: [1, +\infty) \rightarrow (-\infty, 3]$ , definida por  $f(x) = -x^2 + 2x + 2$  e seja  $(a, b)$  o ponto de interseção de  $f$  com sua inversa. O valor numérico da expressão  $a + b$  é:

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8
- e) 10

**Comentários**

Se  $(a, b)$  é ponto de interseção de  $f(x) = -x^2 + 2x + 2 = -(x - 1)^2 + 3$ , e de sua inversa  $f^{-1}(x)$ , então esse ponto satisfaz a ambas equações  $y = f(x)$  e  $y = f^{-1}(x)$ . Portanto:

$$\begin{cases} b = f(a) \\ b = f^{-1}(a) \end{cases}$$

Assim, esse sistema nos diz que, para  $x = a$ ,  $f(a) = b$ . Mas como  $f^{-1}$  é a inversa de  $f$ , se analisarmos a segunda equação:

$$b = f^{-1}(a)$$

Se aplicarmos a função em ambos os lados, considerando que  $b \in \text{Dom}(f)$ :

$$f(b) = f(f^{-1}(a)) \Rightarrow f(b) = a$$

Portanto:

$$\begin{cases} b = f(a) \\ f(b) = a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 3 - (a - 1)^2 \\ a = 3 - (b - 1)^2 \end{cases}$$

Subtraindo ambas equações:

$$\begin{aligned} a - b &= (a - 1)^2 - (b - 1)^2 \Rightarrow a - b = (a - b)(a + b - 2) \\ \Rightarrow (a - b)(a + b - 2) - (a - b) &= 0 \Rightarrow (a - b)(a + b - 3) = 0 \end{aligned}$$

Veja que, se  $a + b = 3$ , o resultado acima dá 0. Mas não há alternativa. Assim, se  $a = b$ :

$$\begin{aligned} a &= f(a) = -a^2 + 2a + 2 \Rightarrow -a^2 + a + 2 = 0 \Rightarrow \Delta = 9 \\ \Rightarrow a &= \frac{-1 \pm 3}{-2} = -1 \text{ ou } 2 \end{aligned}$$

Portanto, como  $a = b = -1$  não está no domínio de  $f$ , então apenas podemos escolher  $a = b = 2$ . Assim:

$$a + b = 2 + 2 = 4$$

**Gabarito: "b".**

**30. (ESA/2012)**

Se  $f(2x + 1) = x^2 + 2x$ , então  $f(2)$  vale:

- a)  $\frac{5}{4}$



- b)  $\frac{3}{2}$
- c)  $\frac{1}{2}$
- d)  $\frac{3}{4}$
- e)  $\frac{5}{2}$

**Comentários**

Se chamarmos  $y = 2x + 1$ , então:

$$y = 2x + 1 \Rightarrow 2x = y - 1 \Rightarrow x = \frac{y - 1}{2}$$

Assim:

$$f(2x + 1) = x^2 + 2x = x(x + 2)$$

Substituindo  $y = 2x + 1$  e  $x = \frac{y-1}{2}$ :

$$\Rightarrow f(y) = \left(\frac{y-1}{2}\right) \cdot \left(\frac{y-1}{2} + 2\right) = \left(\frac{y-1}{2}\right) \cdot \left(\frac{y+3}{2}\right) = \frac{y^2 + 2y - 3}{4}$$

$$f(y) = \frac{y^2 + 2y - 3}{4}$$

Assim, para  $f(2)$ , basta tomarmos  $y = 2$ :

$$f(2) = \frac{2^2 + 4 - 3}{4} = \frac{5}{4}$$

**Gabarito: "a".**

---

**31. (ESA/2015)**

Sejam  $f$  a função dada por  $f(x) = 2x + 4$  e  $g$  a função dada por  $g(x) = 3x - 2$ . A função composta deve ser dada por

- a)  $f(g(x)) = 6x$
- b)  $f(g(x)) = 6x + 4$
- c)  $f(g(x)) = 2x - 2$
- d)  $f(g(x)) = 3x + 4$
- e)  $f(g(x)) = 3x + 2$

**Comentários**

Sabemos que  $f(x) = 2x + 4$ . Assim:

$$f(g(x)) = 2 \cdot g(x) + 4 = 2(3x - 2) + 4 = 6x - 4 + 4 = 6x$$

$$\Rightarrow f(g(x)) = 6x$$

**Gabarito: "a".**

---



## 7. QUESTÕES NÍVEL 2

32. (AFA/2021)


Considere as funções  $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$  e  $g: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$  definidas por  $f(x) = 2 + \frac{1}{2x}$  e  $g(x) = x + 2$  e, também, a função real  $h$  definida por  $h(x) = f^{-1}(g(x))$ .

É correto afirmar que

- a) a função  $h$  é par.
- b)  $h(1) = 2$
- c) a função  $h$  NÃO é injetora.
- d)  $h(x) = -2 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{4}$

33. (AFA/2019)

Considere no plano cartesiano abaixo representadas as funções reais  $f: ]m, -m] \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: [m, -m[ - \{v\} \rightarrow \mathbb{R}$ .



Nas afirmativas abaixo, escreva V para verdadeira e F para falsa.

- ( ) O conjunto imagem da função  $g$  é dado por  $Im(g) = ]p, -m]$
- ( ) A função  $h$  definida por  $h(x) = f(x) \cdot g(x)$  assume valores não negativos somente se  $x \in [t, b] \cup [r, 0]$
- ( ) A função  $j$  definida por  $j(x) = g(x) - p$  é maior que zero para todo  $x \in ([m, -m[ - \{v\})$

A sequência correta é

- a) F-F-V
- b) F-V-V



c) V-V-F

d) V-F-F

**34. (AFA/2018)**

Considere a função real  $f(x) = \frac{1}{2x+2}, x \neq -1$ .

Se  $f(-2 + a) + \frac{1}{5} = f(-a)$ , então  $f\left(\frac{a}{2} - 1\right) + f(4 + a)$  é igual a

a) 1


b) 0,75

c) 0,5

d) 0,25

**35. (AFA/2017)**

No gráfico abaixo estão representadas as funções  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .



Sobre estas funções é correto afirmar que

a)  $\frac{g(x)}{f(x)} \leq 0 \forall x \in \mathbb{R}$  tal que  $0 \leq x \leq d$


b)  $f(x) > g(x)$  apenas para  $0 < x < d$

c)  $\frac{f(a)+g(f(a))}{g(c)+f(d)} > 1$

d)  $f(x) \cdot g(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$  tal que  $x \leq b$  ou  $x \geq c$

**36. (AFA/2016)**

Considere as funções reais  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  cujos gráficos estão representados abaixo.




Sobre essas funções, é correto afirmar que

- a)  $\forall x \in [0, 4], g(x) - f(x) > 0$
- b)  $f(g(0)) - g(f(0)) > 0$
- c)  $\frac{g(x) \cdot f(x)}{[f(x)]^2} \leq 0 \forall x \in ]-\infty, 0[ \cup [4, 9]$
- d)  $\forall x \in [0, 3]$  tem-se  $g(x) \in [2, 3]$

**37. (AFA/2016)**

Para fazer uma instalação elétrica em sua residência, Otávio contatou dois eletricitas.

O Sr. Luiz, que cobra uma parte fixa pelo orçamento mais uma parte que depende da quantidade de metros de fio requerida pelo serviço. O valor total do seu serviço está descrito no seguinte gráfico:



Já o Sr. José cobra, apenas, R\$4,50 por metro de fio utilizado e não cobra a parte fixa pelo orçamento.


Com relação às informações acima, é correto afirmar que

- a) o valor da parte fixa cobrada pelo Sr. Luiz é maior do que R\$60,00.
- b) o Sr. Luiz cobra mais de R\$2,50 por metro de fio instalado.
- c) sempre será mais vantajoso contratar o serviço do Sr. José.
- d) se forem gastos 20m de fio não haverá diferença de valor total cobrado entre os eletricitas.



38. (AFA/2015)

Considere o gráfico da função real  $g: A \rightarrow A$  abaixo e marque (V) verdadeiro ou (F) falso.



- ( ) A função  $g$  possui exatamente duas raízes.
- ( )  $g(4) = -g(-3)$
- ( )  $Im(g) = \{-3\} \cup ]-2, 4[$
- ( ) A função definida por  $h(x) = g(x) + 3$  não possui raiz.
- ( )  $(g \circ g \circ g \circ \dots \circ g)(-2) = 2$


A sequência correta é

- a) F-V-F-F-V
- b) F-F-V-F-V
- c) F-V-F-V-F
- d) V-V-F-F-V

39. (AFA/2014)

Considere os gráficos abaixo das funções reais  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: B \rightarrow \mathbb{R}$

Sabe-se que  $A = [-a, a]$ ;  $B = ]-\infty, t]$ ;  $g(-a) < f(-a)$ ;  $g(0) > f(0)$ ;  $g(a) < f(a)$  e  $g(x) = n$  para todo  $x \leq -a$ .



Analise as afirmativas abaixo e marque a FALSA.



a) A função  $f$  é par.


b) Se  $x \in ]d, m[$ , então  $f(x) \cdot g(x) < 0$

c)  $Im(g) = [n, r[ \cup \{s\}$

d) A função  $h: E \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $h(x) = \frac{-2}{\sqrt{f(x)-g(x)}}$  está definida se  $E = \{x \in \mathbb{R} \mid -a \leq x < -d \text{ ou } d < x \leq a\}$

**40. (AFA/2013)**

O gráfico abaixo descreve uma função  $f: A \rightarrow B$



Analise as proposições que seguem.

I.  $A = \mathbb{R}^*$

II.  $f$  é sobrejetora se  $B = \mathbb{R} - [-e, e]$

III. Para infinitos valores de  $x \in A$ , tem-se  $f(x) = -b$

IV.  $f(-c) - f(c) + f(-b) + f(b) = 2b$

V.  $f$  é função par.

VI.  $\nexists x \in \mathbb{R} \mid f(x) = -d$

São verdadeiras apenas as proposições

a) I, III e IV

b) I, II e IV

c) III, IV e V

d) I, II e IV

**41. (AFA/2013)**

Dois corredores partem de um ponto ao mesmo tempo e se deslocam da seguinte forma: o primeiro é tal, que sua velocidade  $y_1$  é dada em função da distância  $x$  por ele percorrida através de



$$y_1 = \begin{cases} 4, & \text{se } x \leq 200 \\ \frac{n}{200}x - \frac{n^2 + n - 8}{2}, & \text{se } 200n < x \leq 200(n + 1) \end{cases}$$

em que  $n$  varia no conjunto dos números naturais não nulos.

O segundo é tal que sua velocidade  $y_2$  é dada em função da distância  $x$  por ele percorrida através de  $y_2 = \frac{x}{100} + 4$ .

Tais velocidades são marcadas em km/h, e as distâncias, em metro.

Assim sendo, ambos estarão à mesma velocidade após terem percorrido

- a) 800m
- b) 900m
- c) 1000m
- d) 1100m

42. (AFA/2012)

Considere as proposições abaixo e as classifique em (V) verdadeira ou (F) falsa.

( ) Nas funções reais  $g: C \rightarrow A$  e  $f: A \rightarrow B$ , se existe a função composta  $(f \circ g): P \rightarrow S$ , então  $P = C$  e  $S = B$ .

( ) Se  $h: \{m, n, p\} \rightarrow \{m, n, p\}$  é uma função tal que  $h(m) = p$ ,  $h(n) = m$  e  $h(p) \neq n$ , então  $h$  é uma função injetora.

( ) Se  $f: \{0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1, 2\}$  é uma função tal que,  $f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x \neq 1 \text{ e } x \neq 2 \\ x, & \text{se } x = 2 \\ x - 1, & \text{se } x = 1 \end{cases}$  então


$(f \circ f \circ f)^{-1}(x) = 1$  se, e somente se,  $x = 0$ .

A sequência correta é

- a) F-F-V
- b) V-V-F
- c) F-V-F
- d) V-F-V

43. (AFA/2011)

Luiza possui uma pequena confecção artesanal de bolsas. No gráfico abaixo, a reta  $c$  representa o custo total mensal com a confecção de  $x$  bolsas e a reta  $f$  representa o faturamento mensal da Luiza com a confecção de  $x$  bolsas.



Com base nos dados acima, é correto afirmar que Luiza obtém lucro se, e somente se, vender

- a) no mínimo 2 bolsas.
- b) pelo menos 1 bolsa.
- c) exatamente 3 bolsas.
- d) no mínimo 4 bolsas.


44. (AFA/2011)

Considere o conjunto  $A = \{0, 1, 2, 3\}$  e a função  $f: A \rightarrow A$  tal que  $f(3) = 1$  e  $f(x) = x + 1$ , se  $x \neq 3$ . A soma dos valores de  $x$  para os quais  $(f \circ f \circ f)(x) = 3$  é

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

45. (AFA/2011)

Considere o gráfico da função real  $p: A \rightarrow B$




Analise as alternativas abaixo e, a seguir, marque a FALSA.

- a)  $p(x) \leq 0 \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \text{ ou } c \leq x \leq r\}$
- b)  $p\left(p\left(p\left(p\left(p(r)\right)\right)\right)\right) = p\left(p\left(p\left(p(r)\right)\right)\right)$
- c) Existe um único  $x \in A$  tal que  $p(x) = c$
- d)  $Im(p) = \{-r\} \cup ]-c, c]$

**46. (AFA/2010)**

Analise o gráfico abaixo da função real  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$




Se  $h$  é uma função real tal que  $h(x) = g(x) + 2$ , então marque a alternativa verdadeira.

- a)  $(h \circ h \circ h \circ \dots \circ h)(0) = 4$
- b)  $(h \circ h \circ h)(3) > (h \circ h \circ h \circ h)(2)$
- c) Se  $y = h\left(h\left(h\left(\frac{1}{2}\right)\right)\right)$  então  $y \in ]2, 3[$
- d) Se  $x = h\left(h\left(h\left(\frac{3}{2}\right)\right)\right)$  então  $x \in ]1, 2[$

**47. (AFA/2010)**



Na figura abaixo, tem-se representado as funções  $f, g$  e  $h$  que indicam os valores pagos, respectivamente, às locadoras de automóveis  $\alpha, \beta$  e  $\gamma$  para  $x$  quilômetros rodados por dia. Uma pessoa pretende alugar um carro e analisa as três opções.



Após a análise, essa pessoa conclui que optar pela locadora  $\alpha$  ao invés das outras duas locadoras, é mais vantajoso quando  $x \in ]m, +\infty[$ ,  $m \in \mathbb{R}$ . O menor valor possível para  $m$  é

- a) 60
- b) 70
- c) 80
- d) 90

48. (EN/2021)

Sejam  $f$  e  $g$  funções reais definidas por  $f(x) = \begin{cases} 4x^2 - 6x - 1, & x \geq 1 \\ 4x + 1, & x < 1 \end{cases}$  e  $g(x) = 2x - 3$ .

Assinale a opção que apresenta a lei de formação da função  $f$ .

- a)  $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x - 1, & x \geq 1 \\ 2x + 3, & x < 1 \end{cases}$
- b)  $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x - 1, & x \geq -1 \\ x + 7, & x < -1 \end{cases}$
- c)  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x - 1, & x \geq -1 \\ 2x + 9, & x < -1 \end{cases}$
- d)  $f(x) = \begin{cases} 4x^2 + x - 1, & x \geq 1 \\ x + 3, & x < 1 \end{cases}$
- e)  $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - x - 1, & x \geq 1 \\ x + 1, & x < 1 \end{cases}$

49. (EFOMM/2021)

Coloque V nas proposições verdadeiras e F nas falsas.

- ( ) Dados os conjuntos  $A = \{0, 7, 1\}$  e  $B = \{x, y, 1\}$ , se  $A = B$  podemos afirmar que  $x = 0$  e  $y = 7$ .
- ( ) Um conjunto  $A$  tem  $\alpha$  elementos e  $\beta$  subconjuntos; e um conjunto  $B$  tem três elementos a mais que o conjunto  $A$ , então o número de subconjuntos de  $B$  é  $3\beta$ .



( ) Sejam os conjuntos  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  e  $C = \{1, 2\}$ . O conjunto  $B$  tal que  $B \cap C = \{1\}$  e  $B \cup C = A$ , então  $B = \{2, 3, 4\}$ .

( ) Dados  $A = \{2, 3, 4\}$ , e  $B = \{3, 4, 5, 6\}$  e a Relação Binária  $R$  de  $A$  em  $B$  tal que  $R = \{(x, y) \in A \times B \mid x \text{ divide } y\}$ , então a relação inversa de  $R$  é uma função sobrejetora.

Lendo-se a coluna de parênteses de cima para baixo, encontra-se

a) V-F-V-F

b) V-F-F-V

c) F-F-V-F

d) V-F-F-F

e) F-F-F-F

**50. (EFOMM/2019)**

Dada a função  $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y} - \frac{x-y}{x+y}$ , o valor de  $f(a + b, a - b)$  é:

a)  $\frac{a^2 - b^2}{ab}$

b)  $\frac{a^2 - b^2}{2ab}$

c) 1

d)  $\frac{a^2 + b^2}{ab}$

e)  $\frac{a^2 + b^2}{2ab}$

**51. (EFOMM/2019)**

Seja  $f(k) = k^2 + 3k + 2$  e seja  $W$  o conjunto de inteiros  $\{0, 1, 2, \dots, 25\}$ . O número de elementos de  $W$ , tais que  $f(W)$  deixa resto zero, quando dividido por 6, é:

a) 25

b) 22

c) 21

d) 18

e) 17

**52. (EFOMM/2015)**



Sejam as funções  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Sabendo que  $f$  é bijetora e  $g$  é sobrejetora, considere as sentenças a seguir:

I-  $g \circ f$  é injetora;

II-  $f \circ g$  é bijetora;

III-  $g \circ f$  é sobrejetora.

Assinalando com verdadeiro (V) ou falso (F) a cada sentença, obtém-se

a) V-V-V

b) V-V-F

c) F-V-F

d) F-F-V

e) V-F-V

**53. (EFOMM/2010)**

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função estritamente decrescente, quaisquer  $x_1$  e  $x_2$  reais, com  $x_1 < x_2$  tem-se  $f(x_1) > f(x_2)$ . Nessas condições, analise as afirmativas abaixo.

I-  $f$  é injetora.

II-  $f$  pode ser uma função par.

III- Se  $f$  possui inversa, então sua inversa é estritamente decrescente.

Assinale a opção correta.

a) Apenas as afirmativas I é verdadeira.

b) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.


c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

e) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

**54. (EFOMM/2010)**

O gráfico das três funções polinomiais do 1º grau  $a$ ,  $b$  e  $c$  definidas, respectivamente, por  $a(x)$ ,  $b(x)$  e  $c(x)$  estão representadas abaixo.



Nessas condições, o conjunto solução da inequação  $\frac{(a(x))^5 \cdot (b(x))^6}{(c(x))^3} \geq 0$  é

- a)  $(-4; 1) \cup [3; +\infty)$
- b)  $[-4; -1] \cup [3; +\infty)$
- c)  $(-\infty; 4) \cup [-1; +\infty)$
- d)  $[4; +\infty)$
- e)  $\mathbb{R} - \{4\}$

**55. (EFOMM/2006)**

Dados  $A = \{2, 3, 4\}$  e  $B = \{1, 6, 8, 12\}$ , a relação  $R_1 = \{(x, y) \in Ax \times B \mid y = x + 4\}$  de  $A$  em  $B$  é dada por:

- a)  $\{(3, 6), (4, 8)\}$
- b)  $\{(2, 6), (4, 8)\}$
- c)  $\{(6, 2), (8, 4)\}$
- d)  $\{(2, 6), (3, 12), (4, 8)\}$
- e)  $\{(2, 1), (3, 6), (4, 8)\}$

**56. (Escola Naval/2015)**

Sejam  $f$  e  $g$  funções reais definidas por

$$f(x) = \begin{cases} 4x - 3, & \text{se } x \geq 0 \\ x^2 - 3x + 2, & \text{se } x < 0 \end{cases} \text{ e } g(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x > 2 \\ 1 - x^2, & \text{se } x \leq 2 \end{cases}$$

Sendo assim, pode-se dizer que  $(f \circ g)(x)$  é definida por



$$a) (f \circ g)(x) = \begin{cases} 4x + 1, & \text{se } x > 2 \\ 1 - 4x^2, & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ x^4 + x^2, & \text{se } x < -1 \text{ ou } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$b) (f \circ g)(x) = \begin{cases} 4x - 1, & \text{se } x > 2 \\ 1 - 4x^2, & \text{se } -1 \leq x < 1 \\ x^4 - x^2, & \text{se } x < -1 \text{ ou } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$c) (f \circ g)(x) = \begin{cases} 4x + 1, & \text{se } x \geq 2 \\ 1 - 4x^2, & \text{se } -1 < x < 1 \\ x^4 + x^2, & \text{se } x \leq -1 \text{ ou } 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

$$d) (f \circ g)(x) = \begin{cases} 4x + 1, & \text{se } x \geq 2 \\ 1 - 4x^2, & \text{se } -1 < x \leq 1 \\ x^4 + x^2, & \text{se } x < -1 \text{ ou } 1 < x < 2 \end{cases}$$

$$e) (f \circ g)(x) = \begin{cases} 4x + 1, & \text{se } x > 2 \\ -1 - 4x^2, & \text{se } -1 \leq x < 1 \\ x^4 - x^2, & \text{se } x < -1 \text{ ou } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

**57. (Escola Naval/2013)**

Considere  $f$  e  $g$  funções reais de variável real definida por,  $f(x) = \frac{1}{4x-1}$  e  $g(x) = 2x^2$ . Qual é o domínio composto  $(f \circ g)(x)$ ?

a)  $\mathbb{R}$

b)  $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -\frac{1}{2\sqrt{2}}, x \neq \frac{1}{2\sqrt{2}}\right\}$

c)  $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{1}{4}\right\}$

d)  $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{1}{4}, x \neq \frac{1}{2\sqrt{2}}\right\}$

e)  $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -\frac{1}{4}, x \neq -\frac{1}{2\sqrt{2}}\right\}$

**GABARITO**

32. d

33. a

34. d

35. d

36. c

37. d

38. a

39. b

40. a

41. c

42. a



- 43. b
- 44. b
- 45. c
- 46. c
- 47. a
- 48. c
- 49. e
- 50. a
- 51. e
- 52. d
- 53. b
- 54. c
- 55. b
- 56. a
- 57. b

## RESOLUÇÃO

32. (AFA/2021)

Considere as funções  $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$  e  $g: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$  definidas por  $f(x) = 2 + \frac{1}{2x}$  e  $g(x) = x + 2$  e, também, a função real  $h$  definida por  $h(x) = f^{-1}(g(x))$ .

É correto afirmar que

a) a função  $h$  é par.

b)  $h(1) = 2$

c) a função  $h$  NÃO é injetora.

d)  $h(x) = -2 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{4}$

**Comentários**

Vamos calcular a inversa da função  $f$ :

$$f(x) = 2 + \frac{1}{2x}$$

Para  $y = f(x)$ :

$$y = 2 + \frac{1}{2x} \Rightarrow \frac{1}{2x} = y - 2 \Rightarrow x = \frac{1}{2y - 4}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{1}{2x - 4}, \text{ com } f^{-1}: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}^*$$

Para  $f^{-1}(g(x))$ :



$$h(x) = f^{-1}(g(x)) = \frac{1}{2g(x) - 4} = \frac{1}{2(x+2) - 4} = \frac{1}{2x}$$

Assim, vamos analisar as alternativas:

a) Errada.

Temos

$$h(-x) = -\frac{1}{2x} \neq \frac{1}{2x} = h(x)$$

b) Errada.

$$h(1) = \frac{1}{2}$$

c) Errada.

A função  $h$  é injetora, pois  $\forall x_1, x_2 \in D_h$ , temos:

$$h(x_1) = h(x_2) \Rightarrow \frac{1}{2x_1} = \frac{1}{2x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$$


d) Correta.

$$h(x) = -2 \Rightarrow \frac{1}{2x} = -2 \Rightarrow x = -\frac{1}{4}$$

**Gabarito: D**

**33. (AFA/2019)**

Considere no plano cartesiano abaixo representadas as funções reais  $f: ]m, -m] \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: [m, -m[ - \{v\} \rightarrow \mathbb{R}$ .





Nas afirmativas abaixo, escreva V para verdadeira e F para falsa.

( ) O conjunto imagem da função  $g$  é dado por  $Im(g) = ]p, -m]$

( ) A função  $h$  definida por  $h(x) = f(x) \cdot g(x)$  assume valores não negativos somente se  $x \in [t, b] \cup [r, 0]$

( ) A função  $j$  definida por  $j(x) = g(x) - p$  é maior que zero para todo  $x \in ([m, -m[ - \{v\})$

A sequência correta é

a) F-F-V

b) F-V-V

c) V-V-F

d) V-F-F

### Comentários

Vamos analisar cada afirmativa:

**I. O conjunto imagem da função  $g$  é dado por  $Im(g) = ]p, -m]$**


Observando-se o gráfico de  $g$ , vemos que a função não está definida nos pontos  $x = v$  e  $x = -m$  (indicado pela bola aberta). Nesses pontos, temos que  $g$  valeria  $j$  e  $p$ , respectivamente. Logo, devemos remover esses pontos da sua imagem. Portanto:

$$Im(g) = ]p, -m] - \{j\}$$

$\therefore$  Falsa

**II. A função  $h$  definida por  $h(x) = f(x) \cdot g(x)$  assume valores não negativos somente se  $x \in [t, b] \cup [r, 0]$**

Queremos  $h(x) \geq 0$ . Devemos observar o intervalo de  $x$  em que  $f(x)$  e  $g(x)$  possuirão o mesmo sinal ou quando qualquer um deles for nulo.



Observando-se o gráfico, vemos que:

$$x \in [t, b] \cup [r, 0] \rightarrow f(x) \geq 0 \text{ e } g(x) \geq 0$$

$$x \in [-n, v] \rightarrow f(x) \leq 0 \text{ e } g(x) \leq 0$$

Portanto,  $h$  assume valor não negativo quando  $x \in [t, b] \cup [r, 0] \cup [-n, v]$ . Logo, afirmativa falsa.

### III. A função $j$ definida por $j(x) = g(x) - p$ é maior que zero para todo $x \in ([m, -m] - \{v\})$

Perceba que  $j(x) = g(x) + (-p)$  e como podemos observar pelo gráfico, temos que  $-p > 0$ , logo, estamos transladando o gráfico a uma distância  $-p$  verticalmente para cima. Isso fará com que a função  $j$  seja maior que zero para todo domínio de  $g$ , ou seja,  $x \in ([m, -m] - \{v\})$ . Portanto, afirmativa verdadeira.

A sequência correta é  $F - F - V$ .

**Gabarito: "a".**

#### 34. (AFA/2018)

Considere a função real  $f(x) = \frac{1}{2x+2}, x \neq -1$ .

Se  $f(-2 + a) + \frac{1}{5} = f(-a)$ , então  $f\left(\frac{a}{2} - 1\right) + f(4 + a)$  é igual a

- a) 1
- b) 0,75
- c) 0,5
- d) 0,25



**Comentários**

Usando a função real dada no enunciado na equação dada, temos:

$$f(-2 + a) + \frac{1}{5} = f(-a) \Leftrightarrow \frac{1}{2(-2 + a) + 2} + \frac{1}{5} = \frac{1}{2(-a) + 2} \Leftrightarrow \frac{1}{2a - 2} + \frac{1}{5} = \frac{1}{2 - 2a}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2a - 2} - \frac{1}{2 - 2a} = -\frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{1}{2a - 2} + \frac{1}{2a - 2} = -\frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{2}{2a - 2} = -\frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{1}{a - 1} = -\frac{1}{5}$$

$$\Leftrightarrow 5 = -(a - 1) \Leftrightarrow a = -4$$

Assim, o valor pedido é dado por:


$$f\left(\frac{a}{2} - 1\right) + f(4 + a) = f\left(\frac{-4}{2} - 1\right) + f(4 - 4) = f(-3) + f(0) = \frac{1}{2 \cdot (-3) + 2} + \frac{1}{2 \cdot 0 + 2}$$

$$= \frac{1}{-4} + \frac{1}{2} = \frac{-1 + 2}{4} = \frac{1}{4} = 0,25$$

**Gabarito: "d".**

**35. (AFA/2017)**

No gráfico abaixo estão representadas as funções  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .



Sobre estas funções é correto afirmar que

- a)  $\frac{g(x)}{f(x)} \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$  tal que  $0 \leq x \leq d$
- b)  $f(x) > g(x)$  apenas para  $0 < x < d$
- c)  $\frac{f(a) + g(f(a))}{g(c) + f(d)} > 1$
- d)  $f(x) \cdot g(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$  tal que  $x \leq b$  ou  $x \geq c$

**Comentários**

Vamos analisar as alternativas:

a) Falsa.

Para  $0 \leq x \leq d$ , temos que  $f(x)$  será positiva, mas  $g(x)$  é positiva para  $x \in [0, b] \cup [c, d]$ , assim, nesse intervalo, temos:

$$\frac{g(x)}{f(x)} \geq 0$$



b) Falsa.

O erro da alternativa está na palavra “apenas”. Pois, para  $x < a$ , temos também que  $f(x) > g(x)$ .

c) Falsa.

Note que  $f(a) = 0$  e  $g(c) = 0$ , logo:

$$\frac{f(a) + g(f(a))}{g(c) + f(d)} = \frac{g(0)}{f(d)}$$

Pelo gráfico, podemos ver que  $f(d) > g(0)$ , portanto:

$$\frac{g(0)}{f(d)} < 1$$

d) Verdadeira.

Para termos  $f(x) \cdot g(x) \geq 0$ ,  $f(x)$  e  $g(x)$  devem possuir o mesmo sinal, logo:

$$x \leq a \Rightarrow f(x) \leq 0 \text{ e } g(x) \leq 0$$

$$a \leq x \leq b \Rightarrow f(x) \geq 0 \text{ e } g(x) \geq 0$$

$$x \geq c \Rightarrow f(x) \geq 0 \text{ e } g(x) \geq 0$$


Portanto,

$$f(x) \cdot g(x) \geq 0 \Rightarrow x \leq b \text{ ou } x \geq c$$

**Gabarito: “d”.**

**36. (AFA/2016)**

Considere as funções reais  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  cujos gráficos estão representados abaixo.



Sobre essas funções, é correto afirmar que

a)  $\forall x \in [0, 4], g(x) - f(x) > 0$

b)  $f(g(0)) - g(f(0)) > 0$



c)  $\frac{g(x) \cdot f(x)}{[f(x)]^2} \leq 0 \quad \forall x \in ] - \infty, 0[ \cup [4, 9]$

d)  $\forall x \in [0, 3]$  tem-se  $g(x) \in [2, 3]$

**Comentários**

Vamos analisar as alternativas:

a) Incorreta.

No intervalo  $0 \leq x < 3$ , temos que  $g(x) > f(x) \Rightarrow g(x) - f(x) > 0$ , mas no intervalo  $3 \leq x \leq 4$ , temos  $g(x) < f(x) \Rightarrow g(x) - f(x) < 0$ .

b) Incorreta.

Pelo gráfico, vemos que  $g(0) = 2$  e  $f(0) = 0$ , logo:

$$f(g(0)) - g(f(0)) = f(2) - g(0)$$

Perceba que  $f(x) = x$ , pois vemos que  $f(0) = 0$  e  $f(3) = 3$ . Assim, temos:

$$f(2) - g(0) = 2 - 2 = 0$$

c) Correta.

No intervalo  $x \in ] - \infty, 0[ \cup [4, 9]$ , temos  $f(x) \neq 0$  e, assim,  $[f(x)]^2 > 0$ .

Para  $x \in ] - \infty, 0[$ , temos que  $f(x) < 0$  e  $g(x) > 0$ , logo,  $f(x) \cdot g(x) < 0$  e, assim,

$$\frac{f(x) \cdot g(x)}{[f(x)]^2} < 0$$

Para  $x \in [4, 9]$ , temos  $f(x) > 0$  e  $g(x) \leq 0$ , logo,  $f(x) \cdot g(x) \leq 0$  e, assim,

$$\frac{f(x) \cdot g(x)}{[f(x)]^2} \leq 0$$

Portanto, no intervalo dado, temos:

$$\frac{f(x) \cdot g(x)}{[f(x)]^2} \leq 0, \forall x \in ] - \infty, 0[ \cup [4, 9]$$

d) Incorreta.

Observando-se o gráfico, no intervalo  $x \in [0, 3]$ , temos alguns valores de  $x$  que retornam  $g(x) > 3$ , por exemplo,  $g(2) = 4 > 3$ .


**Gabarito: "c".**

**37. (AFA/2016)**

Para fazer uma instalação elétrica em sua residência, Otávio contatou dois eletricitistas.



O Sr. Luiz, que cobra uma parte fixa pelo orçamento mais uma parte que depende da quantidade de metros de fio requerida pelo serviço. O valor total do seu serviço está descrito no seguinte gráfico:



Já o Sr. José cobra, apenas, R\$4,50 por metro de fio utilizado e não cobra a parte fixa pelo orçamento.

Com relação às informações acima, é correto afirmar que

- a) o valor da parte fixa cobrada pelo Sr. Luiz é maior do que R\$60,00.
- b) o Sr. Luiz cobra mais de R\$2,50 por metro de fio instalado.
- c) sempre será mais vantajoso contratar o serviço do Sr. José.
- d) se forem gastos 20m de fio não haverá diferença de valor total cobrado entre os eletricitistas.

#### Comentários

Vamos analisar as alternativas:

a) Incorreta.

A função que representa o valor total do serviço do Sr. Luiz é uma função afim, logo:

$$f(x) = ax + b$$

Em que  $f(x)$  representa o valor total do serviço,  $x$  a quantidade de fio gasta,  $a$  é o preço cobrado por fio e  $b$  é o valor fixo cobrado.

Pelo gráfico, temos:

$$f(15) = 80 \Rightarrow 15a + b = 80 \quad (I)$$

$$f(25) = 100 \Rightarrow 25a + b = 100 \quad (II)$$

Fazendo  $(II) - (I)$ :

$$10a = 20 \Rightarrow a = 2$$

Substituindo em  $(I)$ :

$$15 \cdot 2 + b = 80 \Rightarrow b = 50$$



Assim,  $f(x) = 2x + 50$ . O valor da parte fixa cobrada pelo Sr. Luiz será o valor de  $f$  quando  $x = 0$ , logo:

$$f(0) = 50$$

b) Incorreta.

Pela função  $f(x) = 2x + 50$ , vemos que o Sr. Luiz cobra R\$ 2,00 por metro de fio instalado.

c) Incorreta.

Pelo enunciado, temos que a função que representa o valor cobrado pelo Sr. José é  $g(x) = 4,5x$ , mas veja que:

$$g(x) > f(x) \Rightarrow 4,5x > 2x + 50 \Rightarrow 2,5x > 50 \Rightarrow x > \frac{50}{2,5} = \frac{500}{25} = 20$$

Assim, a partir do ponto  $x = 20$ , temos que o valor total cobrado pelo Sr. José é mais caro do que o valor cobrado pelo Sr. Luiz.

d) Correta.

Igualando-se as duas funções:


$$f(x) = g(x) \Rightarrow 2x + 50 = 4,5x \Rightarrow 50 = 2,5x \Rightarrow x = \frac{50}{2,5} = 20$$

Portanto, se forem gastos 20 metros de fio, o valor total cobrado pelos eletricitistas será o mesmo.

**Gabarito: "d".**

### 38. (AFA/2015)

Considere o gráfico da função real  $g: A \rightarrow A$  abaixo e marque (V) verdadeiro ou (F) falso.



( ) A função  $g$  possui exatamente duas raízes.



( )  $g(4) = -g(-3)$

( )  $Im(g) = \{-3\} \cup ]-2, 4[$

( ) A função definida por  $h(x) = g(x) + 3$  não possui raiz.

( )  $(g \circ g \circ g \circ \dots \circ g)(-2) = 2$

A sequência correta é

a) F-V-F-F-V

b) F-F-V-F-V

c) F-V-F-V-F

d) V-V-F-F-V

### Comentários

O gráfico representa uma função definida por intervalos. Nesse gráfico, temos a presença de duas funções lineares, vamos encontrá-las.

Para  $-4 < x < 4$ , temos  $f(x) = ax + b$ , usando os pontos do gráfico:

$$f(-4) = 0 \Rightarrow -4a + b = 0$$

$$f(0) = 4 \Rightarrow b = 4$$

$$\Rightarrow -4a + 4 = 0 \Rightarrow a = 1$$

$$\therefore g(x) = x + 4; \quad -4 < x < 4$$

Para  $3 < x < 5$ , temos  $h(x) = cx + d$ , usando os pontos do gráfico:

$$h(3) = 0 \Rightarrow 3c + d = 0 \quad (I)$$

$$h(5) = -2 \Rightarrow 5c + d = -2 \quad (II)$$

Fazendo  $(II) - (I)$ :

$$2c = -2 \Rightarrow c = -1$$

Assim, temos:

$$3(-1) + d = 0 \Rightarrow d = 3$$

$$\therefore g(x) = -x + 3; \quad 3 < x < 5$$

De acordo com o gráfico, a função  $g$  é definida por:



$$g(x) = \begin{cases} 0; & x < -4 \text{ ou } x = 0 \text{ ou } x = 6 \\ & -3; & x = -4 \\ x + 4; & -4 < x < 0 \\ & 2; & 0 < x \leq 3 \\ -x + 3; & 3 < x < 5 \\ & 5; & x = 5 \end{cases}$$

Analisando as afirmações:

I) FALSO.

A função  $g$  possui mais de duas raízes, conforme podemos ver no intervalo  $x < -4$ .

II) VERDADEIRO.

Para  $x = 4$ :

$$g(4) = -4 + 3 = -1$$

Para  $x = -3$

$$g(-3) = -3 + 4 = 1 = -g(4)$$

$$\therefore g(4) = -g(-3)$$

III) FALSO.

$$Im(g) = \{-3\} \cup ]-2, 4[ \cup \{5\}.$$

IV) FALSO.

Se  $h(x) = g(x) + 3$ , para  $x = -4$ , temos  $g(-4) = -3$ , logo:

$$h(-4) = g(-4) + 3 = -3 + 3 = 0$$

Portanto,  $h$  possui raiz no ponto  $x = -4$ .

V) VERDADEIRO.

Para  $x = -2$ :

$$g(-2) = -2 + 4 = 2$$

$$(g \circ g)(-2) = g(g(-2)) = g(2) = 2$$

$$(g \circ g \circ g)(-2) = g(g(g(-2))) = g(g(2)) = g(2) = 2$$

Perceba que aplicando-se a composta nessa função, teremos sempre como resultado 2, portanto,

$$(g \circ g \circ g \circ \dots \circ g)(-2) = 2$$


**Gabarito: "a".**



39. (AFA/2014)

Considere os gráficos abaixo das funções reais  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: B \rightarrow \mathbb{R}$

Sabe-se que  $A = [-a, a]$ ;  $B = ]-\infty, t]$ ;  $g(-a) < f(-a)$ ;  $g(0) > f(0)$ ;  $g(a) < f(a)$  e  $g(x) = n$  para todo  $x \leq -a$ .



Analise as afirmativas abaixo e marque a FALSA.

a) A função  $f$  é par.


b) Se  $x \in ]d, m[$ , então  $f(x) \cdot g(x) < 0$

c)  $Im(g) = [n, r[ \cup \{s\}$

d) A função  $h: E \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $h(x) = \frac{-2}{\sqrt{f(x)-g(x)}}$  está definida se  $E = \{x \in \mathbb{R} \mid -a \leq x < -d \text{ ou } d < x \leq a\}$

**Comentários**

Do enunciado, podemos ver que o gráfico colorido é a função  $f$  e  $g$  é o outro gráfico.



Analisando as alternativas:

a) VERDADEIRA.

No domínio de  $f$ , temos  $-a < x < a$  e  $f(-a) = f(a)$ , essa função é simétrica em relação ao eixo  $y$ .



b) FALSA.

Para  $d < x < e < m$ , temos  $f(x) > 0$  e  $g(x) > 0$ , logo,  $f(x) \cdot g(x) > 0$ .

c) VERDADEIRA.

Observando-se o gráfico, vemos que  $Im(g) = [n, r[ \cup \{s\}$ .

d) VERDADEIRA.


A condição para  $h(x)$  estar definida é a sua condição de existência, ou seja,  $f(x) - g(x) > 0$ . Logo, queremos os intervalos em que  $f(x) > g(x)$ , isso ocorre para:

$$-a \leq x < -d \text{ ou } d < x \leq a$$

**Gabarito: "b".**

**40. (AFA/2013)**

O gráfico abaixo descreve uma função  $f: A \rightarrow B$



Analise as proposições que seguem.

- I.  $A = \mathbb{R}^*$
- II.  $f$  é sobrejetora se  $B = \mathbb{R} - [-e, e]$
- III. Para infinitos valores de  $x \in A$ , tem-se  $f(x) = -b$
- IV.  $f(-c) - f(c) + f(-b) + f(b) = 2b$
- V.  $f$  é função par.
- VI.  $\nexists x \in \mathbb{R} \mid f(x) = -d$

São verdadeiras apenas as proposições

a) I, III e IV

b) I, II e IV



c) III, IV e V

d) I, II e IV

**Comentários**

Analisando as proposições:

I.  $A = \mathbb{R}^*$

VERDADEIRA. Veja que o gráfico de  $f$  não está definida no ponto  $x = 0$ , logo, o seu domínio é  $A = \mathbb{R}^*$ .

II.  $f$  é sobrejetora se  $B = \mathbb{R} - [-e, e]$

FALSA. Para que  $f$  seja sobrejetora, devemos ter  $B = Im(f) = [-b, -e] \cup [e, b]$ .

III. Para infinitos valores de  $x \in A$ , tem-se  $f(x) = -b$

VERDADEIRA. Para  $x \leq -b$ , temos  $f(x) = -b$ .

IV.  $f(-c) - f(c) + f(-b) + f(b) = 2b$

VERDADEIRA. Pelo gráfico, temos  $f(-c) = b, f(c) = -b, f(-b) = -b$  e  $f(b) = b$ , assim,

$$f(-c) - f(c) + f(-b) + f(b) = b - (-b) - b + b = 2b$$

V.  $f$  é função par.

FALSA. Temos  $f(-b) \neq f(b)$ , a função não é simétrica em relação ao eixo  $y$ .

VI.  $\nexists x \in \mathbb{R} \mid f(x) = -d$

$\exists x \in ]a, b[$  tal que  $f(x) = -d$ .

Portanto, apenas a I, III e IV são verdadeiras.

**Gabarito: "a".**

**41. (AFA/2013)**

Dois corredores partem de um ponto ao mesmo tempo e se deslocam da seguinte forma: o primeiro é tal, que sua velocidade  $y_1$  é dada em função da distância  $x$  por ele percorrida através de

$$y_1 = \begin{cases} 4, & \text{se } x \leq 200 \\ \frac{n}{200}x - \frac{n^2 + n - 8}{2}, & \text{se } 200n < x \leq 200(n + 1) \end{cases}$$

em que  $n$  varia no conjunto dos números naturais não nulos.

O segundo é tal que sua velocidade  $y_2$  é dada em função da distância  $x$  por ele percorrida através de  $y_2 = \frac{x}{100} + 4$ .

Tais velocidades são marcadas em km/h, e as distâncias, em metro.



Assim sendo, ambos estarão à mesma velocidade após terem percorrido

- a) 800m
- b) 900m
- c) 1000m
- d) 1100m

**Comentários**

Igualando as equações de velocidade dos dois corredores e resolvendo a equação, temos:

$$y_1 = y_2 \Rightarrow \frac{n}{200}x - \frac{n^2 + n - 8}{2} = \frac{x}{100} + 4$$

$$\frac{nx - 100(n^2 + n - 8)}{200} = \frac{2x + 800}{200}$$

$$\Rightarrow nx - 100n^2 - 100n + 800 = 2x + 800$$

$$nx - 2x = 100n^2 + 100n$$

$$\Rightarrow x(n - 2) = 100n(n + 1)$$

$$x = \frac{100n(n + 1)}{n - 2}$$

Com essa equação, devemos verificar os valores de  $n$  que satisfazem a condição da equação de  $y_1$ . Note que devido ao denominador ser  $n - 2$ , temos que  $n > 2$  para  $x > 0$ , logo:

$$n = 3 \Rightarrow x = \frac{100 \cdot 3 \cdot (3 + 1)}{3 - 2} = 100 \cdot 3 \cdot 4 = 1200$$

Verificando a condição  $200n < x \leq 200(n + 1)$ :

$$200 \cdot 3 < 1200 \leq 200(3 + 1) \Rightarrow 600 < 1200 \leq 800 \Rightarrow \textit{Falsa}$$

Assim, não podemos ter  $n = 3$  e devemos verificar outro valor de  $n \in \mathbb{N}$ .

Para  $n = 4$ :

$$x = \frac{100 \cdot 4 \cdot (4 + 1)}{4 - 2} = \frac{100 \cdot 4 \cdot 5}{2} = 1000$$

Da condição:

$$200 \cdot 4 < 1000 \leq 200(4 + 1) \Rightarrow 800 < 1000 \leq 1000 \Rightarrow \textit{Verdadeira}$$

Esse é um valor possível para  $n$ . Assim, como  $x$  representa a distância, temos que ambos estarão à mesma velocidade após terem percorrido 1000m.

**Gabarito: "c".**



42. (AFA/2012)

Considere as proposições abaixo e as classifique em (V) verdadeira ou (F) falsa.

( ) Nas funções reais  $g: C \rightarrow A$  e  $f: A \rightarrow B$ , se existe a função composta  $(f \circ g): P \rightarrow S$ , então  $P = C$  e  $S = B$ .

( ) Se  $h: \{m, n, p\} \rightarrow \{m, n, p\}$  é uma função tal que  $h(m) = p$ ,  $h(n) = m$  e  $h(p) \neq n$ , então  $h$  é uma função injetora.

( ) Se  $f: \{0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1, 2\}$  é uma função tal que,  $f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x \neq 1 \text{ e } x \neq 2 \\ x, & \text{se } x = 2 \\ x - 1, & \text{se } x = 1 \end{cases}$  então

$(f \circ f \circ f)^{-1}(x) = 1$  se, e somente se,  $x = 0$ .

A sequência correta é

a) F-F-V

b) V-V-F

c) F-V-F

d) V-F-V

#### Comentários

Analisando as afirmações:

( F ) Nas funções reais  $g: C \rightarrow A$  e  $f: A \rightarrow B$ , se existe a função composta  $(f \circ g): P \rightarrow S$ , então  $P = C$  e  $S = B$ .

Na função composta  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ , temos que o domínio de  $g$  será o domínio da composta e o contradomínio de  $f$  será o contradomínio da composta, mas isso não implica na igualdade  $P = C$  ou  $S = B$ , podemos ter  $P \subset C$  e  $B \subset S$ .

( F ) Se  $h: \{m, n, p\} \rightarrow \{m, n, p\}$  é uma função tal que  $h(m) = p$ ,  $h(n) = m$  e  $h(p) \neq n$ , então  $h$  é uma função injetora.

Para uma função ser injetora, cada elemento do domínio da função deve se relacionar a um elemento distinto do contradomínio e isso ocorreria somente se  $h(p) = n$ , mas como  $h(p) \neq n$ , temos que  $h$  não é injetora.

( V ) Se  $f: \{0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1, 2\}$  é uma função tal que,  $f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x \neq 1 \text{ e } x \neq 2 \\ x, & \text{se } x = 2 \\ x - 1, & \text{se } x = 1 \end{cases}$  então

$(f \circ f \circ f)^{-1}(x) = 1$  se, e somente se,  $x = 0$ .

Com base na definição de função inversa:

$$f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$$

Assim, temos:

$$(f \circ f \circ f)^{-1}(x) = 1 \Leftrightarrow x = (f \circ f \circ f)(1)$$



$$\Rightarrow f(f(f(1))) = x$$

Da função  $f$ , temos  $f(1) = 1 - 1 = 0$ ,  $f(2) = 2$ ,  $f(0) = 0 + 1 = 1$ , logo:


$$f(f(f(1))) = f(f(0)) = f(1) = 0$$

$$\therefore x = 0$$

**Gabarito: "a".**

**43. (AFA/2011)**

Luiza possui uma pequena confecção artesanal de bolsas. No gráfico abaixo, a reta  $c$  representa o custo total mensal com a confecção de  $x$  bolsas e a reta  $f$  representa o faturamento mensal da Luiza com a confecção de  $x$  bolsas.



Com base nos dados acima, é correto afirmar que Luiza obtém lucro se, e somente se, vender

- a) no mínimo 2 bolsas.
- b) pelo menos 1 bolsa.
- c) exatamente 3 bolsas.
- d) no mínimo 4 bolsas.

**Comentários**

Precisamos encontrar as funções  $f$  e  $g$ . Pelos dados do gráfico, temos:

$$f(x) = ax + b$$

$$f(0) = 0 \Rightarrow a \cdot 0 + b = 0 \Rightarrow b = 0$$

$$f(100) = 2000 \Rightarrow a \cdot 100 = 2000 \Rightarrow a = 20$$

$$\Rightarrow f(x) = 20x$$

$$c(x) = cx + d$$



$$c(0) = 10 \Rightarrow c \cdot 0 + d = 10 \Rightarrow d = 10$$

$$c(100) = 810 \Rightarrow c \cdot 100 + 10 = 810 \Rightarrow 100c = 800 \Rightarrow c = 8$$

$$\Rightarrow c(x) = 8x + 10$$

Luiza obterá lucro a partir do ponto em que o custo igualar o faturamento, logo:

$$f(x) > c(x) \Rightarrow 20x > 8x + 10 \Rightarrow 12x > 10 \therefore x > \frac{10}{12}$$

Portanto, ela deverá vender pelo menos 1 bolsa.

**Gabarito: "b".**

**44. (AFA/2011)**

Considere o conjunto  $A = \{0, 1, 2, 3\}$  e a função  $f: A \rightarrow A$  tal que  $f(3) = 1$  e  $f(x) = x + 1$ , se  $x \neq 3$ . A soma dos valores de  $x$  para os quais  $(f \circ f \circ f)(x) = 3$  é

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

**Comentários**

$$(f \circ f \circ f)(x) = f(f(f(x))) = 3$$

A função  $f$  está definida como

$$f(x) = \begin{cases} x + 1; & x = 0 \text{ ou } x = 1 \text{ ou } x = 2 \\ 1; & x = 3 \end{cases}$$

Se  $x = 2$ , temos  $f(2) = 2 + 1 = 3$ , logo:

$$f(2) = 3 \Rightarrow f(f(f(x))) = 3 \Rightarrow f(f(x)) = 2$$

Para  $x = 1$ , temos  $f(1) = 1 + 1 = 2$ , logo:

$$f(1) = 2 \Rightarrow f(f(x)) = 2 \Rightarrow f(x) = 1$$


Para  $f(x) = 1$ , podemos ter  $f(0) = 0 + 1 = 1$  ou  $f(3) = 1$ , logo, a soma dos valores de  $x$  é

$$0 + 3 = 3$$

**Gabarito: "b".**

**45. (AFA/2011)**

Considere o gráfico da função real  $p: A \rightarrow B$



Analise as alternativas abaixo e, a seguir, marque a FALSA.

a)  $p(x) \leq 0 \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \text{ ou } c \leq x \leq r\}$

b)  $p(p(p(p(p(r)))))) = p(p(p(p(r))))$

c) Existe um único  $x \in A$  tal que  $p(x) = c$

d)  $Im(p) = \{-r\} \cup ]-c, c]$

**Comentários**

a) Verdadeira.

Pelo gráfico podemos ver que para  $x < 0$  ou  $c \leq x \leq r$ , temos  $p(x) \leq 0$ .

b) Verdadeira.

Veja que:

$$p(r) = -r$$

$$\Rightarrow p(p(r)) = p(-r) = -a$$

$$\Rightarrow p(p(p(r))) = p(-a) = -a$$

$$\Rightarrow p(p(p(p(r)))) = p(-a) = -a$$

$$\Rightarrow p(p(p(p(p(r)))))) = p(-a) = -a$$

$$\therefore p(p(p(p(p(p(r)))))) = -a = p(p(p(p(r))))$$

c) Falsa.

Temos dois pontos que satisfazem  $p(x) = c$ ,  $x = 0$  ou  $x = b$ .




d) Verdadeira.

A imagem da função são os pontos definidos em  $y$ , ou seja,  $Im(p) = \{-r\} \cup ]-c, c]$ .

**Gabarito: "c".**

**46. (AFA/2010)**

Analise o gráfico abaixo da função real  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$



Se  $h$  é uma função real tal que  $h(x) = g(x) + 2$ , então marque a alternativa verdadeira.

- a)  $(h \circ h \circ h \circ \dots \circ h)(0) = 4$
- b)  $(h \circ h \circ h)(3) > (h \circ h \circ h \circ h)(2)$
- c) Se  $y = h\left(h\left(h\left(\frac{1}{2}\right)\right)\right)$  então  $y \in ]2, 3[$
- d) Se  $x = h\left(h\left(h\left(\frac{3}{2}\right)\right)\right)$  então  $x \in ]1, 2[$

**Comentários**

Analisando as alternativas:

a) Falsa.

$$h(0) = g(0) + 2 = 2 + 2 = 4$$

$$h(h(0)) = h(4) = g(4) + 2 = -2 + 2 = 0$$

$$h(h(h(0))) = h(0) = 4$$

$$h(h(h(h(0)))) = h(4) = 0$$

Perceba o padrão da composta:

$$\underbrace{(h \circ h \circ h \circ \dots \circ h)}_{n \text{ vezes}}(0) = \begin{cases} 0, n \text{ par} \\ 4, n \text{ ímpar} \end{cases}$$

Como não sabemos a quantidade de funções compostas, temos que ela tanto pode valer 0 quanto valer 4.



b) Falsa.

$$(h \circ h \circ h)(3) = h(h(h(3))) = h(h(g(3) + 2)) = h(h(-1 + 2)) = h(h(1))$$

$$= h(g(1) + 2) = h(1 + 2) = h(3) = g(3) + 2 = -1 + 2 = 1$$

$$(h \circ h \circ h \circ h)(2) = h(h(h(h(2)))) = h(h(h(g(2) + 2))) = h(h(h(0 + 2)))$$

$$= h(h(h(2)))$$

$$= h(h(g(2) + 2)) = h(h(0 + 2)) = h(h(2)) = h(g(2) + 2) = h(2) = g(2) + 2 = 2$$

Portanto,  $(h \circ h \circ h)(3) = 1 < 2 = (h \circ h \circ h \circ h)(2)$ .

c) Verdadeira.

$$h\left(\frac{1}{2}\right) = g\left(\frac{1}{2}\right) + 2$$

Como  $0 < g\left(\frac{1}{2}\right) < 1$ , temos:

$$2 < g\left(\frac{1}{2}\right) + 2 < 3 \Rightarrow 2 < h\left(\frac{1}{2}\right) < 3$$

Veja que:

$$h(2) = g(2) + 2 = 0 + 2 = 2$$

$$h(3) = g(3) + 2 = -1 + 2 = 1$$

$$\Rightarrow 1 < h\left(h\left(\frac{1}{2}\right)\right) < 2$$

$$h(1) = g(1) + 2 = 1 + 2 = 3$$

$$\Rightarrow 2 < h\left(h\left(h\left(\frac{1}{2}\right)\right)\right) < 3$$

$$\therefore 2 < y < 3$$

d) Falsa.

$$h\left(\frac{3}{2}\right) = g\left(\frac{3}{2}\right) + 2$$

$$0 < g\left(\frac{3}{2}\right) < 1 \Rightarrow 2 < g\left(\frac{3}{2}\right) + 2 < 3 \Rightarrow 2 < h\left(\frac{3}{2}\right) < 3$$

Veja que:

$$h(2) = g(2) + 2 = 0 + 2 = 2$$



$$h(3) = g(3) + 2 = -1 + 2 = 1$$

$$\Rightarrow 1 < h\left(h\left(\frac{3}{2}\right)\right) < 2$$

$$h(1) = g(1) + 2 = 1 + 2 = 3$$


$$\Rightarrow 2 < h\left(h\left(h\left(\frac{3}{2}\right)\right)\right) < 3$$

$$\therefore 2 < x < 3$$

Gabarito: "c".

**47. (AFA/2010)**

Na figura abaixo, tem-se representado as funções  $f, g$  e  $h$  que indicam os valores pagos, respectivamente, às locadoras de automóveis  $\alpha, \beta$  e  $\gamma$  para  $x$  quilômetros rodados por dia. Uma pessoa pretende alugar um carro e analisa as três opções.



Após a análise, essa pessoa conclui que optar pela locadora  $\alpha$  ao invés das outras duas locadoras, é mais vantajoso quando  $x \in ]m, +\infty[$ ,  $m \in \mathbb{R}$ . O menor valor possível para  $m$  é

- a) 60
- b) 70
- c) 80
- d) 90

**Comentários**

Pelo gráfico, podemos ver que

Locadora  $\alpha$ :  $f(x) = 50$

Locadora  $\beta$ :  $g(x) = ax + b$

$$g(0) = 20 \Rightarrow a \cdot 0 + b = 20 \Rightarrow b = 20$$

$$g(100) = 70 \Rightarrow a \cdot 100 + 20 = 70 \Rightarrow 100a = 50 \Rightarrow a = 0,5$$

$$\Rightarrow g(x) = 0,5x + 20$$



Locadora  $\gamma$ :  $h(x) = cx + d$

$$h(0) = 30 \Rightarrow c \cdot 0 + d = 30 \Rightarrow d = 30$$

$$h(100) = 70 \Rightarrow c \cdot 100 + 30 = 70 \Rightarrow 100c = 40 \Rightarrow c = 0,4$$

$$\Rightarrow h(x) = 0,4x + 30$$

Será mais vantajoso optar pela locadora  $\alpha$  quando as seguintes condições forem satisfeitas:

$$\begin{cases} f(x) \leq g(x) \\ f(x) \leq h(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 50 \leq 0,5x + 20 \Rightarrow 30 \leq \frac{1}{2}x \Rightarrow 60 \leq x \Rightarrow x \geq 60 \\ 50 \leq 0,4x + 30 \Rightarrow 20 \leq \frac{2}{5}x \Rightarrow 50 \leq x \Rightarrow x \geq 50 \end{cases}$$

Assim, devemos ter  $x \geq 60$ , logo, o menor valor possível para  $m$  é 60.

**Gabarito: "a".**

**48. (EN/2021)**

Sejam  $f$  e  $g$  funções reais definidas por  $f(x) = \begin{cases} 4x^2 - 6x - 1, x \geq 1 \\ 4x + 1, x < 1 \end{cases}$  e  $g(x) = 2x - 3$ .

Assinale a opção que apresenta a lei de formação da função  $f$ .

a)  $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x - 1, x \geq 1 \\ 2x + 3, x < 1 \end{cases}$

b)  $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x - 1, x \geq -1 \\ x + 7, x < -1 \end{cases}$

c)  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x - 1, x \geq -1 \\ 2x + 9, x < -1 \end{cases}$

d)  $f(x) = \begin{cases} 4x^2 + x - 1, x \geq 1 \\ x + 3, x < 1 \end{cases}$

e)  $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - x - 1, x \geq 1 \\ x + 1, x < 1 \end{cases}$

**Comentários**

Fazendo a inversa de  $g(x)$ , temos:

$$y = 2x - 3$$

$$x = \frac{y + 3}{2}$$

Portanto:

$$g^{-1}(x) = \frac{x + 3}{2}$$



$$f(g(g^{-1}(x))) = f(x) = \begin{cases} 4 \cdot (g^{-1}(x))^2 - 6 \cdot g^{-1}(x) - 1, & g^{-1}(x) \geq 1 \\ 4 \cdot g^{-1}(x) + 3, & g^{-1}(x) < 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 4 \cdot \left(\frac{x+3}{2}\right)^2 - 6 \cdot \left(\frac{x+3}{2}\right) - 1, & \frac{x+3}{2} \geq 1 \\ 4 \cdot \left(\frac{x+3}{2}\right) + 3, & \frac{x+3}{2} < 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 6x + 9 - 3x - 9 - 1, & x \geq -1 \\ 2x + 6 + 3, & x < -1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x - 1, & x \geq -1 \\ 2x + 9, & x < -1 \end{cases}$$

**Gabarito: C**

**49. (EFOMM/2021)**

Coloque V nas proposições verdadeiras e F nas falsas.

- ( ) Dados os conjuntos  $A = \{0, 7, 1\}$  e  $B = \{x, y, 1\}$ , se  $A = B$  podemos afirmar que  $x = 0$  e  $y = 7$ .
- ( ) Um conjunto  $A$  tem  $\alpha$  elementos e  $\beta$  subconjuntos; e um conjunto  $B$  tem três elementos a mais que o conjunto  $A$ , então o número de subconjuntos de  $B$  é  $3\beta$ .
- ( ) Sejam os conjuntos  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  e  $C = \{1, 2\}$ . O conjunto  $B$  tal que  $B \cap C = \{1\}$  e  $B \cup C = A$ , então  $B = \{2, 3, 4\}$ .
- ( ) Dados  $A = \{2, 3, 4\}$ , e  $B = \{3, 4, 5, 6\}$  e a Relação Binária  $R$  de  $A$  em  $B$  tal que  $R = \{(x, y) \in Ax \times B \mid x \text{ divide } y\}$ , então a relação inversa de  $R$  é uma função sobrejetora.

Lendo-se a coluna de parênteses de cima para baixo, encontra-se

- a) V-F-V-F
- b) V-F-F-V
- c) F-F-V-F
- d) V-F-F-F
- e) F-F-F-F

**Comentários**

Analisando as proposições, temos que:

I. Falsa, pois não podemos afirmar qual deles será igual a 0 e qual será igual a 7, tendo em vista que um conjunto não é ordenado.

II. Falsa, pois:

*A possui  $\alpha$  elemnetos e  $2^\alpha = \beta$  subconjuntos*

Do enunciado, temos que:



*B possui  $\alpha + 3$  elementos*

Logo:

*B possui  $2^{\alpha+3} = 8 \cdot 2^\alpha = 8\beta$  subconjuntos e não  $3\beta$*

III. Falsa.

Como  $B \cap C = \{1\}$  e  $B \cup C = \{1, 2, 3, 4\}$ , temos que:

$$B = \{1, 3, 4\} \neq \{2, 3, 4\}$$

IV. Falsa.

Analisando o conjunto R:

$$R = \{(2, 4); (2, 6); (3, 3); (3, 6); (4, 4)\}$$

Com isso, o conjunto da relação inversa seria:

$$R^{-1} = \{(4, 2); (6, 2); (3, 3); (6, 3); (4, 4)\}$$

Portanto, um mesmo número no domínio possui mais de um valor na imagem e, conseqüentemente, não é uma função. Basta ver que  $R^{-1}(4) = 2 = 4$ .

**Gabarito: E**

**50. (EFOMM/2019)**

Dada a função  $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y} - \frac{x-y}{x+y}$ , o valor de  $f(a + b, a - b)$  é:

- a)  $\frac{a^2 - b^2}{ab}$
- b)  $\frac{a^2 - b^2}{2ab}$
- c) 1
- d)  $\frac{a^2 + b^2}{ab}$
- e)  $\frac{a^2 + b^2}{2ab}$

**Comentários**

Façamos  $x = a + b$  e  $y = a - b$ :

$$\begin{aligned} f(a + b, a - b) &= \frac{(a + b) + (a - b)}{(a + b) - (a - b)} - \frac{(a + b) - (a - b)}{(a + b) + (a - b)} \\ &= \frac{a + b + a - b}{a + b - a + b} - \frac{a + b - a + b}{a + b + a - b} = \frac{2a}{2b} - \left(\frac{2b}{2a}\right) = \frac{a}{b} - \frac{b}{a} = \frac{a^2 - b^2}{ab} \end{aligned}$$

**Gabarito: "a".**

**51. (EFOMM/2019)**



Seja  $f(k) = k^2 + 3k + 2$  e seja  $W$  o conjunto de inteiros  $\{0, 1, 2, \dots, 25\}$ . O número de elementos de  $W$ , tais que  $f(W)$  deixa resto zero, quando dividido por 6, é:

- a) 25
- b) 22
- c) 21
- d) 18
- e) 17

### Comentários

Para que  $f(W)$  deixe resto zero na divisão por 6, temos que  $f(W)$  deve ser múltiplo de 6, ou seja,  $f(W)$  deve possuir os fatores 2 e 3. Veja que  $f(k)$  pode ser fatorado:

$$f(k) = 0 \Rightarrow k^2 + 3k + 2 = 0 \Rightarrow k = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2} = -2 \text{ ou } -1$$
$$\Rightarrow f(k) = k^2 + 3k + 2 = (k + 2)(k + 1)$$

Como  $W$  é o conjunto de números inteiros, temos que  $(k + 2)(k + 1)$  será o produto de dois inteiros consecutivos e, conseqüentemente, sempre possuirá o fator 2. Assim, devemos verificar quais elementos de  $W$  fazem com que  $(k + 2)(k + 1)$  não seja divisível por 3. Sabemos que um número quando dividido por 3 pode deixar resto 0, 1 e 2, assim, se tomarmos  $k \in W$  tal que  $k$  seja múltiplo de 3, a expressão  $(k + 2)(k + 1)$  deixará resto 1 ou 2, ou seja, se  $k$  não pode ser múltiplo de 3 para que  $f(W)$  seja divisível por 6. No conjunto  $W$ , temos os seguintes múltiplos de 3:

$$(0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24) \Rightarrow n = 9$$

Assim, o número de elementos em  $W$  que deixa resto 0 na divisão por 6 é:

$$26 - 9 = 17$$

**Gabarito: "e".**

### 52. (EFOMM/2015)

Sejam as funções  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Sabendo que  $f$  é bijetora e  $g$  é sobrejetora, considere as sentenças a seguir:

- I-  $g \circ f$  é injetora;
- II-  $f \circ g$  é bijetora;
- III-  $g \circ f$  é sobrejetora.

Assinalando com verdadeiro (V) ou falso (F) a cada sentença, obtém-se

- a) V-V-V
- b) V-V-F



c) F-V-F

d) F-F-V

e) V-F-V

### Comentários

Vamos analisar as sentenças:

I- Falsa.

Podemos tomar  $f(x) = x$  que é uma função bijetora e, assim, temos:

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x)$$

Mas, o enunciado apenas afirma que  $g$  é sobrejetora, logo, não podemos afirmar que  $g$  é injetora, ou seja,  $g \circ f$  não é necessariamente injetora.

II- Falsa.

Podemos tomar  $f(x) = x$  e  $g(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1 \\ 1, & 1 < x \leq 2 \\ x - 1, & x > 2 \end{cases}$ . Note que  $g$  é sobrejetora, mas não é injetora, e  $f$  é bijetora. Fazendo  $f \circ g$ , temos:

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = g(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1 \\ 1, & 1 < x \leq 2 \\ x - 1, & x > 2 \end{cases}$$

Para  $x_1 = 1$  e  $x_2 = 2$ , temos  $f \circ g(1) = 1 = f \circ g(2)$ , ou seja,  $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f \circ g(x_1) = f \circ g(x_2)$ . Portanto,  $f \circ g$  não é injetora.

III- Verdadeira.

Temos  $g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , logo, temos que mostrar que  $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}$  tal que  $g \circ f(x) = y$ . Como  $g$  é sobrejetora, temos que  $\forall y \in \mathbb{R}, \exists w \in \mathbb{R}$  tal que  $g(w) = y$ . Sabemos que  $f$  é sobrejetora, logo, podemos tomar  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $f(x) = w$ . Assim  $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}$  tal que:

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(w) = y$$

**Gabarito: "d".**

### 53. (EFOMM/2010)

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função estritamente decrescente, quaisquer  $x_1$  e  $x_2$  reais, com  $x_1 < x_2$  tem-se  $f(x_1) > f(x_2)$ . Nessas condições, analise as afirmativas abaixo.

I-  $f$  é injetora.

II-  $f$  pode ser uma função par.

III- Se  $f$  possui inversa, então sua inversa é estritamente decrescente.

Assinale a opção correta.



- a) Apenas as afirmativas I é verdadeira.
- b) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

**Comentários**

I. Verdadeira.

Como a função é estritamente decrescente, temos  $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ .

II. Falsa.

Para uma função ser par, devemos ter  $f(x) = f(-x)$ . Supondo  $a > 0$ , temos  $-a < 0 < a$ , logo:

$$f(-a) > f(a) \Rightarrow f(-a) \neq f(a)$$

III. Verdadeira.

Sendo  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e estritamente decrescente, temos:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2) \quad (I)$$

Se  $f$  é inversível, temos:

$$f(x_1) = y_1 \Leftrightarrow x_1 = f^{-1}(y_1)$$

$$f(x_2) = y_2 \Leftrightarrow x_2 = f^{-1}(y_2)$$

Substituindo na relação (I):

$$f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2) \Leftrightarrow f(f^{-1}(y_1)) > f(f^{-1}(y_2))$$

Veja que aplicando  $f$  em  $x_1 = f^{-1}(y_1)$ , temos:

$$x_1 = f^{-1}(y_1) \Rightarrow f(x_1) = f(f^{-1}(y_1)) = y_1$$

Logo:


$$f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2) \Leftrightarrow y_1 > y_2$$

Portanto, a inversa também é estritamente decrescente.

**Gabarito: "b".**

**54. (EFOMM/2010)**

O gráfico das três funções polinomiais do 1º grau  $a$ ,  $b$  e  $c$  definidas, respectivamente, por  $a(x)$ ,  $b(x)$  e  $c(x)$  estão representadas abaixo.



Nessas condições, o conjunto solução da inequação  $\frac{(a(x))^5 \cdot (b(x))^6}{(c(x))^3} \geq 0$  é

- a)  $(-4; 1) \cup [3; +\infty)$
- b)  $[-4; -1] \cup [3; +\infty)$
- c)  $(-\infty; 4) \cup [-1; +\infty)$
- d)  $[4; +\infty)$
- e)  $\mathbb{R} - \{4\}$

**Comentários**

Pelo gráfico, o zero de  $a(x)$  é  $x = -1$  e seu coeficiente angular é  $1 \Rightarrow \boxed{a(x) = x + 1}$ . De mesmo modo, pelo gráfico o zero de  $b(x)$  é  $x = 3$  e seu coeficiente angular é  $-1 \Rightarrow \boxed{b(x) = -x + 3}$ .

Por fim, o zero de  $c(x)$  é  $x = -4$  e seu coeficiente angular é  $1 \Rightarrow \boxed{c(x) = x + 4}$ .

Portanto, queremos analisar a seguinte inequação:

$$\frac{(a(x))^5 \cdot (b(x))^6}{(c(x))^3} \geq 0 \Rightarrow \left[ \frac{(a(x))^2 \cdot (b(x))^3}{(c(x))^2} \right]^2 \cdot \frac{a(x)}{c(x)} \geq 0$$

Portanto, veja que o que vai determinar o sinal é a fração  $\frac{a(x)}{c(x)}$ , já que multiplica algo positivo.

Assim, essa fração será positiva quando  $a(x)$  e  $c(x)$  tiverem o mesmo sinal:

i) Ambos positivos

$$a(x) > 0 \Rightarrow x + 1 > 0 \Rightarrow \boxed{x > -1}$$

$$c(x) > 0 \Rightarrow x + 4 > 0 \Rightarrow \boxed{x > -4}$$

Assim, o caso em que são ambos positivos é para  $x > -1$ .



ii) Ambos negativos:

$$a(x) < 0 \Rightarrow x + 1 < 0 \Rightarrow \boxed{x < -1}$$

$$c(x) < 0 \Rightarrow x + 4 < 0 \Rightarrow \boxed{x < -4}$$

Assim, para satisfazer ambos intervalos, queremos  $x < -4$

Portanto, o conjunto solução é  $x < -4$  ou  $x > -1$

**Gabarito: "c"**

**55. (EFOMM/2006)**

Dados  $A = \{2, 3, 4\}$  e  $B = \{1, 6, 8, 12\}$ , a relação  $R_1 = \{(x, y) \in AxB \mid y = x + 4\}$  de  $A$  em  $B$  é dada por:

- a)  $\{(3, 6), (4, 8)\}$
- b)  $\{(2, 6), (4, 8)\}$
- c)  $\{(6, 2), (8, 4)\}$
- d)  $\{(2, 6), (3, 12), (4, 8)\}$
- e)  $\{(2, 1), (3, 6), (4, 8)\}$

**Comentários**

Para  $x \in A$ , temos:

$$x = 2 \Rightarrow y = 2 + 4 = 6 \in B$$

$$x = 3 \Rightarrow y = 3 + 4 = 7 \notin B$$

$$x = 4 \Rightarrow y = 4 + 4 = 8 \in B$$

Portanto, a relação  $R_1$  de  $A$  em  $B$  é:

$$R_1 = \{(2, 6), (4, 8)\}$$

**Gabarito: "b"**

**56. (Escola Naval/2015)**

Sejam  $f$  e  $g$  funções reais definidas por

$$f(x) = \begin{cases} 4x - 3, & \text{se } x \geq 0 \\ x^2 - 3x + 2, & \text{se } x < 0 \end{cases} \text{ e } g(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x > 2 \\ 1 - x^2, & \text{se } x \leq 2 \end{cases}$$

Sendo assim, pode-se dizer que  $(f \circ g)(x)$  é definida por

$$a) (f \circ g)(x) = \begin{cases} 4x + 1, & \text{se } x > 2 \\ 1 - 4x^2, & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ x^4 + x^2, & \text{se } x < -1 \text{ ou } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$



$$\text{b) } (f \circ g)(x) = \begin{cases} 4x - 1, & \text{se } x > 2 \\ 1 - 4x^2, & \text{se } -1 \leq x < 1 \\ x^4 - x^2, & \text{se } x < -1 \text{ ou } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{c) } (f \circ g)(x) = \begin{cases} 4x + 1, & \text{se } x \geq 2 \\ 1 - 4x^2, & \text{se } -1 < x < 1 \\ x^4 + x^2, & \text{se } x \leq -1 \text{ ou } 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

$$\text{d) } (f \circ g)(x) = \begin{cases} 4x + 1, & \text{se } x \geq 2 \\ 1 - 4x^2, & \text{se } -1 < x \leq 1 \\ x^4 + x^2, & \text{se } x < -1 \text{ ou } 1 < x < 2 \end{cases}$$

$$\text{e) } (f \circ g)(x) = \begin{cases} 4x + 1, & \text{se } x > 2 \\ -1 - 4x^2, & \text{se } -1 \leq x < 1 \\ x^4 - x^2, & \text{se } x < -1 \text{ ou } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

### Comentários

Vamos encontrar a composta  $f \circ g$ :

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \begin{cases} 4g(x) - 3, & \text{se } g(x) \geq 0 \\ g(x)^2 - 3g(x) + 2, & \text{se } g(x) < 0 \end{cases}$$

Note que podemos reescrever a segunda função de  $f$ :

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} 4g(x) - 3, & \text{se } g(x) \geq 0 \\ (g(x) - 2)(g(x) - 1), & \text{se } g(x) < 0 \end{cases}$$


Para  $g(x) \geq 0$ , temos:

$$g(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x > 2 \\ 1 - x^2, & \text{se } x \leq 2 \end{cases}$$

$$x > 2 \Rightarrow x + 1 > 3 \Rightarrow g(x) > 3$$

$$x \leq 2 \Rightarrow g(x) = 1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$$

Fazendo o estudo do sinal:



Temos  $g(x) \geq 0$  para  $-1 \leq x \leq 1$ , logo:

$$x > 2 \Rightarrow (f \circ g)(x) = 4(x + 1) - 3 = 4x + 4 - 3 = 4x + 1$$



$$-1 \leq x \leq 1 \Rightarrow (f \circ g)(x) = 4(1 - x^2) - 3 = 4 - 4x^2 - 3 = 1 - 4x^2$$

Analisando as alternativas, note que apenas a letra “a” admite esses resultados. Poderíamos parar a questão por aqui, mas vamos encontrar as outras funções:

Para  $g(x) < 0$ , temos  $x < -1$  ou  $1 < x \leq 2$ :

$$(f \circ g)(x) = (1 - x^2 - 2)(1 - x^2 - 1) = (-x^2 - 1)(-x^2) = x^4 + x^2$$

Portanto, a função resultante é:

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} 4x + 1, & \text{se } x > 2 \\ 1 - 4x^2, & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ x^4 + x^2, & \text{se } x < -1 \text{ ou } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

**Gabarito: “a”.**

**57. (Escola Naval/2013)**

Considere  $f$  e  $g$  funções reais de variável real definida por,  $f(x) = \frac{1}{4x-1}$  e  $g(x) = 2x^2$ . Qual é o domínio composto  $(f \circ g)(x)$ ?

- a)  $\mathbb{R}$
- b)  $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -\frac{1}{2\sqrt{2}}, x \neq \frac{1}{2\sqrt{2}}\right\}$
- c)  $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{1}{4}\right\}$
- d)  $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{1}{4}, x \neq \frac{1}{2\sqrt{2}}\right\}$
- e)  $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -\frac{1}{4}, x \neq -\frac{1}{2\sqrt{2}}\right\}$

**Comentários**

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{4g(x) - 1} = \frac{1}{4 \cdot 2x^2 - 1} = \frac{1}{8x^2 - 1}$$

A função  $f \circ g$  estará definida para todo  $x \in \mathbb{R}$  tal que o denominador da função  $8x^2 - 1 \neq 0$ , logo:

$$8x^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow 8x^2 \neq 1 \Rightarrow x^2 \neq \frac{1}{8} \Rightarrow x \neq \pm \frac{1}{\sqrt{8}} \Rightarrow x \neq \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Portanto, o domínio é dado por:

$$D = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -\frac{1}{2\sqrt{2}} \text{ e } x \neq \frac{1}{2\sqrt{2}}\right\}$$

**Gabarito: “b”.**



## 8. QUESTÕES NÍVEL 3

58. (ITA/2018)

Considere as funções  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dadas por  $f(x) = ax + b$  e  $g(x) = cx + d$ , com  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$  e  $c \neq 0$ . Se  $f^{-1} \circ g^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ , então uma relação entre as constantes  $a, b, c$  e  $d$  é dada por

a)  $b + ad = d + bc$

b)  $d + ba = c + db$

c)  $a + db = b + cd$

d)  $b + ac = d + ba$

e)  $c + da = b + cd$

59. (ITA/2017/Modificada)

Sejam  $X$  e  $Y$  dois conjuntos finitos com  $X \subset Y$  e  $X \neq Y$ . Considere as seguintes afirmações:

I. Existe uma bijeção  $f: X \rightarrow Y$ .

II. Existe uma função injetora  $g: Y \rightarrow X$ .

Classifique-as.

60. (ITA/2014)

Considere as funções apenas  $f, g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = ax + m$ ,  $g(x) = bx + n$ , em que  $a, b, m$  e  $n$  são constantes reais. Se  $A$  e  $B$  são as imagens de  $f$  e de  $g$ , respectivamente, então, das afirmações abaixo:

I. Se  $A = B$ , então  $a = b$  e  $m = n$ ;

II. Se  $A = \mathbb{Z}$ , então  $a = 1$ ;

III. Se  $a, b, m, n \in \mathbb{Z}$ , com  $a = b$  e  $m = -n$ , então  $A = B$ ,

É (são) verdadeira(s)

a) apenas I.

b) apenas II.

c) apenas III.

d) apenas I e II.

e) nenhuma.



61. (ITA/2014/Modificada)

Classifique a afirmação:

Sejam  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , com  $a < b < c$ . Se  $f: [a, c] \rightarrow [a, b]$  é sobrejetora, então  $f$  não é injetora.

62. (ITA/2013)

Considere as funções  $f, g, f + g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Das afirmações:

- I. Se  $f$  e  $g$  são injetoras,  $f + g$  é injetora;
- II. Se  $f$  e  $g$  são sobrejetoras,  $f + g$  é sobrejetora;
- III. Se  $f$  e  $g$  não são injetoras,  $f + g$  não é injetora;
- IV. Se  $f$  e  $g$  não são sobrejetoras,  $f + g$  não é sobrejetora;

É (são) verdadeira(s)

- a) nenhuma.
- b) apenas I e II.
- c) apenas I e III.
- d) apenas III e IV.
- e) todas.

63. (ITA/2010)

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  bijetora e ímpar. Mostre que a função inversa  $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  também é ímpar.

64. (ITA/2010)

Sejam  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tais que  $f$  é par e  $g$  é ímpar. Das seguintes afirmações:

- I.  $f \cdot g$  é ímpar,
  - II.  $f \circ g$  é par,
  - III.  $g \circ f$  é ímpar,
- É (são) verdadeira(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e II.
- e) todas.



65. (ITA/2006)

Seja  $f: [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 2x - 1, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \end{cases}$$

Seja  $g: \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$g(x) = \begin{cases} f\left(x + \frac{1}{2}\right), & -\frac{1}{2} < x < 0 \\ 1 - f\left(x + \frac{1}{2}\right), & 0 \leq x < \frac{1}{2} \end{cases}$$

Com  $f$  definida acima. Justificando a resposta, determine se  $g$  é par, ímpar ou nem par nem ímpar.

66. (ITA/2005)

Seja  $D: \mathbb{R} - \{1\}$  e  $f: D \rightarrow D$  uma função dada por

$$f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$$

Considere as afirmações:

- I.  $f$  é injetiva e sobrejetiva.
- II.  $f$  é injetiva, mas não sobrejetiva.
- III.  $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ , para todo  $x \in D, x \neq 0$ .
- IV.  $f(x)f(-x) = 1$ , para todo  $x \in D$ .

Então, são verdadeiras

- a) apenas I e III.
- b) apenas I e IV.
- c) apenas II e III.
- d) apenas I, III e IV.
- e) apenas II, III e IV.

67. (ITA/2005)

- I.  $\{0\} \in S$  e  $S \cap U \neq \emptyset$ .
- II.  $\{2\} \subset S \setminus U$  e  $S \cap T \cap U = \{0, 1\}$ .
- III. Existe uma função  $f: S \rightarrow T$  injetiva.



IV. Nenhuma função  $g: T \rightarrow S$  é sobrejetiva.

Então, é (são) verdadeira(s):

- a) apenas I.
- b) apenas IV.
- c) apenas I e IV.
- d) apenas II e III.
- e) apenas III e IV.

68. (ITA/2002)

Sejam  $a, b, c$  reais não-nulos e distintos,  $c > 0$ . Sendo par a função dada por

$$f(x) = \frac{ax + b}{x + c}, -c < x < c$$

Então  $f(x)$ , para  $-c < x < c$ , é constante e igual a

- a)  $a + b$
- b)  $a + c$
- c)  $c$
- d)  $b$
- e)  $a$

69. (ITA/1999)

Sejam  $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funções tais que a função composta  $h \circ g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é a função identidade.

Considere as afirmações:

- I. A função  $h$  é sobrejetora.
- II. Se  $x_0 \in \mathbb{R}$  é tal que  $f(x_0) = 0$ , então  $f(x) \neq 0$ , para todo  $x \in \mathbb{R}$  com  $x \neq x_0$ .
- III. A equação  $h(x) = 0$  tem a solução em  $\mathbb{R}$ .

Então:

- a) Apenas a afirmação (I) é verdadeira.
- b) Apenas a afirmação (II) é verdadeira.
- c) Apenas a afirmação (III) é verdadeira.
- d) Todas as afirmações são verdadeiras.
- e) Todas as afirmações são falsas.

**70. (ITA/1999)**

Considere as funções  $f$  e  $g$  definidas por  $f(x) = x - \left(\frac{2}{x}\right)$ , para  $x \neq 0$  e  $g(x) = \frac{x}{x+1}$ , para  $x \neq -1$ . O conjunto de todas as soluções da inequação

$$(g \circ f)(x) < g(x)$$

É

- a)  $[1, +\infty[$
- b)  $] -\infty, -2[$
- c)  $[-2, -1[$
- d)  $] -1, 1[$
- e)  $] -2, -1[ \cup ]1, +\infty[$

**71. (ITA/1998)**

Sejam as funções  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , tais que  $f(x) = x^2 - 9$  e  $(f \circ g)(x) = x - 6$ , em seus respectivos domínios. Então, o domínio  $A$  da função  $g$  é:

- a)  $[-3, +\infty[$
- b)  $\mathbb{R}$
- c)  $[-5, +\infty[$
- d)  $] -\infty, -1[ \cup ]3, +\infty[$
- e)  $] -\infty, \sqrt{6}[$

**72. (ITA/1997)**

Se  $\mathbb{Q}$  e  $\mathbb{I}$  representam, respectivamente, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, considere as funções  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definidas por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 1, & \text{se } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{se } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

Seja  $J$  a imagem da função composta  $f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

Podemos afirmar que

- a)  $J = \mathbb{R}$
- b)  $J = \mathbb{Q}$



- c)  $J = \{0\}$
- d)  $J = \{1\}$
- e)  $J = \{0, 1\}$

**73. (ITA/1996)**

Considere as funções reais  $f$  e  $g$  definidas por  $f(x) = \frac{1+2x}{1-x^2}$ ,  $x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$  e  $g(x) = \frac{x}{1+2x}$ ,  $x \in \mathbb{R} - \{-\frac{1}{2}\}$ .

O maior subconjunto de  $\mathbb{R}$  onde pode ser definida a composta  $f \circ g$ , tal que  $(f \circ g)(x) < 0$ , é:

- a)  $] -1, -\frac{1}{2}[ \cup ] -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}[$
- b)  $] -\infty, -1[ \cup ] -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}[$
- c)  $] -\infty, -1[ \cup ] -\frac{1}{2}, 1[$
- d)  $] 1, \infty[$
- e)  $] -\frac{1}{2}, \frac{-1}{3}[$

**74. (ITA/2009)**

Seja  $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = \frac{2x+3}{x+1}$ .

- a) Mostre que  $f$  é injetora.
- b) Determine  $D = \{f(x); x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}\}$  e  $f^{-1}: D \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

**75. (ITA/1994)**

Dadas as funções reais de variável real  $f(x) = mx + 1$  e  $g(x) = x + m$ , onde  $m$  é uma constante real com  $0 < m < 1$ , considere as afirmações:

- I.  $(f \circ f)(x) = (g \circ f)(x)$ , para algum  $x \in \mathbb{R}$ ;
- II.  $f(m) = g(m)$ ;
- III. Existe  $a \in \mathbb{R}$  tal que  $(f \circ g)(a) = f(a)$ ;
- IV. Existe  $b \in \mathbb{R}$  tal que  $(g \circ f)(b) = mb$ ;
- V.  $0 < (g \circ g)(m) < 3$ .

Podemos concluir que:

- a) todas são verdadeiras.
- b) apenas quatro são verdadeiras.



- c) apenas três são verdadeiras.
- d) apenas duas são verdadeiras.
- e) apenas uma é verdadeira.

**76. (ITA/1992)**

Dadas as funções  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ambas estritamente decrescentes e sobrejetoras, considere  $h = f \circ g$ . Então podemos afirmar que:

- a)  $h$  é estritamente crescente, inversível e sua inversa é estritamente crescente.
- b)  $h$  é estritamente decrescente, inversível e sua inversa é estritamente crescente.
- c)  $h$  é estritamente crescente, mas não é necessariamente inversível.
- d)  $h$  é estritamente crescente, inversível e sua inversa é estritamente decrescente.
- e) n.d.a.

**77. (ITA/1991)**

Considere as afirmações:

- I. Se  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função par e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função qualquer, então a composição  $g \circ f$  é uma função par;
- II. Se  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função par e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função ímpar, então a composição  $f \circ g$  é uma função par;
- III. Se  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função ímpar e inversível então  $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função ímpar.

Então:

- a) Apenas a afirmação I é falsa.
- b) Apenas as afirmações I e II são falsas.
- c) Apenas a afirmação III é verdadeira.
- d) Todas as afirmações são falsas.
- e) n.d.a.

**78. (ITA/1990)**

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  a função definida por 
$$\begin{cases} x + 2, & \text{se } x \leq -1 \\ x^2, & \text{se } -1 < x \leq 1. \\ 4, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Lembrando que se  $A \subset \mathbb{R}$  então  $f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{R}: f(x) \in A\}$  considere as afirmações:



- I.  $f$  não é injetora e  $f^{-1}([3, 5]) = \{4\}$ ;
- II.  $f$  não é sobrejetora e  $f^{-1}([3, 5]) = f^{-1}([2, 6])$ ;
- III.  $f$  é injetora e  $f^{-1}([0, 4]) = [-2, +\infty[$ .

Então podemos garantir que:

- a) apenas as afirmações II e III são falsas.
- b) as afirmações I e III são verdadeiras.
- c) apenas a afirmação II é verdadeira.
- d) apenas a afirmação III é verdadeira.
- e) todas as afirmações são falsas.

**79. (ITA/1988)**

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função estritamente decrescente, isto é, quaisquer  $x$  e  $y$  reais com  $x < y$  tem-se  $f(x) > f(y)$ . Dadas as afirmações:

- I.  $f$  é injetora;
- II.  $f$  pode ser uma função par;
- III. Se  $f$  possui inversa então sua inversa também é estritamente decrescente.

Podemos assegurar que:

- a) apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- b) apenas as afirmações II e III são falsas.
- c) apenas a afirmação I é falsa.
- d) todas as afirmações são verdadeiras.
- e) apenas a afirmação II é verdadeira.

**80. (ITA/1986)**

Consideremos as seguintes afirmações sobre uma função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

- I. Se existe  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $f(x) \neq f(-x)$  então  $f$  não é par;
- II. Se existe  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $f(-x) = -f(x)$  então  $f$  é ímpar;
- III. Se  $f$  é par e ímpar então existe  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $f(x) = 1$ ;
- IV. Se  $f$  é ímpar então  $f \circ f$  ( $f$  composta com  $f$ ) é ímpar.

Podemos afirmar que estão corretas as afirmações de números

- a) I e IV.



b) I, II e IV.

c) I e III.

d) III e IV.

e) I, II e III.

**81. (ITA/1985)**

Dadas as sentenças:

I. Sejam  $f: X \rightarrow Y$  e  $g: Y \rightarrow X$  duas funções satisfazendo  $(g \circ f)(x) = x$ , para todo  $x \in X$ . Então  $f$  é injetiva, mas  $g$  não é necessariamente sobrejetiva;

II. Seja  $f: X \rightarrow Y$  uma função injetiva. Então,  $f(A) \cap f(B) = f(A \cap B)$ , onde  $A$  e  $B$  são dois subconjuntos de  $X$ ;

III. Seja  $f: X \rightarrow Y$  uma função injetiva. Então, para cada subconjunto  $A$  de  $X$ ,  $f(A^c) \subset (f(A))^c$  onde  $A^c = \{x \in X | x \notin A\}$  e  $(f(A))^c = \{x \in Y | x \notin f(A)\}$ ,

podemos afirmar que está (estão) correta(s):

a) As sentenças I e II.

b) As sentenças II e III.

c) Apenas a sentença I.

d) As sentenças I e III.

e) Todas as sentenças.

**82. (ITA/1982)**

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = \begin{cases} \frac{x+a}{x+b}, & \text{se } x \neq -b \\ -1, & \text{se } x = -b \end{cases}$ . Se  $f(f(x)) = x$  para todo  $x$  real, então

a)  $ab = -2$ .

b)  $ab = -1$ .

c)  $ab = 0$ .

d)  $ab = 1$ .

e)  $ab = 2$ .

**83. (ITA/1980)**

Sejam  $A$  e  $B$  subconjuntos não vazios de  $\mathbb{R}$  e  $f: A \rightarrow B$ ,  $g: B \rightarrow A$  duas funções tais que  $f \circ g = I_B$ , onde  $I_B$  é a função identidade em  $B$ . Então podemos afirmar que:



- a)  $f$  é sobrejetora.
- b)  $f$  é injetora.
- c)  $f$  é bijetora.
- d)  $g$  é injetora e par.
- e)  $g$  é bijetora e ímpar.

**84. (ITA/1978)**

Sejam  $\mathbb{R}$  o conjunto dos números reais e  $f$  uma função de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$ . Se  $B \subset \mathbb{R}$  e o conjunto  $f^{-1}(B) = \{x \in \mathbb{R}: f(x) \in B\}$ , então:

- a)  $f(f^{-1}(B)) \subset B$ .
- b)  $f(f^{-1}(B)) = B$  se  $f$  é injetora.
- c)  $f(f^{-1}(B)) = B$ .
- d)  $f^{-1}(f(B)) = B$  se  $f$  é sobrejetora.
- e) n.d.a.

**85. (ITA/1976)**

Considere  $g: \{a, b, c\} \rightarrow \{a, b, c\}$  uma função tal que  $g(a) = b$  e  $g(b) = a$ . Então, temos:

- a) a equação  $g(x) = x$  tem solução se, e somente se,  $g$  é injetora.
- b)  $g$  é injetora, mas não é sobrejetora.
- c)  $g$  é sobrejetora, mas não é injetora.
- d) se  $g$  não é sobrejetora, então  $g(g(x)) = x$  para todo  $x$  em  $\{a, b, c\}$ .
- e) n.d.r.a.

**86. (ITA/1974)**

Sejam  $A, B$ , e  $D$  subconjuntos não vazios do conjunto  $\mathbb{R}$  dos números reais. Sejam as funções  $f: A \rightarrow B$ ,  $g: D \rightarrow A$ , e a função composta  $(f \circ g): D \rightarrow B$ . Então os conjuntos  $E$  e  $K$  são tais que:

- a)  $E \subset A$  e  $K \subset D$ .
- b)  $E \subset B$  e  $K \supset A$ .
- c)  $E \supset D$ ,  $D \neq E$  e  $K \subset B$ .
- d)  $E \subset D$  e  $K \subset B$ .



e) n.d.a.

**87. (IME/2019)**

Definimos a função  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  da seguinte forma:

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(1) = 1 \\ f(2n) = f(n), \quad n \geq 1 \\ f(2n + 1) = n^2, \quad n \geq 1 \end{cases}$$

Definimos a função  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  da seguinte forma:  $g(n) = f(n)f(n + 1)$ .

Podemos afirmar que:

- a)  $g$  é uma função sobrejetora.
- b)  $g$  é uma função injetora.
- c)  $f$  é uma função sobrejetora.
- d)  $f$  é uma função injetora.
- e)  $g(2018)$  tem mais do que 4 divisores positivos.

**88. (IME/2018)**

Considere as alternativas:

- I. O inverso de um irracional é sempre irracional.
- II. Seja a função  $f: A \rightarrow B$  e  $X$  e  $Y$  dois subconjuntos quaisquer de  $A$ , então  $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$ .
- III. Seja a função  $f: A \rightarrow B$  e  $X$  e  $Y$  dois subconjuntos quaisquer de  $A$ , então  $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$ .
- IV. Dados dois conjuntos  $A$  e  $B$  não vazios, então  $A \cap B = A$  se, e somente se,  $B \subset A$ .

Obs.:  $f(\mathbb{Z})$  é a imagem de  $f$  no domínio  $\mathbb{Z}$ .

São corretas:

- a) I, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) II e III, apenas.

**89. (IME/2018)**



Seja  $f(x)$  uma função definida no conjunto dos números reais, de forma que  $f(1) = 5$  e para qualquer  $x$  pertencente aos números reais  $f(x + 4) \geq f(x) + 4$  e  $f(x + 1) \leq f(x) + 1$ .

Se  $g(x) = f(x) + 2 - x$ , o valor de  $g(2017)$  é:

- a) 2
- b) 6
- c) 13
- d) 2021
- e) 2023

**90. (IME/2017)**

O sistema de inequações abaixo admite  $k$  soluções inteiras.

$$\begin{cases} \frac{x^2 - 2x - 14}{x} > 3 \\ x \leq 12 \end{cases}$$

Pode-se afirmar que:

- a)  $0 \leq k < 2$
- b)  $2 \leq k < 4$
- c)  $4 \leq k < 6$
- d)  $6 \leq k < 8$
- e)  $k \geq 8$

**91. (IME/2016)**

Sejam as funções  $f_n$ , para  $n \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ , tais que:  $f_0(x) = \frac{1}{1-x}$  e  $f_n(x) = f_0(f_{n-1}(x))$ , para  $n \geq 1$ . Calcule  $f_{2016}(2016)$ .

**92. (IME/2010)**

Sejam as funções  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . A alternativa que apresenta a condição necessária para que se  $f(g(x)) = f(h(x))$ , então  $g(x) = h(x)$  é

- a)  $f(x) = x$
- b)  $f(f(x)) = f(x)$
- c)  $f$  é bijetora
- d)  $f$  é sobrejetora



e)  $f$  é injetora

93. (IME/2009)

Sejam  $f$  uma função bijetora de uma variável real, definida para todo conjunto dos números reais, e as relações  $h$  e  $g$ , definidas por:  $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2: (x, y) \rightarrow (x^2, x - f(y))$  e  $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2: (x, y) \rightarrow (x^3, x - f(y))$ . Pode-se afirmar que

- a)  $h$  e  $g$  são sobrejetoras.
- b)  $h$  é injetora e  $g$  sobrejetora.
- c)  $h$  e  $g$  não são bijetoras.
- d)  $h$  e  $g$  não são sobrejetoras.
- e)  $h$  não é injetora e  $g$  é bijetora.

94. (IME/2007)

Considere os conjuntos  $A = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$  e  $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , e seja a função  $f: A \rightarrow B$  tal que:

$$f(x, y) = x + y$$

É possível afirmar que  $f$  é uma função:

- a) injetora
- b) sobrejetora
- c) bijetora
- d) par
- e) ímpar

95. (IME/1976)

São dados os conjuntos  $E = \{a, b, c, d\}$  e  $F \subset E$ , tal que  $F = \{a, b\}$ . Denote por  $P(E)$  o conjunto das partes de  $E$  e considere, em  $P(E)$ , a relação  $R$ , tal que

$$X R Y \Leftrightarrow F \cap X = F \cap Y$$

- a) Verifique se  $R$  é uma relação de equivalência.
- b)  $Z \subset P(E)$ . Determine  $Z$ , sabendo-se que  $Z \cap F = \{b\}$ .
- c)  $W \subset P(E)$ . Determine  $W$ , sabendo-se que  $F \cap W = \emptyset$ .

Obs.:  $P(E)$  tem 16 elementos.  $\Leftrightarrow$  significa “se e somente se”.

96. (IME/1972)



Seja  $A$  um conjunto não vazio e  $R$  uma relação em  $A$ , reflexiva e transitiva. Definimos a relação  $S$ , em  $A$ , por:

$$xSy \text{ se e somente se } xRy \text{ e } yRx.$$

a) Mostre que  $S$  é uma relação de equivalência em  $A$ . Caracterize as classes de equivalência determinadas por  $S$  em  $A$ , quando  $R$  é uma relação de ordem.

b) Determine explicitamente o conjunto quociente  $A/S$ , quando

$$R = [(A \cap B) \times (A \cap B)] \cup [(A - B) \times (A - B)],$$

onde  $B$  é um conjunto não vazio.

## GABARITO

58. a

59. I. F II. F

60. e

61. Falsa.

62. a

63. Demonstração

64. d

65.  $g$  é par

66. a

67. b

68. e

69. d

70. e

71. a

72. c

73. a

74. a) Demonstração; b)  $f^{-1}(x) = \frac{-x+3}{x-2}$

75. d

76. a

77. e

78. c

79. a

80. a

81. b

82. d

83. a

84. b

85. e

86. d

87. e



88. b

89. b

90. d

91.  $f_{2016}(2016) = -\frac{1}{2015}$

92. e

93. e

94. a

95. a) Demonstração b)  $Z \in \{\{b\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{b, c, d\}\}$  c)  $W \in \{\emptyset, \{c\}, \{d\}, \{c, d\}\}$

96. a)  $[y] = \{x \in A | x = y\}$  b)  $A/S = \{\{y \in (A \cap B) | y = x\} | x \in (A \cap B)\} \cup \{\{y \in (A - B) | y = x\} | x \in (A - B)\}$

## RESOLUÇÃO

### 58. (ITA/2018)

Considere as funções  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dadas por  $f(x) = ax + b$  e  $g(x) = cx + d$ , com  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$  e  $c \neq 0$ . Se  $f^{-1} \circ g^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ , então uma relação entre as constantes  $a, b, c$  e  $d$  é dada por

a)  $b + ad = d + bc$

b)  $d + ba = c + db$

c)  $a + db = b + cd$

d)  $b + ac = d + ba$

e)  $c + da = b + cd$

### Comentários

Vamos encontrar as inversas  $f^{-1}$  e  $g^{-1}$ :

$$f(x) = ax + b$$

$$y = f(x) \Rightarrow y = ax + b$$

$$x = \frac{y - b}{a}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y - b}{a}$$

$$g(x) = cx + d$$

$$y = g(x) \Rightarrow y = cx + d$$

$$x = \frac{y - d}{c}$$

$$\Rightarrow g^{-1}(y) = \frac{y - d}{c}$$

Encontrando as compostas:



$$f^{-1} \circ g^{-1}(x) = f^{-1}[g^{-1}(x)] = \frac{g^{-1}(x) - b}{a} =$$

$$\frac{\left(\frac{x-d}{c}\right) - b}{a} = \frac{x-d-bc}{ac}$$

$$\Rightarrow f^{-1} \circ g^{-1}(x) = \frac{x-d-bc}{ac}$$

$$g^{-1} \circ f^{-1}(x) = g^{-1}[f^{-1}(x)] = \frac{f^{-1}(x) - d}{c} =$$

$$\frac{\left(\frac{x-b}{a}\right) - d}{c} = \frac{x-b-ad}{ac}$$

$$\Rightarrow g^{-1} \circ f^{-1}(x) = \frac{x-b-ad}{ac}$$

A relação entre as constantes será dada por:

$$f^{-1} \circ g^{-1}(x) = g^{-1} \circ f^{-1}(x)$$

$$\frac{x-d-bc}{ac} = \frac{x-b-ad}{ac}$$

$$\frac{x-d-bc}{ac} = \frac{x-b-ad}{ac}$$

$$-d-bc = -b-ad$$

$$\Rightarrow b+ad = d+bc$$

**Gabarito: "a".**

**59. (ITA/2017/Modificada)**

Sejam  $X$  e  $Y$  dois conjuntos finitos com  $X \subset Y$  e  $X \neq Y$ . Considere as seguintes afirmações:

I. Existe uma bijeção  $f: X \rightarrow Y$ .

II. Existe uma função injetora  $g: Y \rightarrow X$ .

Classifique-as.

**Comentários**

Se  $X$  e  $Y$  são dois conjuntos finitos,  $X \subset Y$  e  $X \neq Y$ :  $n(X) < n(Y)$ .

I.  $n(X) < n(Y)$ . Então uma função de  $X$  em  $Y$  implica que  $Im(f) \neq Y$ , já que o número de elementos do domínio  $X$  é menor que o número de elementos do contradomínio  $Y$ . E pela definição de função, um  $x \in X$  não pode ser transformada em dois valores  $y \in Y$ . Logo,  $f$  não é sobrejetora. Consequentemente,  $f$  não é bijetora.

Falsa.

II. Da definição de função,  $g: Y \rightarrow X$  implica que todos os elementos do domínio  $Y$  devem ser transformados nos elementos pertencentes ao contradomínio  $X$  (não obrigatoriamente todos). Então, teremos obrigatoriamente  $\exists y_1, y_2 \in Y$ , tal que  $g(y_1) = g(y_2)$ .  $g$  não é injetora.



Falsa.

**Gabarito: I. F II. F**

**60. (ITA/2014)**

Considere as funções apenas  $f, g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = ax + m$ ,  $g(x) = bx + n$ , em que  $a, b, m$  e  $n$  são constantes reais. Se  $A$  e  $B$  são as imagens de  $f$  e de  $g$ , respectivamente, então, das afirmações abaixo:

- I. Se  $A = B$ , então  $a = b$  e  $m = n$ ;
- II. Se  $A = \mathbb{Z}$ , então  $a = 1$ ;
- III. Se  $a, b, m, n \in \mathbb{Z}$ , com  $a = b$  e  $m = -n$ , então  $A = B$ ,

É (são) verdadeira(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e II.
- e) nenhuma.

**Comentários**

I. Suponha  $f(x) = x$  e  $g(x) = -x + 1$ . O domínio das funções  $f$  e  $g$  é o conjunto  $\mathbb{Z}$  e a imagem de  $f$  é  $A = \mathbb{Z}$  e de  $g$  é  $B = \mathbb{Z}$ .

$$A = B$$

$$a = 1 \neq -1 = b$$

$$m = 0 \neq 1 = n$$

∴ Falsa.

II. Se tomarmos  $f(x) = -x$ , temos  $A = \mathbb{Z}$  e  $a = -1$ .

∴ Falsa.

III. Vamos tomar  $f(x) = 3x + 1$  e  $g(x) = 3x - 1$ .

$3, \pm 1 \in \mathbb{Z}$  e satisfaz a condição  $a = b$  e  $m = -n$ .

$$f(3) = 3 \cdot 3 + 1 = 10$$

Se  $A = B$ , então devemos ter um  $x \in \mathbb{Z}$ , tal que  $g(x) = 10$ .

$$g(x) = 3x - 1 = 10$$

$$x = \frac{11}{3} \notin \mathbb{Z}$$

Não temos  $x \in \mathbb{Z}$ , tal que  $10 \in B$ .

Logo,  $A \neq B$ . Falsa.



**Gabarito: “e”.**

**61. (ITA/2014/Modificada)**


**Classifique a afirmação:**

**Sejam  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , com  $a < b < c$ . Se  $f: [a, c] \rightarrow [a, b]$  é sobrejetora, então  $f$  não é injetora.**

**Comentários**

Essa questão é um exemplo de como o ITA gosta de generalizar resultados. Normalmente, afirmações assim são falsas.

Com o tempo, ganharemos experiência e não precisaremos gastar tempo para encontrar uma função que sirva de contra-exemplo. Veja o gráfico da função  $f$  abaixo:



Podemos usar a função  $f(x) = \alpha x + \beta$ , tal que  $\alpha$  e  $\beta$  seja os coeficientes do gráfico da função acima. Essa reta é sobrejetora em  $[a, b]$  e injetora. Logo a afirmação é falsa.

Poderíamos resolver também analiticamente. Vamos tentar encontrar um contra-exemplo que seja sobrejetora e injetora. A função mais simples que podemos usar é a função de primeiro grau.

Seja  $f(x) = \alpha x + \beta$ , encontrando  $\alpha$  e  $\beta$  tal que  $f: [a, c] \rightarrow [a, b]$ :

$$f(a) = \alpha a + \beta = a \quad (I)$$

$$f(c) = \alpha c + \beta = b \quad (II)$$

$(II) - (I)$ :

$$\alpha(c - a) = b - a \Rightarrow \alpha = \frac{b - a}{c - a}$$

$$f(x) = \frac{(b - a)}{c - a} x + \beta$$



Substituindo  $x = a$  e sabendo que  $f(a) = a$ :

$$f(a) = \frac{(b-a)}{c-a}a + \beta = a$$

$$\beta = a - \frac{(b-a)}{c-a}a = a \left( 1 - \frac{(b-a)}{c-a} \right) = \frac{a(c-b)}{c-a}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{(b-a)}{c-a}a + \frac{a(c-b)}{c-a}$$

$f: [a, c] \rightarrow [a, b]$  é uma função bijetora.

∴ Afirmação falsa.

**Gabarito: Falsa.**

**62. (ITA/2013)**

Considere as funções  $f, g, f + g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Das afirmações:

- I. Se  $f$  e  $g$  são injetoras,  $f + g$  é injetora;
- II. Se  $f$  e  $g$  são sobrejetoras,  $f + g$  é sobrejetora;
- III. Se  $f$  e  $g$  não são injetoras,  $f + g$  não é injetora;
- IV. Se  $f$  e  $g$  não são sobrejetoras,  $f + g$  não é sobrejetora;

É (são) verdadeira(s)

- a) nenhuma.
- b) apenas I e II.
- c) apenas I e III.
- d) apenas III e IV.
- e) todas.

**Comentários**

I. Vamos supor  $f(x) = x$  e  $g(x) = -x$ , ambas são funções injetoras em  $\mathbb{R}$ . Se  $h = f + g$ :

$$h(x) = f(x) + g(x) = x - x = 0$$

$$h(x) = 0$$

$h$  não é uma função injetora.

∴ Falsa.

II. Usando o contra-exemplo da I, temos:

$$f(x) = x$$

$$g(x) = -x$$

$$h(x) = f(x) + g(x) = 0$$

$f$  e  $g$  são sobrejetoras em  $\mathbb{R}$ , mas  $h = f + g$  não é sobrejetora ( $Im(h) = \{0\} \neq \mathbb{R}$ ).



∴ Falsa.

III. Vamos supor  $f(x) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$  e  $g(x) = -(x - 1)^2 = -x^2 + 2x - 1$ .  
Ambas não são injetoras em  $\mathbb{R}$ . Se  $h = f + g$ :

$$h(x) = f(x) + g(x) = (x^2 + 2x + 1) + (-x^2 + 2x - 1) = 4x$$

$$h(x) = 4x$$

$h$  é injetora.

∴ Falsa.

IV. Usando o mesmo contra-exemplo da III:

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$

$$g(x) = -x^2 + 2x - 1$$

$$h(x) = f(x) + g(x) = 4x$$

$f$  e  $g$  não são sobrejetoras em  $\mathbb{R}$  e  $h$  é sobrejetora em  $\mathbb{R}$ .

∴ Falsa.

**Gabarito: "a".**

**63. (ITA/2010)**

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  bijetora e ímpar. Mostre que a função inversa  $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  também é ímpar.

**Comentários**

Vamos provar por absurdo.

Supondo que  $f^{-1}$  não seja ímpar, então  $\exists y \in \mathbb{R}$ , tal que  $f^{-1}(-y) \neq -f^{-1}(y)$ .

Definindo  $a = f^{-1}(-y)$  e  $b = f^{-1}(y)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ , temos:

$$f^{-1}(-y) \neq -f^{-1}(y)$$

$$a \neq -b$$

Da condição de injetora:

$$f(a) \neq f(-b)$$

Como  $f$  é ímpar:

$$f(-b) = -f(b)$$

Dessa forma, encontramos:

$$f(a) \neq -f(b)$$

Substituindo  $a = f^{-1}(-y)$  e  $b = f^{-1}(y)$ :

$$f(f^{-1}(-y)) \neq -f(f^{-1}(y))$$

Usando as propriedades da inversa:

$$-y \neq -(y)$$

$$-y \neq -y$$



$\therefore$  Absurdo!

Portanto,  $f^{-1}$  também é ímpar.

**Gabarito: Demonstração.**

**64. (ITA/2010)**

Sejam  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tais que  $f$  é par e  $g$  é ímpar. Das seguintes afirmações:

I.  $f \cdot g$  é ímpar,

II.  $f \circ g$  é par,

III.  $g \circ f$  é ímpar,

É (são) verdadeira(s)

a) apenas I.

b) apenas II.

c) apenas III.

d) apenas I e II.

e) todas.

**Comentários**

I.  $f \cdot g$  é ímpar

Vamos definir  $h(x) = f(x)g(x)$ . Desse modo:

$$h(-x) = f(-x)g(-x)$$

$$f \text{ é par } \Rightarrow f(x) = f(-x)$$

$$g \text{ é ímpar } \Rightarrow g(-x) = -g(x)$$

$$h(-x) = f(x)[-g(x)] = -f(x)g(x) = -h(x)$$

$$\therefore h \text{ é ímpar } \Rightarrow f \cdot g \text{ é ímpar}$$

Verdadeira.

II.  $f \circ g$  é par

Definindo  $H(x) = (f \circ g)(x) = f[g(x)]$ . Temos:

$$H(-x) = f[g(-x)]$$

$$g \text{ ímpar } \Rightarrow g(-x) = -g(x)$$

$$f \text{ par } \Rightarrow f(-x) = f(x)$$

$$H(-x) = f[-g(x)] = f[g(x)] = H(x)$$

$$\therefore H \text{ é par } \Rightarrow f \circ g \text{ é par}$$

Verdadeira.

III.  $g \circ f$  é ímpar



Definindo  $s(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)]$ . Temos:

$$s(-x) = g[f(-x)] = g[f(x)] = s(x)$$

$$\therefore s \text{ é par} \Rightarrow g \circ f \text{ é par}$$

Falsa.

**Gabarito: “d”.**

65. (ITA/2006)

Seja  $f: [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 2x - 1, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \end{cases}$$

Seja  $g: \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$g(x) = \begin{cases} f\left(x + \frac{1}{2}\right), & -\frac{1}{2} < x < 0 \\ 1 - f\left(x + \frac{1}{2}\right), & 0 \leq x < \frac{1}{2} \end{cases}$$

Com  $f$  definida acima. Justificando a resposta, determine se  $g$  é par, ímpar ou nem par nem ímpar.

**Comentários**

Precisamos verificar a paridade da função  $g$ .

$g$  está definido em dois intervalos distintos.

Supondo  $-1/2 < x < 0$ :

$$g(x) = f\left(x + \frac{1}{2}\right)$$

$$-\frac{1}{2} < x < 0$$

Usando as propriedades da desigualdade:

$$-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} < x + \frac{1}{2} < 0 + \frac{1}{2}$$

$$0 < x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$$

Dessa forma:

$$f\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2\left(x + \frac{1}{2}\right), 0 < x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$$

$$g(x) = 2x + 1, -\frac{1}{2} < x < 0$$

Para  $0 \leq x < 1/2$ :



$$g(x) = 1 - f\left(x + \frac{1}{2}\right)$$

$$0 \leq x < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \leq x + \frac{1}{2} < 1$$


$$f\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2\left(x + \frac{1}{2}\right) - 1, \frac{1}{2} \leq x + \frac{1}{2} < 1$$

$$g(x) = 1 - \left[2\left(x + \frac{1}{2}\right) - 1\right] = 1 - 2x$$

$$g(x) = 1 - 2x, 0 \leq x < \frac{1}{2}$$

$$g(x) = \begin{cases} 1 + 2x, & -\frac{1}{2} < x < 0 \\ 1 - 2x, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \end{cases}$$

Representando a função  $g$  no plano cartesiano:



$g(x) = g(-x)$ , logo  $g$  é par.

**Gabarito:  $g$  é par**

66. (ITA/2005)

Seja  $D: \mathbb{R} - \{1\}$  e  $f: D \rightarrow D$  uma função dada por

$$f(x) = \frac{x+1}{x-1}$$

Considere as afirmações:

I.  $f$  é injetiva e sobrejetiva.

II.  $f$  é injetiva, mas não sobrejetiva.

III.  $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ , para todo  $x \in D, x \neq 0$ .



IV.  $f(x)f(-x) = 1$ , para todo  $x \in D$ .

Então, são verdadeiras

- a) apenas I e III.
- b) apenas I e IV.
- c) apenas II e III.
- d) apenas I, III e IV.
- e) apenas II, III e IV.

**Comentários**

I. Vamos verificar se  $f$  é injetora.

$\forall x_1, x_2 \in D$ :

$$\begin{aligned}
 f(x_1) &= f(x_2) \\
 \frac{x_1 + 1}{x_1 - 1} &= \frac{x_2 + 1}{x_2 - 1} \\
 (x_1 + 1)(x_2 - 1) &= (x_2 + 1)(x_1 - 1) \\
 x_1x_2 - x_1 + x_2 - 1 &= x_1x_2 - x_2 + x_1 - 1 \\
 \cancel{x_1x_2} - x_1 + x_2 - \cancel{1} &= \cancel{x_1x_2} - x_2 + x_1 - \cancel{1} \\
 2x_2 &= 2x_1 \\
 x_2 &= x_1
 \end{aligned}$$

$\therefore f$  é injetora

Agora, verificamos se  $f$  é sobrejetora.

$y \in \mathbb{R}$  e  $y = f(x)$ , temos:

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{x + 1}{x - 1} \\
 y(x - 1) &= x + 1 \\
 yx - y &= x + 1 \\
 yx - x &= y + 1 \\
 x(y - 1) &= y + 1 \\
 x &= \frac{y + 1}{y - 1}
 \end{aligned}$$

Analisando a condição de existência:

$$y - 1 \neq 0 \Rightarrow y \neq 1$$

Logo, temos:

$$Im(f) = \mathbb{R} - \{1\} = D$$

$\therefore f$  é sobrejetora



Portanto, afirmação verdadeira.

II. Como visto na I,  $f$  é injetiva e sobrejetiva. Afirmação falsa.

III. Vamos calcular  $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$  para  $x \neq 0$  e  $\forall x \in D$ :

$$f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x+1}{x-1} + \frac{\frac{1}{x} + 1}{\frac{1}{x} - 1} = \frac{x+1}{x-1} + \frac{1+x}{1-x} = \frac{x+1}{x-1} + \frac{x+1}{(-1)(x-1)} = 0$$

∴ Afirmação verdadeira.

IV.  $f(x)f(-x) = 1, \forall x \in D$ .



**PEGADINHA**

Temos uma pegadinha nessa afirmação. Se não nos atentássemos a esse detalhe acabaríamos marcando como verdadeira. Veja:

$$f(x)f(-x) = \frac{(x+1)(-x+1)}{(x-1)(-x-1)} = \frac{-x^2+1}{-x^2+1} = 1$$

Mas,  $x$  está definida no conjunto  $D = \mathbb{R} - \{1\}$ . Se tomarmos  $x = -1 \in D$ , temos  $f(-x) = f(-(-1)) = f(1)$  e sabemos que  $1 \notin D$ . Logo,  $f(-x)$  não está definida para todo  $x \in D$ .

∴ Falsa.

**Gabarito: "a".**

**67. (ITA/2005)**

Considere os conjuntos  $S = \{0, 2, 4, 6\}$ ,  $T = \{1, 3, 5\}$  e  $U = \{0, 1\}$  e as afirmações:

- I.  $\{0\} \in S$  e  $S \cap U \neq \emptyset$ .
- II.  $\{2\} \subset S \setminus U$  e  $S \cap T \cap U = \{0, 1\}$ .
- III. Existe uma função  $f: S \rightarrow T$  injetiva.
- IV. Nenhuma função  $g: T \rightarrow S$  é sobrejetiva.

Então, é (são) verdadeira(s):

- a) apenas I.
- b) apenas IV.
- c) apenas I e IV.
- d) apenas II e III.
- e) apenas III e IV.

**Comentários**



I. Falsa.

Temos que  $0 \in S$  e  $\{0\} \notin S$ . Além disso,  $S \cap U = \{0\} \neq \emptyset$ .

II. Falsa.

Temos que  $S \setminus U = S - U = \{2, 4, 6\}$  e  $\{2\} \subset \{2, 4, 6\}$ , mas  $S \cap T \cap U = \emptyset$ .

III. Da definição de função injetora, se  $f: S \rightarrow T$ :

$$(\forall x_1, x_2 \in S)(x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$$

$f$  é função de  $S$  em  $T$ , então, todos os elementos de  $S$  devem ser transformados em algum elemento de  $T$ . Como  $n(S) > n(T)$ , é impossível criar uma função que satisfaça às condições da injetora.

∴ Afirmação falsa.

IV.  $g: T \rightarrow S$

Da definição de função, um elemento não pode ser transformado em dois números distintos. Então, temos:

$$n(T) < n(S) \Rightarrow \text{Im}(g) \neq S \Rightarrow g \text{ não é sobrejetora}$$

∴ Afirmação verdadeira.

**Gabarito: b**

**68. (ITA/2002)**

Sejam  $a, b, c$  reais não-nulos e distintos,  $c > 0$ . Sendo par a função dada por

$$f(x) = \frac{ax + b}{x + c}, -c < x < c$$

Então  $f(x)$ , para  $-c < x < c$ , é constante e igual a

a)  $a + b$

b)  $a + c$

c)  $c$

d)  $b$

e)  $a$

**Comentários**

Se  $f$  é uma função par no intervalo  $] -c, c[$ , podemos escrever:

$$f(x) = f(-x), -c < x < c$$

$$\frac{a(-x) + b}{(-x) + c} = \frac{ax + b}{x + c}$$

Simplificando a equação:

$$\begin{aligned} (-ax + b)(x + c) &= (ax + b)(-x + c) \\ -ax^2 - acx + bx + bc &= -ax^2 + acx - bx + bc \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} -\cancel{ax^2} - acx + bx + \cancel{bc} &= -\cancel{ax^2} + acx - bx + \cancel{bc} \\ 2bx &= 2acx \\ 2bx &= 2acx \end{aligned}$$

Encontramos a relação:

$$b = ac$$

Substituindo  $b$  na função  $f$ , obtemos:

$$f(x) = \frac{ax + b}{x + c} = \frac{ax + ac}{x + c} = \frac{a(x + c)}{x + c} = \frac{\cancel{a(x + c)}}{\cancel{(x + c)}} = a, -c < x < c$$

**Gabarito: “e”.**

**69. (ITA/1999)**

Sejam  $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funções tais que a função composta  $h \circ g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é a função identidade. Considere as afirmações:

- I. A função  $h$  é sobrejetora.
- II. Se  $x_0 \in \mathbb{R}$  é tal que  $f(x_0) = 0$ , então  $f(x) \neq 0$ , para todo  $x \in \mathbb{R}$  com  $x \neq x_0$ .
- III. A equação  $h(x) = 0$  tem a solução em  $\mathbb{R}$ .

Então:

- a) Apenas a afirmação (I) é verdadeira.
- b) Apenas a afirmação (II) é verdadeira.
- c) Apenas a afirmação (III) é verdadeira.
- d) Todas as afirmações são verdadeiras.
- e) Todas as afirmações são falsas.

**Comentários**

O enunciado diz que  $h \circ g \circ f$  é a função identidade, então podemos escrever:

$$(h \circ g \circ f)(x) = h(g(f(x))) = x$$

Vamos analisar as afirmações:

I. A função  $h$  é sobrejetora.

Vamos provar por redução ao absurdo. Supondo que  $h$  não seja sobrejetora e  $h: A \rightarrow B$ , podemos encontrar  $b \in B$  tal que  $h(g(f(x))) \neq b$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ .

Dessa forma, tomando  $x = b$  e substituindo na função composta:

$$h(g(f(b))) \neq b$$

Dado a hipótese de  $h \circ g \circ f$  ser a função identidade, chegamos a um absurdo.

Logo,  $h$  é sobrejetora.



∴ Verdadeira.

II. Vamos reduzir ao absurdo.

Supondo que exista  $a \in \mathbb{R}$  com  $a \neq x_0$  e  $f(a) = 0$ . Temos:

$$\begin{aligned} f(a) = 0 &\Rightarrow f(a) = f(x_0) \\ \Rightarrow h(g(f(a))) &= h(g(f(x_0))) \\ &\Rightarrow a = x_0 \end{aligned}$$

Pela hipótese inicial,  $a \neq x_0$ . Logo, chegamos a um absurdo.

∴ Verdadeira.

III. Já provamos que  $h$  é sobrejetora de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$ . Então,  $Im(h) = \mathbb{R}$ . Podemos encontrar  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $h(x) = 0$ .

∴ Verdadeira.

**Gabarito: "d".**

**70. (ITA/1999)**

Considere as funções  $f$  e  $g$  definidas por  $f(x) = x - \left(\frac{2}{x}\right)$ , para  $x \neq 0$  e  $g(x) = \frac{x}{x+1}$ , para  $x \neq -1$ . O conjunto de todas as soluções da inequação

$$(g \circ f)(x) < g(x)$$

É

- a)  $[1, +\infty[$
- b)  $] -\infty, -2[$
- c)  $[-2, -1[$
- d)  $] -1, 1[$
- e)  $] -2, -1[ \cup ]1, +\infty[$

**Comentários**

Vamos encontrar a função  $g \circ f$ :

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g[f(x)] \\ g[f(x)] &= \frac{x - \frac{2}{x}}{\left(x - \frac{2}{x}\right) + 1} \end{aligned}$$

Da condição de existência de  $g \circ f$ :

De  $f$  temos  $x \neq 0$ .

$$f(x) \neq -1 \Rightarrow x - \frac{2}{x} \neq -1$$



$$\frac{(x^2 + x - 2)}{x} \neq 0$$

$$\frac{(x + 2)(x - 1)}{x} \neq 0 \Rightarrow x \neq -2 \text{ e } x \neq 1$$

Simplificando  $g \circ f$ :

$$g[f(x)] = \frac{x - \frac{2}{x}}{\left(x - \frac{2}{x}\right) + 1} = \frac{\frac{x^2 - 2}{x}}{\frac{x^2 - 2}{x} + 1} = \frac{\frac{x^2 - 2}{x}}{\frac{x^2 - 2 + x}{x}}$$

Como  $x \neq 0$ :

$$g[f(x)] = \frac{x^2 - 2}{x^2 + x - 2}$$

Analisando a inequação:


$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &< g(x) \\ \frac{x^2 - 2}{x^2 + x - 2} &< \frac{x}{x + 1} \\ \frac{x^2 - 2}{(x + 2)(x - 1)} &< \frac{x}{x + 1} \end{aligned}$$

Desenvolvendo a inequação:

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - 2}{(x + 2)(x - 1)} - \frac{x}{x + 1} &< 0 \\ \frac{(x^2 - 2)(x + 1) - x(x + 2)(x - 1)}{(x + 2)(x - 1)(x + 1)} &< 0 \\ \frac{x^3 + x^2 - 2x - 2 - x(x^2 + x - 2)}{(x + 2)(x - 1)(x + 1)} &< 0 \\ \frac{x^3 + x^2 - 2x - 2 - x^3 - x^2 + 2x}{(x + 2)(x - 1)(x + 1)} &< 0 \\ \frac{-2}{(x + 2)(x - 1)(x + 1)} &< 0 \end{aligned}$$

Como  $-2 < 0$ , devemos ter  $(x + 2)(x - 1)(x + 1) > 0$ .

Representando o sinal das raízes da inequação acima no eixo real, encontramos:



O intervalo de soluções que procuramos possui sinal positivo, logo:

$$S = ] - 2, -1[ \cup ] 1, +\infty[$$

**Gabarito: “e”.**

**71. (ITA/1998)**

Sejam as funções  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , tais que  $f(x) = x^2 - 9$  e  $(f \circ g)(x) = x - 6$ , em seus respectivos domínios. Então, o domínio  $A$  da função  $g$  é:

- a)  $[-3, +\infty[$
- b)  $\mathbb{R}$
- c)  $[-5, +\infty[$
- d)  $] - \infty, -1[ \cup ] 3, +\infty[$
- e)  $] - \infty, \sqrt{6}[$

**Comentários**

Do enunciado, temos:

$$f(x) = x^2 - 9$$

$$(f \circ g)(x) = x - 6$$

Vamos manipular  $f(x)$  para encontrar  $g(x)$ :

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)]$$

$$f[g(x)] = [g(x)]^2 - 9 = x - 6$$

$$[g(x)]^2 = x + 3$$

O contradomínio de  $g$  é o conjunto dos reais, logo:

$$[g(x)]^2 \geq 0 \Rightarrow x + 3 \geq 0$$

$$x \geq -3$$

O domínio da função  $g$  é dado por:

$$A = [-3, +\infty[$$



**Gabarito: "a".**

72. (ITA/1997)

Se  $\mathbb{Q}$  e  $\mathbb{I}$  representam, respectivamente, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, considere as funções  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definidas por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 1, & \text{se } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{se } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

Seja  $J$  a imagem da função composta  $f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

Podemos afirmar que

- a)  $J = \mathbb{R}$
- b)  $J = \mathbb{Q}$
- c)  $J = \{0\}$
- d)  $J = \{1\}$
- e)  $J = \{0, 1\}$

**Comentários**

Vamos analisar a imagem da função composta  $f \circ g$ .

$$f \circ g(x) = f[g(x)]$$

1)  $x \in \mathbb{Q} \rightarrow g(x) = 1$

$$1 \in \mathbb{Q} \rightarrow f[g(x)] = f(1) = 0$$

2)  $x \in \mathbb{I} \rightarrow g(x) = 0$

$$0 \in \mathbb{Q} \rightarrow f[g(x)] = f(0) = 0$$

Logo, para qualquer valor de  $x \in \mathbb{R}$ , temos  $Im(f \circ g) = \{0\}$ .

**Gabarito: "c".**

73. (ITA/1996)

Considere as funções reais  $f$  e  $g$  definidas por  $f(x) = \frac{1+2x}{1-x^2}$ ,  $x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$  e  $g(x) = \frac{x}{1+2x}$ ,  $x \in \mathbb{R} - \{-\frac{1}{2}\}$ .

O maior subconjunto de  $\mathbb{R}$  onde pode ser definida a composta  $f \circ g$ , tal que  $(f \circ g)(x) < 0$ , é:

- a)  $] - 1, -\frac{1}{2}[ \cup ] -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}[$
- b)  $] - \infty, -1[ \cup ] -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}[$
- c)  $] - \infty, -1[ \cup ] -\frac{1}{2}, 1[$
- d)  $] 1, \infty[$



$$e) ] -\frac{1}{2}, \frac{-1}{3} [$$

### Comentários

A questão pede o maior subconjunto dos reais onde a função composta  $(f \circ g)(x) < 0$  está definida.

Vamos encontrar a função composta:

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = \frac{1 + 2\left(\frac{x}{1+2x}\right)}{1 - \left(\frac{x}{1+2x}\right)^2}, x \neq -\frac{1}{2}$$

$x \neq -\frac{1}{2}$ , condição de existência de  $\left(\frac{x}{1+2x}\right)$

Simplificando a função:

$$f(g(x)) = \frac{1 + 2x + 2x}{\frac{1 + 2x}{(1 + 2x)^2 - x^2}}$$

$$*(1 + 2x)^2 - x^2 = (1 + 2x - x)(1 + 2x + x) = (1 + x)(1 + 3x)$$

$$f(g(x)) = \frac{(1 + 4x)(1 + 2x)}{(1 + x)(1 + 3x)}$$

Temos como condição de existência da função composta:

$$1 + x \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$$

$$1 + 3x \neq 0 \Rightarrow x \neq -1/3$$

$$x \neq -\frac{1}{2}$$

Devemos satisfazer:

$$f(g(x)) < 0$$

$$\frac{(1 + 4x)(1 + 2x)}{(1 + x)(1 + 3x)} < 0$$

Vamos encontrar o sinal da função composta, representando-a no eixo real.

Primeiro devemos estudar o sinal das funções  $(1 + 4x)$ ,  $(1 + 2x)$ ,  $(1 + x)$  e  $(1 + 3x)$ .

Encontrando as raízes dessas funções:


1)  $1 + 4x = 0 \Rightarrow x = -1/4$

2)  $1 + 2x = 0 \Rightarrow x = -1/2$

3)  $1 + x = 0 \Rightarrow x = -1$

4)  $1 + 3x = 0 \Rightarrow x = -1/3$

Representando cada uma no eixo real e combinando os resultados para encontrar o quadro de sinais, obtemos:



Assim, o intervalo que satisfaz a condição  $f(g(x)) < 0$  é:

$$x \in ] - 1, -1/2[ \cup ] - 1/3, -1/4[$$

**Gabarito: “a”.**

**74. (ITA/2009)**

Seja  $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = \frac{2x+3}{x+1}$ .

a) Mostre que  $f$  é injetora.

b) Determine  $D = \{f(x); x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}\}$  e  $f^{-1}: D \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

**Comentários**

a) Basta mostrar que,  $\forall a, b \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ , temos  $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$ .

$$f(x) = \frac{2x + 3}{x + 1} = \frac{2(x + 1) + 1}{x + 1} = 2 + \frac{1}{x + 1} \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$f(a) = f(b) \Rightarrow 2 + \frac{1}{a + 1} = 2 + \frac{1}{b + 1} \Rightarrow \frac{1}{a + 1} = \frac{1}{b + 1} \Rightarrow a + 1 = b + 1 \Rightarrow a = b$$

Logo,  $f$  é injetora.

b) O conjunto imagem de  $f$  será determinado passo a passo. Nas implicações abaixo, o domínio  $D' \subseteq \mathbb{R}$  é o maior domínio em que cada função está definida, e o contradomínio é  $\mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} \text{Im} \left( x \mapsto \frac{1}{x} \right) &= \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow \text{Im} \left( x \mapsto \frac{1}{x + 1} \right) = \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow \text{Im} (f) = \text{Im} \left( x \mapsto 2 + \frac{1}{x + 1} \right) \\ &= \mathbb{R} \setminus \{2\} \end{aligned}$$

Logo,  $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ .

Para encontrar  $f^{-1}$ , escreve-se  $y = f(x)$  e isola-se a variável  $x$ .



$$y = \frac{2x + 3}{x + 1} = 2 + \frac{1}{x + 1} \Rightarrow x + 1 = \frac{1}{y - 2} \Rightarrow f^{-1}(y) = x = -1 + \frac{1}{y - 2} = \frac{-y + 3}{y - 2}$$

Portanto,  $f^{-1}: \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-1\}, f^{-1}(x) = \frac{-x+3}{x-2}$

**Gabarito: a) Demonstração; b)  $f^{-1}(x) = \frac{-x+3}{x-2}$ .**

**75. (ITA/1994)**

Dadas as funções reais de variável real  $f(x) = mx + 1$  e  $g(x) = x + m$ , onde  $m$  é uma constante real com  $0 < m < 1$ , considere as afirmações:

- I.  $(f \circ f)(x) = (g \circ f)(x)$ , para algum  $x \in \mathbb{R}$ ;
- II.  $f(m) = g(m)$ ;
- III. Existe  $a \in \mathbb{R}$  tal que  $(f \circ g)(a) = f(a)$ ;
- IV. Existe  $b \in \mathbb{R}$  tal que  $(g \circ f)(b) = mb$ ;
- V.  $0 < (g \circ g)(m) < 3$ .

Podemos concluir que:

- a) todas são verdadeiras.
- b) apenas quatro são verdadeiras.
- c) apenas três são verdadeiras.
- d) apenas duas são verdadeiras.
- e) apenas uma é verdadeira.

**Comentários**

- I. Verdadeira.

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = m(mx + 1) + 1 = m^2x + m + 1$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (mx + 1) + m = mx + m + 1$$

Em particular,  $(f \circ f)(0) = m + 1 = (g \circ f)(0)$ .

- II. Falsa.

$$f(m) = g(m) \Rightarrow m^2 + 1 = 2m \Rightarrow (m - 1)^2 = 0 \Rightarrow m = 1, \text{ absurdo.}$$

- III. Falsa.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = m(x + m) + 1 = mx + m^2 + 1$$

$$(f \circ g)(a) = f(a) \Rightarrow ma + m^2 + 1 = ma + 1 \Rightarrow m^2 = 0 \Rightarrow m = 0, \text{ absurdo.}$$

- IV. Falsa.

$$(g \circ f)(b) = mb \Rightarrow mb + m + 1 = mb \Rightarrow m + 1 = 0 \Rightarrow m = -1, \text{ absurdo.}$$

- V. Verdadeira.



$$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = (x + m) + m = x + 2m$$

$$(g \circ g)(m) = 3m.$$

Como  $0 < m < 1$ , temos  $0 < 3m = (g \circ g)(m) < 3$ .

**Gabarito: “d”**

**76. (ITA/1992)**

Dadas as funções  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ambas estritamente decrescentes e sobrejetoras, considere  $h = f \circ g$ . Então podemos afirmar que:

- a)  $h$  é estritamente crescente, inversível e sua inversa é estritamente crescente.
- b)  $h$  é estritamente decrescente, inversível e sua inversa é estritamente crescente.
- c)  $h$  é estritamente crescente, mas não é necessariamente inversível.
- d)  $h$  é estritamente crescente, inversível e sua inversa é estritamente decrescente.
- e) n.d.a.

**Comentários**

Dados  $x, y \in \mathbb{R}, x < y$ , temos:

$$g \text{ estritamente decrescente} \Rightarrow g(x) > g(y)$$

$$f \text{ estritamente decrescente} \Rightarrow f(g(x)) < f(g(y))$$

Logo,  $h(x) < h(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$ , com  $x < y \Rightarrow h$  é estritamente crescente  $\Rightarrow h$  é injetora.

Dado  $c \in \mathbb{R}$ :

$$f \text{ sobrejetora} \Rightarrow \exists b \in \mathbb{R} \text{ tal que } f(b) = c.$$

$$g \text{ sobrejetora} \Rightarrow \exists a \in \mathbb{R} \text{ tal que } g(a) = b \Rightarrow f(g(a)) = c.$$

Logo,  $\forall c \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{R}$  tal que  $f(g(a)) = c \Rightarrow h$  é sobrejetora.

Portanto,  $h$  é bijetora. Logo, admite inversa. Da definição de função inversa,  $(h \circ h^{-1})(x) = (h^{-1} \circ h)(x) \forall x \in \mathbb{R}$ .

$h$  estritamente crescente  $\Leftrightarrow [x > y \Leftrightarrow h(x) > h(y)] \Leftrightarrow [h^{-1}(h(x)) > h^{-1}(h(y)) \Leftrightarrow h(x) > h(y)] \Leftrightarrow h^{-1}$  estritamente crescente.

**Gabarito: “a”**

**77. (ITA/1991)**

Considere as afirmações:

I. Se  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função par e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função qualquer, então a composição  $g \circ f$  é uma função par;



II. Se  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função par e  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função ímpar, então a composição  $f \circ g$  é uma função par;

III. Se  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função ímpar e inversível então  $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função ímpar.

Então:

- a) Apenas a afirmação I é falsa.
- b) Apenas as afirmações I e II são falsas.
- c) Apenas a afirmação III é verdadeira.
- d) Todas as afirmações são falsas.
- e) n.d.a.

### Comentários

I. Verdadeiro.

$$(g \circ f)(-x) = g(f(-x)) = g(f(x)) = (g \circ f)(x) \Rightarrow g \circ f \text{ é par.}$$

II. Verdadeiro.

$$(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = f(g(x)) = (f \circ g)(x) \Rightarrow f \circ g \text{ é par.}$$

III. Verdadeiro.

Denote-se por  $Graf(f)$  o gráfico da função  $f$ , isto é,  $Graf(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x)\}$

Dado que  $f$  é inversível,  $Graf(f^{-1})$  é uma reflexão de  $Graf(f)$  em relação à reta  $r: y = x$ , pois  $Graf(f^{-1}) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f^{-1}(x)\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = f(y)\} = \{(y, x) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x)\}$ .

Como,  $f$  é ímpar  $\Leftrightarrow \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, (a, b) \in Graf(f) \Rightarrow (-a, -b) \in Graf(f)$ , temos:

$$(x, y) \in Graf(f^{-1}) \Rightarrow (y, x) \in Graf(f) \Rightarrow (-y, -x) \in Graf(f) \Rightarrow (-x, -y) \in Graf(f^{-1}).$$

Logo, como  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \in Graf(f^{-1}) \Rightarrow (-x, -y) \in Graf(f)$ ,  $f^{-1}$  é ímpar.

**Gabarito: "e"**

### 78. (ITA/1990)

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  a função definida por 
$$\begin{cases} x + 2, & \text{se } x \leq -1 \\ x^2, & \text{se } -1 < x \leq 1. \\ 4, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Lembrando que se  $A \subset \mathbb{R}$  então  $f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{R}: f(x) \in A\}$  considere as afirmações:

- I.  $f$  não é injetora e  $f^{-1}([3, 5]) = \{4\}$ ;
- II.  $f$  não é sobrejetora e  $f^{-1}([3, 5]) = f^{-1}([2, 6])$ ;
- III.  $f$  é injetora e  $f^{-1}([0, 4]) = [-2, +\infty[$ .


Então podemos garantir que:

- a) apenas as afirmações II e III são falsas.



- b) as afirmações I e III são verdadeiras.
- c) apenas a afirmação II é verdadeira.
- d) apenas a afirmação III é verdadeira.
- e) todas as afirmações são falsas.

**Comentários**



- I. Falso.  $f^{-1}([3, 5]) = (1, +\infty)$
- II. Verdadeiro.  $f^{-1}([2, 6]) = f^{-1}([3, 5]) = (1, +\infty)$ . Do gráfico, vemos que  $f$  não é sobrejetora.
- III. Falso.  $f$  não é injetora.  $f(-1) = f(1) = 1$ , por exemplo.

**Gabarito: “c”**

**79. (ITA/1988)**

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função estritamente decrescente, isto é, quaisquer  $x$  e  $y$  reais com  $x < y$  tem-se  $f(x) > f(y)$ . Dadas as afirmações:

- I.  $f$  é injetora;
- II.  $f$  pode ser uma função par;
- III. Se  $f$  possui inversa então sua inversa também é estritamente decrescente.

Podemos assegurar que:

- a) apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- b) apenas as afirmações II e III são falsas.



- c) apenas a afirmação I é falsa.
- d) todas as afirmações são verdadeiras.
- e) apenas a afirmação II é verdadeira.

**Comentários**

- I.  $x \neq y \Rightarrow x < y$  ou  $y < x \Rightarrow f(x) > f(y)$  ou  $f(y) > f(x) \Rightarrow f(x) \neq f(y)$ . Logo,  $f$  é injetora.
- II. Se  $f$  fosse par, teríamos,  $\forall a > 0, a > -a \Rightarrow f(a) < f(-a) \Rightarrow f(a) \neq f(-a) = f(a)$ , absurdo.
- III. Verdadeiro, pois:  
 $f$  estritamente decrescente  $\Leftrightarrow [x > y \Leftrightarrow f(x) < f(y)] \Leftrightarrow [f^{-1}(f(x)) > f^{-1}(f(y)) \Leftrightarrow f(x) < f(y)] \Leftrightarrow f^{-1}$  estritamente decrescente.  
 Logo, apenas I e III são verdadeiras.

**Gabarito: “a”**

**80. (ITA/1986)**

Consideremos as seguintes afirmações sobre uma função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

- I. Se existe  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $f(x) \neq f(-x)$  então  $f$  não é par;
- II. Se existe  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $f(-x) = -f(-x)$  então  $f$  é ímpar;
- III. Se  $f$  é par e ímpar então existe  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $f(x) = 1$ ;
- IV. Se  $f$  é ímpar então  $f \circ f$  ( $f$  composta com  $f$ ) é ímpar.

Podemos afirmar que estão corretas as afirmações de números

- a) I e IV.
- b) I, II e IV.
- c) I e III.
- d) III e IV.
- e) I, II e III.

**Comentários**

- I. Verdadeiro. A existência de tal  $x$  contraria a definição de função par.
- II. Falso. Para que uma função seja ímpar, deve valer **para todo**  $x$  no domínio (no caso  $\mathbb{R}$ ), que  $f(x) = -f(-x)$ . A função  $f(x) = x^2$  tem  $f(0) = 0 = -f(-0)$  mas não é ímpar pois  $f(1) = 1 \neq -1 = -f(-1)$ .
- III. Falso.  $f$  par e ímpar  $\Rightarrow f(-x) = f(x) = -f(x) \Rightarrow f(x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$ .
- IV. Verdadeiro.  $(f \circ f)(-x) = f(f(-x)) = f(-f(x)) = -f(f(x)) = -(f \circ f)(x)$ .

**Gabarito: “a”**

**81. (ITA/1985)**



Dadas as sentenças:

I. Sejam  $f: X \rightarrow Y$  e  $g: Y \rightarrow X$  duas funções satisfazendo  $(g \circ f)(x) = x$ , para todo  $x \in X$ . Então  $f$  é injetiva, mas  $g$  não é necessariamente sobrejetiva;

II. Seja  $f: X \rightarrow Y$  uma função injetiva. Então,  $f(A) \cap f(B) = f(A \cap B)$ , onde  $A$  e  $B$  são dois subconjuntos de  $X$ ;

III. Seja  $f: X \rightarrow Y$  uma função injetiva. Então, para cada subconjunto  $A$  de  $X$ ,  $f(A^c) \subset (f(A))^c$  onde  $A^c = \{x \in X | x \notin A\}$  e  $(f(A))^c = \{x \in Y | x \notin f(A)\}$ ,

podemos afirmar que está (estão) correta(s):

- a) As sentenças I e II.
- b) As sentenças II e III.
- c) Apenas a sentença I.
- d) As sentenças I e III.
- e) Todas as sentenças.

### Comentários

I. Falso.

$f$  é injetiva:  $f(a) = f(b) \Rightarrow g(f(a)) = g(f(b)) \Rightarrow a = b$ .

$g$  é sobrejetiva: Dado  $x \in X = \text{contradomínio de } g$ ,  $\exists y = f(x) \in Y$  tal que  $g(y) = x$ .

II. Verdadeiro. Provam-se as duas continências:

Dado  $y \in f(A) \cap f(B)$ ,  $\exists a \in A, b \in B$  tais que  $f(a) = f(b) = y$ . Como  $f$  é injetiva,  $a = b$ . Portanto,  $a \in A \cap B \Rightarrow y = f(a) \in f(A \cap B)$ .

Dado  $y \in f(A \cap B)$ ,  $\exists x \in A \cap B$  tal que  $y = f(x)$ . Mas  $x \in A \cap B \Rightarrow x \in A$  e  $x \in B \Rightarrow y = f(x) \in f(A) \cap f(B)$ .

Logo, para funções injetivas,  $f(A) \cap f(B) = f(A \cap B)$ .

III. Verdadeiro.

Dado  $y \in f(A^c)$ ,  $\exists x \in A^c$  tal que  $y = f(x)$ . Suponha, por absurdo, que  $y \notin (f(A))^c$ , isto é,  $y \in f(A)$ . Então,  $\exists x' \in A$  tal que  $y = f(x')$ . Mas  $f(x) = y = f(x') \Rightarrow x = x'$ , pois  $f$  é injetiva. Isso é um absurdo, visto que  $x \notin A$  e  $x' \in A$ . Portanto,  $y \in (f(A))^c$ , donde se conclui que  $f(A^c) \subseteq (f(A))^c$ .

### Gabarito: "b"

#### 82. (ITA/1982)

Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = \begin{cases} \frac{x+a}{x+b}, & \text{se } x \neq -b \\ -1, & \text{se } x = -b \end{cases}$ . Se  $f(f(x)) = x$  para todo  $x$  real, então

- a)  $ab = -2$ .



b)  $ab = -1$ .

c)  $ab = 0$ .

d)  $ab = 1$ .

e)  $ab = 2$ .

**Comentários**

Para  $x \neq -b$ :

$$f(x) = \frac{x+a}{x+b} \Rightarrow f(f(x)) = \frac{\frac{x+a}{x+b} + a}{\frac{x+a}{x+b} + b} = \frac{x+a+ax+ab}{x+a+bx+b^2} = \frac{(1+a)x+a+ab}{(1+b)x+a+b^2}$$

$$f(f(x)) = x \Leftrightarrow \begin{cases} 1+b=0 \\ a \cdot (1+b) = 0 \Leftrightarrow b = -1, a \neq -1. \\ 1+a = a+b^2 \end{cases}$$

Para  $x = -b = 1$ :

$$1 = -b = f(f(-b)) = f(-1).$$

Como  $-1 \neq 1 = -b$ , temos

$$1 = f(-1) = \frac{-1+a}{-1-b} \Rightarrow -2 = a-1 \Rightarrow a = -1$$

Logo,  $ab = (-1) \cdot (-1) = 1$ .

**Gabarito: “d”**

**83. (ITA/1980)**

Sejam  $A$  e  $B$  subconjuntos não vazios de  $\mathbb{R}$  e  $f: A \rightarrow B$ ,  $g: B \rightarrow A$  duas funções tais que  $f \circ g = I_B$ , onde  $I_B$  é a função identidade em  $B$ . Então podemos afirmar que:

a)  $f$  é sobrejetora.

b)  $f$  é injetora.

c)  $f$  é bijetora.

d)  $g$  é injetora e par.

e)  $g$  é bijetora e ímpar.

**Comentários**

Do enunciado, vale que  $f(g(x)) = x, \forall x \in B$ .

Dado  $b \in B, \exists a = g(b) \in A$  tal que  $f(a) = f(g(b)) = b \Rightarrow f$  é sobrejetora.

$$g(p) = g(q) \Rightarrow f(g(p)) = f(g(q)) \Rightarrow p = q \Rightarrow g \text{ é injetora.}$$

**Gabarito: “a”**

**84. (ITA/1978)**



Sejam  $\mathbb{R}$  o conjunto dos números reais e  $f$  uma função de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$ . Se  $B \subset \mathbb{R}$  e o conjunto  $f^{-1}(B) = \{x \in \mathbb{R}: f(x) \in B\}$ , então:

- a)  $f(f^{-1}(B)) \subset B$ .
- b)  $f(f^{-1}(B)) = B$  se  $f$  é injetora.
- c)  $f(f^{-1}(B)) = B$ .
- d)  $f^{-1}(f(B)) = B$  se  $f$  é sobrejetora.
- e) n.d.a.

**Comentários**

$$y \in f(f^{-1}(B)) \Rightarrow \exists x \in f^{-1}(B) \text{ tal que } y = f(x).$$

$$x \in f^{-1}(B) \Rightarrow f(x) \in B$$

Logo,  $y \in f(f^{-1}(B)) \Rightarrow y \in B$ , isto é,  $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ .

O candidato atento perceberá que  $(d) \Rightarrow (a)$ . Como só uma alternativa pode ser correta, eliminará essa resposta antes mesmo de proceder qualquer outra dedução.

A alternativa d está incorreta. Tome  $f$  não sobrejetora, com  $t \notin \text{Im}(f) = f(\mathbb{R})$ . Então, se  $B = \{t\}$ ,  $f^{-1}(B) = \emptyset \Rightarrow f(f^{-1}(B)) = \emptyset \neq B$ .

**Gabarito: “b”**

**85. (ITA/1976)**

Considere  $g: \{a, b, c\} \rightarrow \{a, b, c\}$  uma função tal que  $g(a) = b$  e  $g(b) = a$ . Então, temos:

- a) a equação  $g(x) = x$  tem solução se, e somente se,  $g$  é injetora.
- b)  $g$  é injetora, mas não é sobrejetora.
- c)  $g$  é sobrejetora, mas não é injetora.
- d) se  $g$  não é sobrejetora, então  $g(g(x)) = x$  para todo  $x$  em  $\{a, b, c\}$ .
- e) n.d.r.a.

**Comentários**

$g(x) = x$  tem solução  $\Leftrightarrow a = b$  ou  $g(c) = c$ . Pode ser que  $c \neq a = b$ ,  $g(a) = g(b) = g(c) = a = b$ , ou seja, que haja solução sem que  $g$  seja injetora  $\Rightarrow (a)$  falso.

Do exemplo acima, concluímos que  $g$  não precisa ser injetora nem sobrejetora  $\Rightarrow (b)$  e  $(c)$  falsos.

Considerando o mesmo exemplo, temos que  $g$  não é sobrejetora mas  $g(g(c)) = g(a) = a \neq c \Rightarrow (d)$  falso.

**Gabarito: “e”**

**86. (ITA/1974)**



Sejam  $A, B$ , e  $D$  subconjuntos não vazios do conjunto  $\mathbb{R}$  dos números reais. Sejam as funções  $f: A \rightarrow B$ ,  $g: D \rightarrow A$ , e a função composta  $(f \circ g): E \rightarrow K$ . Então os conjuntos  $E$  e  $K$  são tais que:

- a)  $E \subset A$  e  $K \subset D$ .
- b)  $E \subset B$  e  $K \supset A$ .
- c)  $E \supset D$ ,  $D \neq E$  e  $K \subset B$ .
- d)  $E \subset D$  e  $K \subset B$ .
- e) n.d.a.

**Comentários**

Como  $f: A \rightarrow B$ ,  $g: D \rightarrow A$ , os maiores domínio e contradomínio para  $(f \circ g)$  possíveis são, respectivamente,  $D$  e  $B$ . Assim,  $E$  pode ser uma extensão de  $D$  e  $K$  pode ser uma restrição de  $B$ , isto é,  $E \supset D$  e  $K \subset B$ .

**Gabarito: “d”**

**87. (IME/2019)**

Definimos a função  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  da seguinte forma:

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(1) = 1 \\ f(2n) = f(n), \quad n \geq 1 \\ f(2n + 1) = n^2, \quad n \geq 1 \end{cases}$$

Definimos a função  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  da seguinte forma:  $g(n) = f(n)f(n + 1)$ .

Podemos afirmar que:

- a)  $g$  é uma função sobrejetora.
- b)  $g$  é uma função injetora.
- c)  $f$  é uma função sobrejetora.
- d)  $f$  é uma função injetora.
- e)  $g(2018)$  tem mais do que 4 divisores positivos.

**Comentários**

Para questões de funções desse tipo, devemos testar os valores e verificar as alternativas. Vamos encontrar a imagem de  $f$  e  $g$ .

Para  $f$ , temos:

$n$	0	1	2	3	4	5	6
$f(n)$	0	1	1	1	1	4	1

Já podemos afirmar que  $f$  não é injetora, pois  $f(1) = f(2)$ . Também não é sobrejetora, pois  $f$  assume apenas valores quadrados perfeitos.



Para  $g$ :

$n$	$g(n)$
0	$f(0)f(1) = 0$
1	$f(1)f(2) = 1$
2	$f(2)f(3) = 1$
3	$f(3)f(4) = 1$
4	$f(4)f(5) = 4$

$g$  também não é injetora nem sobrejetora pelos mesmos motivos de  $f$ .

Portanto, a única alternativa que resta é a “e”. Veja:

$$g(2018) = f(2018)f(2019) = f(1009)f(2019) = 504^2 \cdot 1009^2 = (2^3 \cdot 3^2 \cdot 7^1)^2 \cdot 1009^2$$

$$g(2018) = 2^6 \cdot 3^4 \cdot 7^2 \cdot 1009^2$$

O número de divisores positivos de  $g$  é:

$$(6 + 1)(4 + 1)(2 + 1)(2 + 1) = 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 3 = \boxed{315 \text{ divisores positivos}}$$

\*Observação: Na hora da prova, você poderia testar diretamente a única alternativa que trata de valores numéricos. Assim, você não perderia tempo testando as demais. Sempre tente ganhar tempo na prova!

**Gabarito: “e”.**

**88. (IME/2018)**

Considere as alternativas:

- I. O inverso de um irracional é sempre irracional.
- II. Seja a função  $f: A \rightarrow B$  e  $X$  e  $Y$  dois subconjuntos quaisquer de  $A$ , então  $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$ .
- III. Seja a função  $f: A \rightarrow B$  e  $X$  e  $Y$  dois subconjuntos quaisquer de  $A$ , então  $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$ .
- IV. Dados dois conjuntos  $A$  e  $B$  não vazios, então  $A \cap B = A$  se, e somente se,  $B \subset A$ .

Obs.:  $f(\mathbb{Z})$  é a imagem de  $f$  no domínio  $\mathbb{Z}$ .

São corretas:

- a) I, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.



e) II e III, apenas.

**Comentários**

I. Vamos provar por absurdo.

Supondo que  $x \in \mathbb{I}$  e  $1/x \in \mathbb{Q}$ . Se  $1/x$  é racional, podemos escrever:

$$\frac{1}{x} = \frac{a}{b}, a, b \in \mathbb{Z}^*$$

$$x = \frac{b}{a} \in \mathbb{Q}$$

Da hipótese inicial  $x \in \mathbb{I}$ . Absurdo!

Logo, o inverso de um irracional é sempre irracional.


∴ Verdadeira.

II.  $X, Y \subset A, f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$ .

Vamos encontrar um contra-exemplo.

Seja  $A = \{2, 3, 4\}, B = \{1, 2, 3\}, X = \{2, 3\}, Y = \{3, 4\}$ .

Representando  $f: A \rightarrow B$  no diagrama de flechas:



$$X \cap Y = \{3\} \Rightarrow f(X \cap Y) = \{2\}$$

$$f(X) = \{1, 2\} \text{ e } f(Y) = \{1, 2\} \Rightarrow f(X) \cap f(Y) = \{1, 2\} \neq f(X \cap Y)$$

∴ Falsa.

III. Podemos provar usando a definição do conjunto união e a propriedade antissimétrica dos subconjuntos.

(Propriedade antissimétrica dos subconjuntos:  $A \subset B \wedge B \subset A \Leftrightarrow A = B$ )

Demonstração:

Para  $a \in (X \cup Y)$ , existe  $b \in f(X \cup Y)$ , tal que  $f(a) = b$ .

Da relação  $a \in (X \cup Y)$ , temos  $a \in X$  ou  $a \in Y$ .

Se  $a \in X$ , temos  $b \in f(X)$ . Mas se  $a \in Y$ , temos  $b \in f(Y)$ . Dessa forma, podemos afirmar:



$$b \in f(X) \cup f(Y)$$

Disso, concluímos:

$$\Rightarrow f(X \cup Y) \subset f(X) \cup f(Y)$$

Agora, vamos provar que  $f(X) \cup f(Y) \subset f(X \cup Y)$ .

Seja  $b \in f(X) \cup f(Y)$ . Então, da definição de conjunto união:  $b \in f(X)$  ou  $b \in f(Y)$ .

Para  $b \in f(X)$ , podemos encontrar um  $a \in X$  tal que  $b = f(a)$ . Analogamente para  $b \in f(Y)$ , podemos encontrar  $a \in Y$  que satisfaça  $b = f(a)$ . Então  $\exists a \in X \cup Y$ , tal que  $b = f(a)$ .

Dessa forma:  $b \in f(X \cup Y)$ .

$$\Rightarrow f(X) \cup f(Y) \subset f(X \cup Y)$$

Da propriedade antissimétrica:

$$f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$$

∴ Verdadeira.

$$\text{IV. } A \cap B = A \Leftrightarrow B \subset A$$

Contraexemplo:

$$A = \{a, b\}$$

$$B = \{a, b, c\}$$

$$A \cap B = \{a, b\} = A$$

$$B \not\subset A$$

∴ Falsa.

**Gabarito: "b".**

**89. (IME/2018)**

Seja  $f(x)$  uma função definida no conjunto dos números reais, de forma que  $f(1) = 5$  e para qualquer  $x$  pertencente aos números reais  $f(x + 4) \geq f(x) + 4$  e  $f(x + 1) \leq f(x) + 1$ .

Se  $g(x) = f(x) + 2 - x$ , o valor de  $g(2017)$  é:

a) 2

b) 6

c) 13

d) 2021

e) 2023

**Comentários**

Precisamos encontrar o valor de  $g(2017) = f(2017) + 2 - 2017$ . Para isso, temos que encontrar o valor de  $f(2017)$ .

Do enunciado:



$$\begin{cases} f(1) = 5 \\ f(x+4) \geq f(x) + 4 \\ f(x+1) \leq f(x) + 1 \end{cases}$$

Vamos analisar  $f(x+1) \leq f(x) + 1$ . Podemos manipular  $x$  da função e encontrar as relações de desigualdade:

$$\begin{aligned} f(x+1) &\leq f(x) + 1 \\ f(x+2) &\leq f(x+1) + 1 \\ f(x+3) &\leq f(x+2) + 1 \\ f(x+4) &\leq f(x+3) + 1 \end{aligned}$$

Somando as inequações, obtemos:

$$\begin{aligned} f(x+4) + f(x+3) + f(x+2) + f(x+1) &\leq f(x+3) + f(x+2) + f(x+1) + f(x) + 4 \\ f(x+4) &\leq f(x) + 4 \end{aligned}$$

Dessa forma, temos a seguinte relação:

$$\begin{aligned} f(x) + 4 &\leq f(x+4) \leq f(x) + 4 \\ \Rightarrow f(x+4) &= f(x) + 4 \end{aligned}$$

$f(2017)$  é dado por:

$$\begin{aligned} f(2017) &= f(2013) + 4 \\ f(2013) &= f(2009) + 4 \\ f(2009) &= f(2005) + 4 \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$f(2017) = f(2017 - 4) + 4 = f(2017 - 2 \cdot 4) + 2 \cdot 4 = f(2017 - 3 \cdot 4) + 3 \cdot 4 = \dots$$

Temos um padrão. Perceba que  $f(2017) = f(2017 - n \cdot 4) + n \cdot 4$

Vamos encontrar  $n$ . Dividindo 2017 por 4:

$$2017 = 504 \cdot 4 + 1 \Rightarrow 2017 - 504 \cdot 4 = 1$$

Assim:

$$\begin{aligned} f(2017) &= f(2017 - 504 \cdot 4) + 504 \cdot 4 \\ f(2017) &= f(1) + 504 \cdot 4 = 5 + 504 \cdot 4 = 2021 \end{aligned}$$

$g(2017)$  é dado por:

$$\begin{aligned} g(2017) &= f(2017) + 2 - 2017 \\ g(2017) &= 2021 + 2 - 2017 = 6 \\ \Rightarrow g(2017) &= 6 \end{aligned}$$

**Gabarito: "b".**

**90. (IME/2017)**

**O sistema de inequações abaixo admite  $k$  soluções inteiras.**



$$\begin{cases} \frac{x^2 - 2x - 14}{x} > 3 \\ x \leq 12 \end{cases}$$

Pode-se afirmar que:

- a)  $0 \leq k < 2$
- b)  $2 \leq k < 4$
- c)  $4 \leq k < 6$
- d)  $6 \leq k < 8$
- e)  $k \geq 8$


**Comentários**

Devemos encontrar as soluções inteiras que satisfazem ao sistema. Vamos analisar a primeira inequação:

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - 2x - 14}{x} &> 3 \\ \frac{x^2 - 2x - 14}{x} - 3 &> 0 \\ \frac{x^2 - 2x - 14 - 3x}{x} &> 0 \\ \frac{x^2 - 5x - 14}{x} &> 0 \\ \frac{(x - 7)(x + 2)}{x} &> 0 \end{aligned}$$

Devemos ter  $x \neq 0$  como condição de existência.

Construindo o quadro de sinais, obtemos:



Dessa inequação, encontramos  $x \in ] - 2, 0[ \cup ] 7, +\infty[$ .

Da segunda inequação, temos:  $x \leq 12$ .



Juntando as duas condições, encontramos as raízes inteiras:

$$x \in A$$

$$A = \{-1, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

$$k = n(A) = 6$$

$$6 \leq k < 8$$

**Gabarito: “d”.**

**91. (IME/2016)**

Sejam as funções  $f_n$ , para  $n \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ , tais que:  $f_0(x) = \frac{1}{1-x}$  e  $f_n(x) = f_0(f_{n-1}(x))$ , para  $n \geq 1$ . Calcule  $f_{2016}(2016)$ .

**Comentários**

Vamos tentar encontrar um padrão nas formas de  $f$ , sabendo que  $f_n(x) = f_0(f_{n-1}(x))$ .

Para  $n = 1$ :

$$f_1(x) = f_0(f_0(x))$$

$$f_1(x) = \frac{1}{1-f_0(x)} = \frac{1}{1-\left(\frac{1}{1-x}\right)} = \frac{1-x}{1-x-1} = \frac{1-x}{-x} = \frac{x-1}{x}$$

Para  $n = 2$ :

$$f_2(x) = f_0(f_1(x))$$

$$f_2(x) = \frac{1}{1-f_1(x)} = \frac{1}{1-\left(\frac{x-1}{x}\right)} = \frac{x}{x-x+1} = x$$

Para  $n = 3$ :

$$f_3(x) = f_0(f_2(x))$$

$$f_3(x) = \frac{1}{1-x}$$

Perceba que a função  $f_3$  é igual a  $f_0$ . Se continuarmos a calcular  $f$  para os próximos valores de  $n$ , as funções se repetirão:

$$f_0 = f_3 = f_6 = \dots$$

$$f_1 = f_4 = f_7 = \dots$$

$$f_2 = f_5 = f_8 = \dots$$

Então, sendo  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $f$  é dado por:

$$f_{3k}(x) = \frac{1}{1-x}$$

$$f_{3k+1}(x) = \frac{x-1}{x}$$

$$f_{3k+2}(x) = x$$



Precisamos calcular  $f_{2016}(2016)$ . Para isso, vamos descobrir qual a forma de  $f$  para  $n = 2016$ .

Dividindo 2016 por 3:

$$2016 = 672 \cdot 3$$

2016 é múltiplo de 3, logo  $f_{2016}$  possui a forma de  $f_{3k}$ . Então  $f_{2016}(2016)$  é dado por:

$$f_{2016}(2016) = \frac{1}{1 - 2016} = -\frac{1}{2015}$$

**Gabarito:**  $f_{2016}(2016) = -\frac{1}{2015}$

---

**92. (IME/2010)**

Sejam as funções  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . A alternativa que apresenta a condição necessária para que se  $f(g(x)) = f(h(x))$ , então  $g(x) = h(x)$  é

- a)  $f(x) = x$
- b)  $f(f(x)) = f(x)$
- c)  $f$  é bijetora
- d)  $f$  é sobrejetora
- e)  $f$  é injetora

**Comentários**

Vamos verificar a condição para que a seguinte afirmação seja verdadeira:

$$f(g(x)) = f(h(x)) \Rightarrow g(x) = h(x)$$

Se  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , então:

$\forall a, b \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}$  tal que  $g(x) = a$  e  $h(x) = b$

$$f(g(x)) = f(h(x)) \Rightarrow f(a) = f(b) \Rightarrow a = b \Rightarrow g(x) = h(x)$$

A condição encontrada  $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b, \forall a, b \in \mathbb{R}$  é exatamente a condição de ser função injetora.

Logo,  $f$  é injetora.

**Gabarito: "e".**

---

**93. (IME/2009)**

Sejam  $f$  uma função bijetora de uma variável real, definida para todo conjunto dos números reais, e as relações  $h$  e  $g$ , definidas por:  $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2: (x, y) \rightarrow (x^2, x - f(y))$  e  $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2: (x, y) \rightarrow (x^3, x - f(y))$ . Pode-se afirmar que

- a)  $h$  e  $g$  são sobrejetoras.
- b)  $h$  é injetora e  $g$  sobrejetora.
- c)  $h$  e  $g$  não são bijetoras.



d)  $h$  e  $g$  não são sobrejetoras.

e)  $h$  não é injetora e  $g$  é bijetora.

### Comentários

Como  $f$  é sobrejetora, temos que existe  $y_1$  e  $y_2$  tais que  $f(y_1) = 1$  e  $f(y_2) = -1$ . Assim, temos:

$$h(1, y_1) = (1^2, 1 - f(y_1)) = (1, 1 - 1) = (1, 0)$$

$$h(-1, y_2) = ((-1)^2, -1 - f(y_2)) = (1, -1 + 1) = (1, 0)$$

Como  $h(1, y_1) = h(-1, y_2)$ , temos que  $h$  não é injetora.

Dado  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ , vejamos se é possível encontrar um par ordenado  $(x, y)$  tal que  $g(x, y) = (a, b)$ .

$$g(x, y) = (a, b) \Leftrightarrow (x^3, x - f(y)) = (a, b) \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{a} \text{ e } y = f^{-1}(\sqrt[3]{a} - b).$$

Logo,  $g$  é sobrejetora.

$$g(p, q) = g(r, s) \Rightarrow (p^3, p - f(q)) = (r^3, r - f(s)) \Rightarrow p = r, f(q) = f(s) \Rightarrow (p, q) = (r, s).$$

Logo,  $g$  é injetora e, portanto, bijetora.

### Gabarito: “e”

#### 94. (IME/2007)

Considere os conjuntos  $A = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$  e  $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , e seja a função  $f: A \rightarrow B$  tal que:

$$f(x, y) = x + y$$

É possível afirmar que  $f$  é uma função:

- a) injetora
- b) sobrejetora
- c) bijetora
- d) par
- e) ímpar

### Comentários

$$f(1, 2) = 3; f(1, 3) = 4; f(2, 3) = 5;$$

Logo,  $\nexists (a, b) \neq (p, q) \in A$  tais que  $f(a, b) = f(p, q)$ . Portanto,  $f$  é injetora.

### Gabarito: “a”

#### 95. (IME/1976)

São dados os conjuntos  $E = \{a, b, c, d\}$  e  $F \subset E$ , tal que  $F = \{a, b\}$ . Denote por  $P(E)$  o conjunto das partes de  $E$  e considere, em  $P(E)$ , a relação  $R$ , tal que



$$X R Y \Leftrightarrow F \cap X = F \cap Y$$

a) Verifique se  $R$  é uma relação de equivalência.

b)  $Z \subset P(E)$ . Determine  $Z$ , sabendo-se que  $Z \cap F = \{b\}$ .

c)  $W \subset P(E)$ . Determine  $W$ , sabendo-se que  $F \cap W = \emptyset$ .

Obs.:  $P(E)$  tem 16 elementos.  $\Leftrightarrow$  significa "se e somente se".

### Comentários

a) Inicialmente, temos que:

$$X R X \Leftrightarrow F \cap X = F \cap X$$

Então,  $R$  é reflexiva.

Vamos usar a definição de  $R$  dada no enunciado:

$$X R Y \Leftrightarrow F \cap X = F \cap Y$$

$$Y R X \Leftrightarrow F \cap Y = F \cap X$$

$$\therefore X R Y = Y R X$$

Desse modo,  $R$  é simétrica.

Por fim, vamos analisar  $X R Y$  e  $Y R Z$ . Dado que  $R$  é simétrica, temos:

$$\underbrace{F \cap X = F \cap Y}_{X R Y} \text{ e } \underbrace{F \cap Y = F \cap Z}_{Y R Z}$$

Portanto, chegamos em:

$$F \cap X = F \cap Z$$

Então,  $R$  é transitiva. Logo, como  $R$  é reflexiva, simétrica e transitiva:  $R$  é uma relação de equivalência.

b) Para que  $Z \cap \underbrace{\{a, b\}}_F = \{b\}$  e  $Z \subset P(E)$ ,  $Z$  deve possuir os elementos de  $P(E)$  que possuem  $b$  mas não possuem  $a$ . Além disso, o conjunto  $P(E)$  é formado por todos os subconjuntos possíveis de  $E$ .

$$P(E) = \left\{ \begin{array}{l} \emptyset; \{a\}; \{b\}; \{c\}; \{d\}; \{a, b\}; \{a, c\}; \{a, d\}; \{b, c\}; \\ \{b, d\}; \{c, d\}; \{a, b, c\}; \{a, b, d\}; \{a, c, d\}; \{b, c, d\}; \{a, b, c, d\} \end{array} \right\}$$

Então, as possíveis soluções de  $Z$  são:

$$Z \in \{\{b\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{b, c, d\}\}$$

c) Para que  $\{a, b\} \cap W = \emptyset$ ,  $W$  não deve possuir os elementos  $a$  e  $b$ . Mas,  $W$  pode possuir os elementos  $c$  e  $d$ . Então, as possíveis soluções de  $W \subset P(E)$  são:

$$W \in \{\emptyset, \{c\}, \{d\}, \{c, d\}\}$$

**Gabarito:** a) Demonstração b)  $Z \in \{\{b\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{b, c, d\}\}$  c)  $W \in \{\emptyset, \{c\}, \{d\}, \{c, d\}\}$



Seja  $A$  um conjunto não vazio e  $R$  uma relação em  $A$ , reflexiva e transitiva. Definimos a relação  $S$ , em  $A$ , por:

$$xSy \text{ se e somente se } xRy \text{ e } yRx.$$

a) Mostre que  $S$  é uma relação de equivalência em  $A$ . Caracterize as classes de equivalência determinadas por  $S$  em  $A$ , quando  $R$  é uma relação de ordem.

b) Determine explicitamente o conjunto quociente  $A/S$ , quando

$$R = [(A \cap B) \times (A \cap B)] \cup [(A - B) \times (A - B)],$$

onde  $B$  é um conjunto não vazio.

### Comentários

a) Para mostrar que  $S$  é uma relação de equivalência, temos que analisar se ela é reflexiva, simétrica e transitiva:

i)  $S$  é reflexiva:

Como  $R$  é reflexiva, temos  $xRx$ , então, pela definição dada no enunciado para  $S$ :

$$xSx \leftrightarrow xRx \text{ e } xRx \leftrightarrow xSx$$

Portanto,  $S$  é reflexiva.

ii)  $S$  é simétrica:

Temos que:

$$xSy \leftrightarrow xRy \text{ e } yRx \leftrightarrow yRx \text{ e } xRy \leftrightarrow ySx$$

Portanto,  $S$  é simétrica.

iii)  $S$  é transitiva:

$$xSy \leftrightarrow xRy \text{ e } yRx$$

$$ySz \leftrightarrow yRz \text{ e } zRy$$

Mas, como  $R$  é transitiva:

$$xRy \text{ e } yRz \rightarrow xRz$$

$$zRy \text{ e } yRx \rightarrow zRx$$

Então, temos:

$$\begin{cases} xSy \leftrightarrow xRy \text{ e } yRx \\ ySz \leftrightarrow yRz \text{ e } zRy \end{cases} \rightarrow xRz \text{ e } zRx \leftrightarrow xSz$$

Logo:

$$xSy \text{ e } ySz \rightarrow xSz$$

Portanto,  $S$  é transitiva.

Desse modo,  $S$  é uma relação de equivalência. Além disso, se  $R$  é uma relação de ordem, temos que se  $xRy$ , então  $x \leq y$ . Com isso, podemos analisar o seguinte exemplo, seja um



conjunto  $X = \{a, b, c\}$ , se  $R$  é uma relação de equivalência nesse conjunto e  $R$  é uma relação de ordem, temos que a relação de equivalência em  $X$  é:

$$Y = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, b), (b, c), (c, c)\}$$

Ou seja, a relação segue se  $xRy$ , então  $x \leq y$ . Além disso, a definição de classe de equivalência é:  $[a] = \{b \in X | a \sim b\}$ . Com isso, nesse exemplo, as classes de equivalência devem ser:

$$[a] = \{a, b, c\}$$

$$[b] = \{b, c\}$$

$$[c] = \{c\}$$

Mas, como  $xSy$  se e somente se  $xRy$  e  $yRx$ , então, do conjunto  $Y$ , chegamos em um conjunto  $Z$ , onde  $(x, y) \in Y$  e  $(y, x) \in Y$ :

$$Z = \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$$

Portanto, as classes de equivalência são:

$$[y] = \{x \in A | x = y\}$$

b) Esse conjunto será o conjunto de todas as classes de equivalência possíveis de  $A$  com  $S$ . Além disso, podemos observar que  $A - B = A - A \cap B$ , ou seja,  $A - B$  e  $A \cap B$  são disjuntos, então, temos:

$$R = [(A \cap B)x(A \cap B)] \cup [(A - B)x(A - B)]$$

Precisamos analisar o conjunto quociente em  $(A \cap B)x(A \cap B)$  e depois em  $(A - B)x(A - B)$ , uma vez que, conforme observamos acima, os mesmos são disjuntos. Logo:

$$A/S = \{[x] | x \in A\}$$

Mas, podemos dividir o  $x \in A$  em  $x \in (A \cap B) \cup (A - B)$ :

$$A/S = \{[x] | x \in (A \cap B)\} \cup \{[x] | x \in (A - B)\}$$

Conforme vimos anteriormente, temos  $[x] = \{y \in A | y = x\}$ :


$$A/S = \{\{y \in (A \cap B) | y = x\} | x \in (A \cap B)\} \cup \{\{y \in (A - B) | y = x\} | x \in (A - B)\}$$

**Gabarito: a)  $[y] = \{x \in A | x = y\}$  b)  $A/S = \{\{y \in (A \cap B) | y = x\} | x \in (A \cap B)\} \cup \{\{y \in (A - B) | y = x\} | x \in (A - B)\}$**

## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA AULA

Chegamos ao final da nossa aula introdutória de funções. Nas próximas aulas, continuaremos com o tópico de funções até abordarmos todas as funções que podem ser cobradas na prova.

Quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões entre em contato pelo fórum de dúvidas do Estratégia ou se preferir:



## 10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Iezzi, Gelson. Murakami, Carlos. Fundamentos de matemática elementar, 1: conjuntos, funções. 9. ed. Atual, 2013. 410p.

[2] Morgado, Augusto Cezar de Oliveira. Wagner, Eduardo. Carvalho, Paulo Cezar Pinto. Lima, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio, v. 1. 11 ed. SBM, 2016. 250p.

## 11. VERSÕES DAS AULAS

Caro aluno! Para garantir que o curso esteja atualizado, sempre que alguma mudança no conteúdo for necessária, uma nova versão da aula será disponibilizada.