

1. CPCON 2015

São recursos de primeiros socorros para a recuperação das funções cardiorrespiratórias:

- a. Massagem cardíaca e respiração artificial.
- b. Massagem cardíaca e imobilização do corpo.
- c. Respiração artificial e torniquete.
- d. Respiração artificial e colocar a criança sentada.
- e. Massagem cardíaca e dar algumas tapinhas no rosto.

2. Stoodi

Vítima apresenta fratura exposta (o osso está quebrado para fora). O que fazer:

- a. Garrotear o membro fazendo um torniquete.
- b. Empurrar aquele osso para dentro.
- c. Puxar o membro para que o osso volte para o seu lugar.
- d. Observar se a vítima está respirando, imobilizar o membro e acalmar a vítima.
- e. Ir jogando água gelada até chegar o resgate.

3. FCC 2006

Quatro passageiros estão no interior do carro e os cabos elétricos rompidos de um poste estão sobre a parte externa do veículo. Nesta situação, o procedimento indicado é:

- a. retirar os cabos, enquanto se aguarda o resgate.
- b. retirar, ao mesmo tempo, os cabos e os passageiros do carro.
- c. retirar os passageiros após afastar os carros com um cano de ferro.
- d. solicitar ajuda para a retirada dos passageiros, sem provocar a movimentação do carro.
- e. orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro, aguardando o resgate.

4. Stoodi

Em casos de vítimas com queimaduras, deve-se:

- a. Passar sabão.
- b. Estourar as bolhas, quando existirem.
- c. Passar pasta de dente.
- d. Fazer um curativo bem fechado.
- e. Nenhuma das alternativas.

5. ENEM 2015

A definição de queimaduras é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas (flictenas) até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados à vítimas, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente.

Disponível em: www.bombeiros-bm.rs.gov.br (adaptado)

Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimaduras com formação de flictena, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é

- a. colocar gelo sobre a flictena para amenizar o ardor
- b. utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena
- c. passar creme dental para diminuir a ardência da flictena
- d. perfura a flictena para que a água acumulada seja liberada.
- e. cobrir a flictena com gazes molhados para evitar a desidratação

6. UFC 2003

Os Primeiros Socorros protegem a vítima contra maiores danos, até a chegada de um profissional de saúde especializado. No caso de picadas de cobras peçonhentas, devemos socorrer a vítima até 30 minutos após a mordida, com as seguintes medidas:

- a. manter a vítima em repouso, fazer a assepsia e aplicar compressas frias ou gelo.
- b. manter a vítima em movimento, fazer garroteamento e oferecer um pouco de álcool.
- c. manter a vítima em movimento, fazer a assepsia e oferecer um pouco de querosene.
- d. manter a vítima em repouso, fornecer um pouco de álcool e aplicar a respiração de socorro.
- e. manter a vítima em pé, fazer garroteamento e cortar a pele para extrair sangue.

7. Stoodi

Ao observar uma pessoa tendo convulsões, deve-se:

- a. Não interferir porque isto passa espontaneamente.
- b. Abrir a boca da vítima e colocar um pano entre os dentes para evitar que ela morda a língua.
- c. Pedir ajuda de outras pessoas e tentar imobilizá-la segurando-a firmemente.
- d. Proteger a cabeça da pessoa contra traumas e virá-la de lado em caso de vômitos
- e. Abrir as vestes para melhorar a respiração, sacudindo-a para tirá-la do transe.

8. Stoodi

Na ocorrência de um acidente, a primeira medida a ser tomada com relação à vítima é:

- a. Desobstrução das vias aéreas (balas, dentaduras).
- b. Verificar as condições da via para removê-la imediatamente para o hospital.
- c. Verificar a ocorrência de hemorragia interna e externa.
- d. Verificar a existência de fraturas abertas e fechadas.

e. Verificar se a pulsação está normal.

9. Stoodi

Uma pessoa foi atropelada e está caída no meio da rua. O quê fazer em primeiro lugar?

- a. Remover a pessoa para a calçada.
- b. Correr atrás do carro que atropelou.
- c. Tentar chamar um parente da vítima.
- d. Sinalizar o local do acidente.
- e. Verificar se a vítima sofreu traumas.

10. UEL 1995

Um bombeiro, ao ser chamado para atender uma vítima de afogamento, tinha à sua disposição três recipientes numerados, cujos componentes e respectivas proporções estão discriminadas a seguir:

- I. 100% de O_2
- II. 95% de O_2 e 5% de CO_2
- III. 80% de N_2 e 20% de O_2

O procedimento mais correto seria utilizar o recipiente

- a. I porque o O_2 puro supre as exigências respiratórias dos tecidos.
- b. I porque o O_2 puro estimula a medula óssea a produzir hemácias.
- c. II porque além da porcentagem de O_2 , há o CO_2 que estimula o bulbo a recomençar os movimentos respiratórios.
- d. III porque além do O_2 é praticamente a mesma do ar atmosférico.
- e. III porque além do O_2 , há o N_2 que estimula o processo respiratório e atua sobre o cerebelo

11. Stoodi

O "estado de choque" ou "a vítima está chocada" ou "entrou em choque" querem dizer que:

- a. Certamente há alguns ossos quebrados.
- b. A vítima está sentindo muita dor.
- c. A vítima está emocionalmente abalada, quase desmaiando.
- d. A vítima chocou-se contra objetos.
- e. A oxigenação do organismo está deficiente.

12. VUNESP 2010

A avaliação inicial se realiza em etapas, constitui o primeiro item a ser abordado na análise da vítima. Deve-se, portanto,

- a. avaliar as vias aéreas.
- b. estabilizar a coluna cervical, verificar a responsividade e abertura das vias aéreas.

- c. ver, ouvir e sentir sinais e sintomas.
- d. avaliar a circulação.
- e. verificar se há hemorragias.

13. Stoodi

Hemorragias internas ocorrem em consequência de ferimentos ou traumatismos profundos, e levam rapidamente ao estado de choque. O que não deve se fazer nesse caso?

- a. Colocar uma bolsa de gelo ou compressas frias no local do trauma.
- b. Deixar a vítima de forma que a cabeça dela fique mais elevada que o restante do corpo.
- c. Manter os sinais vitais.
- d. Não deixar que a vítima tome líquidos.
- e. A vítima deve receber atendimento médico o mais rápido possível.

14. Stoodi

Ausência de movimentos no peito; lábios, língua e unhas azulados; e inconsciência são sintomas de que a vítima:

- a. Parou de respirar.
- b. Está em estado de choque.
- c. Sofreu queimaduras de terceiro grau.
- d. Desmaiou.
- e. Está com hemorragia interna.

GABARITO: 1) a, 2) d, 3) e, 4) e, 5) e, 6) a, 7) d, 8) e, 9) d, 10) c, 11) e, 12) c, 13) b, 14) b,